

GERAPPAFORT
LIBRI RARI
ROMA



John Carter Brown
Library
Brown University

K328


FIRST ITALIAN EDITION

See G + M 1675 + 2093

en/ra



OBSERVATIONES
DE AÈRE
ET
MORBIS EPIDEMICIS, &c.



OBSERVATIONES
DE AËRE
ET MORBIS EPIDEMICIS,

Ab Anno MDCCXXVIII. ad Finem Anni
MDCCXXXVII. Plymuthi factæ.

HIS ACCEDIT

OPUSCULUM

De Morbo Colico Damnoniensi.

AUCTORE

JOANNE HUXHAM, M.D.R.S.S.

Τοῖσι δ' αὖθις τοῖσιν ἑποτρυνώμενος Ἀιτίος (ὁ Ἀνδρ.) ἵσ. τετρε Βίς
καὶ τῶν Νοσέων τοῖσι νοσέουσι. Hippocr. de Flatibus.

nisi persuadere Nobis volunt, Sanis quidem considerandum
esse, quod Cælum, quod Tempus Anni sit; Ægris verò non esse.
Celsus Præfat. ad Librum I.

EDITIO PRIMA VENETA
Juxta ultimam LONDINENSEM.



VENETIIS, MDCCCLXIV.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

Superiorum Permissu, ac Privilegiis.

7-15-1894

RECEIVED

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894




Figure 1. Spherical



AMPLISSIMO VIRO,

HANS SLOANE, Baronetto,
Praefidi;

Illustribusque Regiae Societatis Londinensis
Sodalibus,

JOANNES HUXHAM.

S. D.

BENIGNE olim accepistis, or-
natissimi Viri! parva quædam
Opuscula nostra, inter quæ fuerunt
Observationes meteorologicae ab Anno
MDCCXXIV. ad MDCCXXVII. Jam
adeò consequuntur, quas per Decen-
nium proximè elapsum feci, summa
quidem Cura & non parco Labore in
Compendium redactæ: hisque adje-
cti sunt perpetui de Morbis Epidemi-
cis Commentarii.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione ed Approvazione del P. Fr. Filippo Rossi Lanzi Inquisitor General del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato, *Observationes de Aere, & Morbis Epidemicis ab anno 1728. ad finem anni 1737. & ab anno 1738. usque ad exitum 1748. His accedit Opusculum de Morbo Colico Damnoniensi. Auctore Joanne Huxham Tomi duo*, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi; concedemo Licenza a Lorenzo Baseggio Stampator di Venezia che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 9. Novemb. 1763.

{ Sebastian Zustinian Rif.

{ Alvise Vallareffo Rif.

{ Francesco Morosini 2^o. Kav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 186. al Num. 1033.

Davidde Marchesini Segr.

19. Novemb. 1763. Reg.

Francesco Gadaldini Segr.

PROLEGOMENA.

OMNIUM Animantium Vitæ nihil æquè necessarium est ac ipse Aer communis, quo sine ne vel per paucula Momenta protrahenda est. Cum verò maximas is variasque subeat Mutationes, harum Notatio & Historia non potest non esse Medicis summoperè utilis: quod optimus ille quidem, Artisquæ nostræ vetustissimus Magister, Hippocrates, nobis præcepit, atque præclaro commendavit Exemplo; quippe qui, in genuinis Epidemiorum Libris, Aeris Constitutionem Morbos vulgares antecedentem accuratè præscripsit. Idque Jure sane merito: Causæ namque Morborum fere omnium Epidemicorum sunt Constitutiones Atmosphæræ depravatæ; etiam ipsorum, qui proprie contagiosi vocantur, Incrementum & Duratio ex eadem Causa maxime pendent. Nonne enim uno Anno, in hac Urbe, aut hoc Oppido, unum tantum, alterumve, Variolis nempe, aut Morbillis, correptum videmus, alio autem, ab uno incipientem, Labem in innumeros disseminatam? Ita ut Aer ipse arcere, aut fovere, videatur ipsum contagium: Ignis veluti Scintilla, Fomiti injecta idoneo, immensum quantum Flammæ accendit undique! Humidæ contra occurrens Materiei extinguatur protinùs.

B

Quid

Quid sit quidem τὸ Θεῖον istud Hippocratis veterumque Medicorum, pro Causa Morborum pestilentium acceptum, haud probè scio. Si velint verò, nonnullis ut placet, peculiare aliquid ab irato Numine rebelli inflictum Populo, in Vindictam violatæ Legis, id utique Precibus humillimis, facta certè, non ficta, Pœnitentia aver- tendum est: quandoquidem vix ullus Medicinæ Locus, aut Spes sit ulla.

Sed hoc mittamus, utpote paulò abstrusius; & videamus breviter certos & manifestos Aeris Effectus in Corpora nostra; unde quàm necessaria sit Medico *Atmosphæræ* Consideratio & Ob- servatio facilè patebit.

Primò igitur. Respiratio, in qua quasi Vita ipsa consistit, Ope Aeris perficitur omninò: Vesiculas nempe Pulmonis dilatando vias facit patulas toti circulanti Sanguini, qui hic maxi- mam subit Mutationem. Factus enim lentus ni- mis & crassus ob tardum admodum per Venas ma- jores motum, Chylo etiam crudo resectus, è dex- tro Cordis Ventriculo minùs aptus *Circulationi* & Corporis Nutritioni expellitur. At per innu- merabiles minimasque Pulmonis *Arteriolas*, re- ticulari Plexu Vesiculas pulmonares texentes, distributus omnigenam ibi patitur Compressio- nem; partim ab inspirato Aere, à renitente Sanguine partim, & ab ipsa partim Vasculorum *Contractione*; iisque omni Momento variè agen- tibus; ita ut in Pulmonibus misceatur omni modo & conquassetur Sanguis, atque *Moleculæ* ejus crassiores inde comminuantur maximè. Hic etiam præcipuè Globuli Sanguinis rubri componi videntur è sex (uti per Microscopium patet) minoribus, sive *Serosis*, more quo Globulum Ar- genti

genti vivi majorem è minoribus formamus ; quod ipsum quoque vini quandam quasi & Compressionem postulat. Ibi porrò recentis Chyli Particulæ conteruntur , ita ut globosæ tandem fiant , ac animale induant Naturam : quæ omnia ulterius perficiuntur Actione Expirationis , Pulmone nempè se corrugante , atque Costis collabentibus pressio.

Adeò ut hoc viscus præcipuum Sanguificationis Organum æstimari debeat : non mirum ideo si , qui Infirmitate Pulmonum laborant , Cachectici fiunt & Hydropici , nec si , qui corruptum inspirant Aerem , morbidis.

Comminutio hæc & Attritus , ac ipsius Chyli Sanguificatio (sit venia verbo) in Pulmonibus sunt omnino necessaria ad Usus Naturæ , cum ad Nutritionem , tum ad motum Musculorum ; quia neutrum horum perfici videmus ab ullo Sanguine , nisi postquam Pulmones tranaverit : hoc enim notandum est ab Arteriis Coronariis ad ultimos usque Ramos Aortæ : ad hunc finem Animalcula quædam Spiracula habent pulmonalia à Capite ad Caudam usque.

Secundò. Aer non solùm ab Effluviis noxiis purus esse debet , sed & justæ insuper Gravitatis & Elasticitatis , ut Pulmones distendat satis ; nec tamen enormis , ne eos opprimat . Utcunque enim gravem valde , vel levem , Atmosphæram commodè satis ferant robustiores ; montesve incolant , imasve valles integri : non ita tamen infirmi , quibus harum Rerum paulò curiosior debetur Æstimatio . In Medicina utique facienda vides & quibus Boreas , Mercurium in Barometro attollens , officit maximè ; vides & quos , cum Mercurio , deprimit humidus Auster . Sed de

his infra; hic solum obiter notans altiores Habitationes illis eligendas esse, his humiliores; cætera si paria sint; pro Ratione enim situs, Aeris incumbentis Columna magis, minusve, producitur; adeoque Pressura ejus magis, minusve, intenditur: hinc aliqui prope Mare melius se habent, alii Locis in montanis.

Tertiò. Aer etiam Respirationi idoneus non nimis calidus esse debet, nec ultra modum frigidus: est enim Aeris inspirati temperare Sanguinis Calorem, qui aliter fervendo putresceret citò, ut patet ab Experimento præcellentissimi Boerhaavii in Hypocausto capto (vide Chem. caplt. de Igne Experim. xx. Corollar. 16.) Si Aer enim sit magis, aut æquè calidus ac Sanguis aliqujus Animalis, intra paucillulum Tempus moriatur necesse est.

Nec solum Sanguinem refrigerat Aer, sed, ne nimium ebulliendo vasa perumpat, impedit, cum nempe condensando. Atque hoc utique permagni est momenti, si cum doctissimo * Helvetio supponimus dextri Cordis Ventriculi Capacitatem majorem esse Cavitate sinistri, eamque pariter Arteriarum *pulmonicarum* multo excedere istam Venarum respondentium: nam consequitur inde, quod Sanguis debeat ab Aere inspirato esse valdè densatus, ut æqualis Cruoris Quantitas æquali eodemque Tempore recipi possit à Venis *pulmonalibus* & Ventriculo Cordis sinistro; pulsus scilicet Corde dextro per capaciores pulmonis Arterias. — Hoc quidem plurimi negant contrarium omninò statuentes. Est tamen necesse

* Vide *Eclaircissmens concernant la maniere dont l'Air agit sur le Sang dans les Poulmons*. Paris, 410. 1728.

P R O L E G O M E N A. v

esse prorsus ut Aorta ex Ventriculo Cordis sinistro tantum recipiat Sanguinis, quantum è Ventriculo dextro per Arteriam pulmoneam pellitur, idque æquali eodemque Tempore: fatale aliter Diluvium Pulmones obrueret brevi: quoniam utriusque Ventriculi Systole est Synchronica. Aortam ideò & Arteriam pulmonarem invenimus semper Diametro quàm proximè æquales, modò sint in Statu Naturali. Ob hanc igitur Causam Ventriculorum quoque Capacitates debent esse æquales, ut eodem etiam & æquali Temporis Spatio æquas possint recipere Sanguinis Quantitates. Eadem perinde Ratio necessaria videtur inter Arterias & Venas pulmonares (quod enim protrudunt Arteriæ, transmittunt Venæ). Nulla saltem datur necessitas, cur hæ Venæ factæ sint Arteriis capaciores: nam Aer ipse communis, quatenus Sanguine frigidior multo, eique per omnem intimumque Pulmonem Inspiratione applicatus non potest non Sanguinem condensare: tantum utique, ut reprimere sufficiat nimiam ejus Effervescentiam; cui quidem propter magnam Cruoris Agitationem, ac proindè Calorem, aliàs foret obnoxius valdè. Hinc Asthmatici Auram quàm frigidam haurire coguntur, urgente Paroxysmo: (ubi nempe Sanguis nimis in Pulmonibus turgescit) ne protinùs accederet Suffocatio. Sic qui Febre ardente laborant, qui Cursu, aut Luctatione valida, perturbant Humores, longè frequentius solito respirant: ut frigido novoque Aere, creberrimè attracto, ebullientem Sanguinem refrigerent satis, eumque debitos intra Cancellos coerceant.

Vis adeò inspirati Aeris tantum condensare Sanguinem in Pulmone debet, quantum vehem

mens ibidem particularum Attritus, ac massularum Comminutio, istum expandit: nimiam aliter in molem assurgeret rarefactus Sanguis; quod idem est ferè, ac si redundaret ipsa Quantitas. At cum Ventriculus Cordis sinister par solùm est dextro, qui capere potest auctam hanc molem? Si non, quæ inde Ruinæ?

Quod Ratio suadet, fida docet Cadaverum Inspectio, ubi Vasa Cordis & Pulmonis sicut descripsi inveniuntur, si sanis in Animalibus, recentissimè demortuis, quærentur. Iniquè verò admodum, diu post Mortem comparantur Venæ & Arteriæ ejus congruæ Diametri; huic enim ob Structuram longè magis *elasticam* inest contrahendi vis maxima, illi autem longè minor: hinc Arteriæ Sanguinis, saltem *Serosi*, vacuæ ferè inveniuntur & constrictæ; imò si Siphone, injecta nempe Cera, replentur utræque, Arteriæ multo magis quàm Venæ resistunt, nec ideò æqualem admittunt Distensionem. Idem de Ventriculis Cordis dicendum est, quandoquidem sinister crassior multo est, adeoque longè fortior dextro.

Ex iis jam, quæ suprà dicta sunt, liquet satis quàm utile est Ægris, præcipuè febricitantibus, Auram frigidiusculam, fervente potissimùm Æstate, subministrare. Vidi ego multoties Anxietates & Languores *febriles* momento ferè depulso, Fenestris tantùm apertis, quibus imprudens nutricula Spiritibus (uti dicitur) *volatilibus* perperam omninò mederi satagit; imò tunc adeò non juvant *Cardiaca* calidiora, ut etiam maximè noceant; longè meliùs enim Inspiratione Auræ frigidaë, & missione nonnunquam Sanguinis, abiguntur; quia ortum habent sæpissimè a Conges-
stione

stione & nimia Sanguinis Rarefactione in Pulmonibus. Oportet verò ut Aer, Pectori saluber, non sit nimium frigidus. Josephus d'Acosta refert Aerem ita frigidum esse Altissimum quendam super Montem Peruvianum, ut uno solum Flamine Sanguinem sæpe in Pulmone congelet.

Imò Hyberna Frigora Europæ, in Plagis potissimum borealibus, *Pulmonias* exitiales inferunt sæpissimè; quin etiam aliquando, non tantum Pulmones, sed & Artus etiam ipsi, ex Frigoris vehementia, Gangræna corripuntur. Peregrinantibus igitur per frigidam valdè *Atmosphæram* opportunum est maximè Liquores tepidos, eorumque Vapores sorbere frequenter; ad debitam nimirum Elasticitatem Vasorum *pulmonalium* & Sanguinis Fluorem conservandum: Haud utique Auram gelidiorem impune respirant jejuni, diras inde profectò novi Peripneumonias.

Hæc hætenus de Aeris Potentia in Pulmone; jam quæ sit in totum Corpus paucis videamus.

Primò itaque; consideremus Aerem, quatenus grave quoddam fluidum in nos perpetuò incumbens, haud minore quidem Pondere Hominem mediocris Staturæ premens quàm Librarum 32000. immane quantum Pondus! quod ex nobis quicquid est Liquoris exprimeret, ni Pressura foret æqualis undique, ni ex æquo resisterent inclusi Humores. Hoc autem sapientissimus nostrum omniumque Conditor, Deus, nobis fecit salutare maximè; nam & totam Corporis Compagem confirmat, & humores ejus coercet; imò vel hac ipsa Pressura (ut ego sanè sentio) haud parùm promovet ipsius Sanguinis circuitum: Siquidem totum Corpus ab incumbente

Atmosphæra comprimitur assidue, totus ideo ejusdem cruor per Venas versus Cor urgeatur necesse est, quum non possit, per Arterias, Cor petere retrorsum propter obstantes Valvulas. Tam parum utique motus originalis à Corde accepti, in Venis majoribus, Sanguini restat, ut vix Cor adusque ab imis Pedibus, ni ad Æquilibrium tantum perficiendum, ascenderet; (per Venas nimirum cum Arteriis continuatas, quasi per Siphonem inversum, cujus crura æqualis sint Altitudinis) ita tardus sanè ibi est Sanguinis Progressus, ut in Venis Artuum Valvulæ frequentes occurrant, ad Onus nempe incumbentis Sanguinis excipiendum, ne fortè relaberetur. Haud ergò ex se solo polleret (ut mihi videtur) vim propriam constringentem Cordis superare, ne dicam irruere in ejus Ventriculum, eumque dilatare.

Sanguinis ideò momentum adjuvat assidua *Atmosphære* Pressura, more velut *Antagonistæ* agens contra vim Cordis insitam & validè constringentem, quod plùs, minùsve, omni *Sphincteri* Musculo proprium est. Cùm primum enim, ope Inspirationis, explicatus Pulmo Locum dat expellendo è Corde Sanguini; factò nempe in Ductibus Pulmonum Sanguineis momentaneo quasi Vacuo, continuo in Cor dextrum impellit Sanguinis quantum facile capit Pondus *Atmosphære*, totum Corporis habitum comprimens semper. Eodem porrò ipso momento irruens, undique premens, & *elasticus* Aer haud exiguum addit impetum rapidissimis, per Pulmonem currentibus, Sanguinis Rivulis, ejusque Momentum tantum adauget, ut vel vim Cordis sinistri subigere possit: longè enim * longèque velocius currit Sanguis

* Vide Hales's *Hamastatics*, *Experim.* X.

Sanguis per pulmones quam per *Aortæ* Ramulos.

At de his satis; cum non sit hujus Opusculi accuratam circum acti Sanguinis Historiam perscribere: hoc solum, hic obiter, denotare volebam, Compressionem *Atmosphæræ* esse unam ex multis, eamque haud contemnendam Causam circuitus Sanguinis, quantumque immoderata Gravitas Aeris aut Levitas, accelerare Sanguinem, aut retardare potest.

Quum verò ab Historia *Barometri* clarissimè pateat, quod *Atmosphæræ* pondus uno Tempore majus est quam alio, Ratione fere $\frac{1}{10}$ totius Columnæ *baroscopicae*; non potest non esse quin tanta Differentia nos, sub ea versantes, afficiat maximè: quandoquidem haud minoris est ista quam Pondo Librarum 3200. cujus dimidium sanè, vel perpauca intra horas, sentimus sæpissimè. Suprà verò monstratum est pondus *Atmosphæræ* multum conferre ad *Circulationem* Sanguinis promovendam: major ergò ejusdem Gravitas Motum Cruoris auget, minor autem minuit. Hinc fit, quod dum Cælum ficcum (sit atque serenum; id est quando debita Gravitate & *Elasticitate* præditus sit Aer, alacres nos vegetosque percipimus: aucta namque Sanguinis Velocitate, cæteris paribus, Secretiones nostræ naturales & *Evacuationes* augentur, præcipuè *Perspiratio* (ut dicitur) *Sanctoriana*, quam, modò sit ordinata probè, consequitur Corporis & Animi Vigor. Major porrò in Corpora nostra Pressura Vasa sanguinea coarctat per totum Habitum Corporis externum, quod Effectu idem est, ac si Sanguinis ipsius Quantitas fuerit adaucta: nam non solum motos Humores incitat, sed & etiam quo

quo magis premitur Habitus exterior, eo plus Sanguinis ad interiores & maximè vitales Corporis Partes adigitur, unde fortior evadit earum Actio. Ideò non solùm in Pulmone meliùs lentescentem subigit Sanguinem crudumque *Chylum* purus & *elasticus* Aër, sed per totum quoque *Systema Vasorum*. Verum enimverò si permagna Gravitas Aeris & *Elasticitas* longo perdurat Tempore, Morbos producit ab aucto nimium Sanguinis Motu; cujusmodi sunt Pleuritides, Peripneumonix, Anginæ, Febres ardentes, atque id Genus alia: idque potissimum accedentibus aliis Aeris Qualitatibus, Frigoris scilicet, aut Caloris; ut videbimus infra.

Secundò; contrà omninò contrarias Corporis Affectiones, infert Aer debitæ Gravitationis & *Elasticitatis* expers: nam sequitur inde tardior Sanguinis *Circulatio*, diminutæ Secretiones, impedita *Perspiratio*, Lentorque tandem nimius humorum. Hinc ille Corporis & Animi Languor, quo ferè afficimur omnes, dum talis adest *Atmospharæ* Constitutio; quæ porrò, persistens usque, ista omnia auget indices: imò vel ipsa mala, Causæ originali succedentia, se mutuò promovent assiduè: demumque his omnibus accedunt Affectus *hysterici* & *hypochondriaci*, Febres intermittentes, remittentes, putridæ, lentæ, *nervosæ*, *petechiales*; Morbi denique omnes à nimio Lentore Sanguinis & segni ejus Circuitu pendentes.

Quoniam verò omnes *Atmospharæ* effectus, qui a Gravitate ejus, aut Levitate, oriuntur, vim plurimam ab ipsius secundariis Qualitatibus, frigore putà, aut Calore, Humiditate, aut Siccitate accipiunt; pauca quoque de his dicenda sunt.

I. De Aere frigido & sicco.

Omnia, quæ saltem attingit, Corporis vasa frigus coarctat: idem iste Annulus, quem Æstate vix digito induis, Hyeme frigida excutitur facillimè: supputa jam à contractione parvulæ istius partis quantum patitur totum. Vasa autem constricta longè fortius vibrant in contenta fluida, quam si sint bene laxa; à Frigore nempè Fibrarum *Elasticitas* augetur, adeoque major contractio vasorum & Humores magis atterit, & eorum simul accelerat motum: nam ut sunt vasorum capacitates inter se, per quæ eadem cruoris Quantitas, eodem Temporis spatio, fluere debet; sic sunt quoque, inversa Ratione, Liquidi istius Velocitates; diminuta adedò capacitate Velocitas augetur.

Quod verò Sanguinem attenuat, ejusque Velocitatem adauget, Secretiones fluidiores & Excretiones debitas promoveat necesse est, unde Functiones omnes Animales evadunt validiores. Quoniam verò hæc eadem facit gravis & *elasticus* Aer, cui frequentissimè quoque adjuncta est & frigiditas *Atmosphære*, & siccitas, unita vi Effectus edunt majores; adeò ut, dum conspirant unà, sæpe demum subsequatur vis Vitæ, quam vel par est, fortior; quæ tandem proinde suis & ipsa viribus ruit. Tam validus enim solida inter & fluida oritur Attritus, tam rapidus Sanguinis cursus; corrugata insuper à frigore cute, tanta dissipatio humidissimi, crassissimi autem Retentio, donec fit cruor acris valdè & maximè viscosus: dumque in vasa urgetur inepta morbos omnigenos *inflammatorii* Generis parit. Idque præsertim, cum immodica *Atmosphære* siccitas nec moderantem Fibris, nimium rigidis, Fotum præbet,

bet, nec Sanguini diluentis Humiditatis satis; quæ, dum suppetit, per cutis Poros attrahitur assidue.

Quod tamen quibusdam nocumento est maximo, plurimis inservit maximè, dumque hos Febres acutæ, *pleuritica*, *peripneumonica*, alios graves Asthmatis, *Rheumatismi*, aut Arthritidis, Paroxyismi corripunt; illos, firmosque serè omnes, alacres magis sanosque reddit Aer ponderosus, frigidus, ac siccus: nec incitat aliquid magis grave Belgarum vulgus quàm rigidum, diuque durans, Gelu; tunc Temporis enim vel cum lepidissimis Gallis Festivitate concertant. Hoc olim notavit Celsus Senex, Aphorism. 17. Sect. 3. quem sic vertit Cornel. Celsus: “ Aquilo sanum
“ Corpus spissat, & mobilius atque expeditius
“ reddit. “

2. De Aere frigido & humido; qui nobis quidem officit multum, quatenus Frigus ejus Corporis Poros constringit, eosdemque Humiditas occludit; horum alterutrum *Perspirationem* impedit plurimum: etiam ipsa Corpora *Electrica* in Aere humido longè parcius, quàm in sicco, Effluvia emittunt. Quam noxia sunt madida frigidaque Indusia, & Lodices, nemo non norit.

Imbrica porro & pluvia tempestas Gravitationem *Atmosphære* minuit, Humor ejus nimius vim Fibrarum enervat; utraque impetum Sanguinis impediunt, ac debitas proinde Secretiones & Excretiones. Hinc gignitur serosa Colluvies, Destillationes inde sequuntur & Tumores Faucium, Tusses & Anginæ, aliaque multa. Denique, si talis Tempestas manet diu, Febres *catarrhales*, intermittentes, putridæ, lentæ, *nervosæ*, ingruunt;

unt; ni per Cutim (quod optimum) aut Urim, aut per Alvum, exterminentur tempestivè retenti Humores: priusquam scilicet putrescere incipiunt.

Nec more solùm descripto nocet algida udaeque Aeris Temperies, sed & ipsa gelida Humiditas in ipsum Corpus attrahitur. Vel ipse Medicinæ Parens, Hippocrates, hanc Corporis imbibentem Facultatem, bis mille abhinc Annis asseruit; dum scilicet ὅλον τὸ Σῶμα non solum ἐκπνοον, sed & εἰσπνοον, esse pronunciavit: quæ verba ipse Galenus de Aeris ingressu per Cutis Poros interpretatur. Id verò abundè Experimenta probant, neque enim alia patet via Argenti vivi, aut Terebinthiæ particulis in Sanguinem, nisi per ipsos Cutis Poros; modò sint illitæ solùm, aut vel sub Forma Vaporis allectæ. Hoc idem satis superque confirmant Tentamina acutissimi Jacobi Keilei nostri; quinimò Humoris gelidi Absorptionem, summa cum Probabilitate, posuit pro Causa frequentissima istius Corporis invaletudinis, quæ vulgò *susceptum Frigus* nominatur: ipsis nimirum Particulis frigorificis (si placet Nitroæ: ris) unà cum Humore absorptis, quæ Sanguinem Lymphamque vitiant.

An verò datur reverà Principium aliquod frigorificum, Sal nempe Nitro-Aereus, ut à Μαγόνν vocatur, sive ullo alio Vocabulo id nominabis, eximios inter Philosophos dubitatur; Causam nempe omnis Frigoris ponentes in Privatione solùm Motus & Caloris. Hæc tamen Sententia haud mihi Herclè prorsùs arridet: nam posce modò, num in Calore aliquid magis positivum est quam in Frigore? nonne utriusque æquè subitanea & æque certa Sensatio est? quod
forfan

forſan non adeò eſt explicatu facile à ſola motus Ceſſatione: nec ex mera Privatione, aut Relatione, poſitivi fluunt Effectus, at è Frigore plurimi: Corporum quorundam Expansio, quorundam Condensatio, permanens mutatio & ſexcenta alia. Aqua, dum congelatur, expanditur, Argumentum ſanè materie alicujus ab extrà receptæ; aliter enim à ſola Caloris & Motus Abſentia condenſaretur: Sicut Metalla, quæ fuſa quidem dilatantur, rigeſcentia verò, minus occupant Spatium.

Porro Aqua, ex Gelu reſoluta, longè frigidior eſt, quàm quæ priùs congelata non fuerat, reſtatque diu ad plurimos Uſus inepta, ad quos ante Congelationem idonea fuiſſet; hoc vel mulierculæ notant: Imò, qui Gelu reſolutum perpoſtant, ſunt pluribus Morbis obnoxii; ideo Poeta — *Quis tumidum Guttur miratur in Alpibus?* Parùm utique video, cur Aquæ Congelatio ob meram motus Privationem efficeretur, ſi, cum ſummis Philoſophis, particulas ſuas conſtituentes *Sphæricas* eſſe ſtatuimus; quod maximè videtur probabile, quia nullus excitatur Calor utcunque vehementer agitetur Aqua; minimà enim intervenit Friçtio (Cauſa nempe Caloris) motas inter Sphæriculas. Nam ſequitur hinc planè, ſeu in Motu, ſeu in Quietè, quod in punctis ſolùm ſe mutuò contingere poſſunt; unde ne major quidem ob Quietem Cohæſio: quæ tamen infinitè major eſt in Gelu, quàm in Aqua. Porro autem Aqua in Vacuo difficillimè, ſi unquam, congelatur; ubi tamen ſatis certè Quietis: at ipſiſſima iſta Aqua, ad Contactum gelidi Aeris effuſa, dicto citiùs, etiam inter effundendum, in Glaciem abit; notante diligentiffimo Viro, *Fahreneit*.

neit: Act. Philosoph. Anglic. N. 382: requiritur ideo ab Aere aliquid ad Congelationem efficiendam.

Magis adeò probanda videtur eorum Opinio, qui Congelationis Causam arbitrantur Spiculas esse quasdam frigorificas, ab extrà admissas: quæ utcumque Globulos aqueos à se invicem dimoveant paululùm, Quantitatem tamen contactus hos inter & illas adaugent, & proinde mutuam eorum Cohærentiam. Ni ex hac forsan *Hypothesi*, vix alia datur Methodus, insignem istam Aquæ Expansionem, dum congelatur, explicandi: quæ verò Aquæ gelatæ Expansio evenit semper, sive Aeris fuerit expers, sive non.

Quoniam verò congelatio omnis artificiosa, Sale quodam mediante, perficitur, haud absurdum est credere Spiculas has frigorificas salinæ esse Naturæ.

Quod verò datur salinum aliquod Principium, per universam *Atmospharam* disseminatum, vero simile est admodum à Vitrioli Generatione in ipso Colcothare, utcumque Sale sit Destillatione, aut ullo alio modo, privatum. * Nitrum porrò de novo producitur, ex ipsa Terra damnata, ex ipsis insulsissimis Cineribus, modò hæc inter & apricum Aerem libera detur Communicatio. Unde oritur Nitrum, ut dicitur calcarium, nisi ab hoc Sale aereo? Nonne Ferrum, etiam super altissimas Turres, Ferruginem contrahit? quod ab eodem omninò evenit Principio. Plurima item Mineralia, & Glebæ metallicæ, pristinam recipiunt Naturam; licet vi Ignis omni fuissent orbata Sale, ex ipso nimirum Fonte. Sal hoc
univer-

* Vid. Frid. Hoffman. Historiam, &c. Nitri.

universum agnoscit illustrissimus Nevvton; utique ex Analyfi Chemica clarissimi Hombergii solvitur videtur & idem Parens & Origo omnigeni Salis prout scilicet sit hac, vel illa, Matrice receptum huic, vel illi Materiæ, coadunatum.

Atqui non prorsus alienum est credere hoc Sale nitrosæ esse Profapiæ, dum observamus & Nitri Aciculas, & Spiculas glaciales, imò Salinas ipsius Roris particulas, Forma esse simillimas. Quin etiam si reputamus, quæ referuntur à dignissimi Fide * Viris, de Armenia, Tartaria, China, &c. Terris nimirum Nitro quàm maximè abundantibus; quod ibi scilicet, quamvis Æstate Sol interdiu omnia quasi adurit, Noctu tamen sævi rigidum Gelu; magna adeò Copia decidentis Sale nitroso, quem Solis Ardor elevaverat. In nostra etiam Regione, post Diem calidiorem verno præsertim Tempore, observamus sæpe mane sequente stagna, camposque omnes, Glacies, ac Pruina, obductos: quod quidem vel ipsa Æstate contingeret, nisi vis Solis, tunc Temporis vehemens, particulas nitrosas, hic non æque ac in Oriente abundantes, diffringeret & proinde dissiparet. Hæc sanè arguere videntur, quod Abundantia Nitri aerei plus faciat ad Congelationem efficiendam, quàm sola Paucitas Ignis: media enim Hyeme, cùm *Thermometrum* longè majus denotet Frigus, nusquam sæpe apparet vel minima Glacies. Gradus utique Frigoris, quo Glacies producitur, minimè quidem stabilis & certus est; Glaciem namque sæpe notavi Mense Martio, aut Aprili, cùm Spiritus Thermometri

Hau-

* Tournesort, Voyage du Levant, Lettr. 18. Le Comte Itinerar. Chinois.

Hauksbeiani fuerit ad 55. tantum: è contrà nullam omninò Mense Decembri, cum descenderit usque ad 65. Sed de his satis.

3. Itaque de Calore Aeris, eique accedente Humiditate. Calor omnia, vel ipsum Ferrum, expandit; multò magis ideò Humores Corporis humani ejusque Vasa; Sanguinis autem Rarefactio, & Vasorum Relaxatio, de Momento circulantium Humororum detrahit: Secretiones hinc deficient & Vires; hac ergo de Causa non æque sumus agiles Æstate, ac Hyeme, aut Tempore verno. Qui torridas habitant Regiones, vix sunt, nisi Noctu, ad Munera Vitæ obeunda habiles, tota fere Die dormiunt, præcipue ardente Sole.

At si æstiuosa simul sit Atmosphæra & humida nimis, de sanitate periclitatur admodum. Est calidi, est etiam & humidi, laxare Fibras; quid conjuncta? eas ferè omninò resolvunt. Imò quandoquidem uda Aeris Temperies plerumque etiam Levitate peccat, quod ut vidimus suprà, vim circulantem minuit multum, & quoniam humidus Aer *Perspirationem* insuper inhibet valdè, meritò prorsus, ab ultima Antiquitate, talis *Atmosphæra* Constitutio reputata fuit pestilens.

Obstructi adeò Humores fiunt indies magis magisque acres, ob defectum Motus idonei Lympha lentescit, Cruor fere in Grumos facessit, ejusque Sales, se mutuò attrahendo, in noxias abeunt *Moleculas*, brevique putrescunt Humores. Morbi proinde quamplurimi oriuntur, & acuti, & *chronici*, cum durat diu gravis adeò & infelix Cœli Constitutio; in qua, brevis sit utcunque mora, vel validissimus Homo vim Corporis &

Animi languidiorem fieri citò persentit': Aer enim Vaporibus, præsertim sulphureis (ut Experimenta nobilis Boylei & acutissimi Halesii monstrant) onustus plurimum *Elasticitatis* suæ protinus amittit; adeò ut vix explicandi Pulmones vim retineat: unde paulò ante, & cum Fulgura vibrantur, haud pauci Spiritum difficulter admodum trahunt; *Atmosfera* tunc nempe Vaporibus sulphureis æstuante. Hac porrò de Causa imbecilliores quamplurimi, ne vel per Diem unum, alterumve, sufferre queunt ingratum Urbis Aerem, Fumis pollutum innumeris; qui tamen commodè satis, imò alacrem Rure degunt Vitam. Ad rectam utique Valetudinem tanti conducit purum & apricum respirare Aerem, ut absque eo, in Morbis quamplurimis, vix ulla alia Medicina proficiat: quod tam sæpe notavi, ut non possim quin, cum elegantissimo Poeta, clamem,

*O fortunatos nimium, sua si Bona norint,
Agricolas! ———*

Quorum nempe & Otia & Negotia saluberrimis in Agris peraguntur. Aura quippe rustica longè magis pura est, & *elastica*, quàm quæ, infinitis urbanis Sordibus contaminata, gravis admodum & insalubris evadit; æstivo præsertim Tempore, cum Solis Ardor omnigenos excitat Vapores. Est insuper tunc frigida magis, ac Halitu saluberrimo Herbarum Spirituque Terræ vegetissima, ad recreandas Vires, & Pulmones expandendos, fit idonea maximè; nec verò pinguibus fœdata Vaporibus, vel minimè, *Perspirationi* officit; quin eam promovet plurimum.

Tanta

Tanta hinc nos perfundit Alacritate purus & pergratus Ruris Aer, dum & Respirationi, & Perspirationi, tantoperè simul inservit.

4. De Aere calido, & sicco; qui, licet Constitutione modò descripta longè salubrior, tamen haud est innoxius; præcipuè si diutiùs maneat. Aer namque siccus magna plerumque Gravitate pollet & *Elasticitate*, quod Motum Sanguinis multùm incitat: quatenùs verò calidus est, Humores perspirantes exhaurit maximè, unde *Serosa* Pars Sanguinis dissipatur, & liquidissima Corporis avolant: restat adeò Cruor spissus nimium; nihil namque jam humidi ex *Atmosfera* torrida per Cutis Poros imbibitur. Hinc magnus sequitur & validus Sanguinis Attritus, ac proinde Calor; qui, & ab extrà item auctus indies, salinas & sulphureas Humorum Partes exacuit assiduè, donec tandem fiunt acerrimæ: idque eo magis, quo minùs jam in Pulmone refrigeratur Sanguis. Si suavissimum Butyrum, vel quodvis Oleum animale, intenso Solis Ardori exposis diu, brevi abit in Liquamen *alcalinum* putridum & valdè *corrosivum*. Sic diuturnus Æstatis Fervor utque adeò torret Humores animales, ut longè acriores sub Autumnum sint, quàm verno Tempore. Hæc utique est Adustio ista Sanguinis, à veteribus toties memorata: Siquidem magna hinc copia Bilis acerrimæ generatur; inde Cholera, *Dysenteria*, Colica biliosa, putrida & (ut dicuntur) Febres malignæ, ineunte Autumno, ita sunt frequentes. Torridæ sanè Zonæ vehemens Ardor usque adeò exhaurit Incolarum Humores, usque adeò crispas Fibras, ut quasi perusti videantur. Imò ex Relatione Medicorum, qui fervidis in his Regionibus Artem

exercuerunt, Sanguis eorum longè magis crassus est & niger, quàm in Hominibus Europæis: hinc Febres ardentissimæ & pestilenciales iis in Locis *endemia* sunt, putrescentibus scilicet levissima de Causa Humoribus.

Magnus utiquè Medicinæ Dictator, Hippocrates, non solum Morbos diversos, sed & Temperamenta, imò & Mores Hominum, ab Aeris Varietate maximè pendere statuit, in pulcherrimo de Aere, Aquis, &c. Libro: cum quo sanè consentit omninò fidus ejus Interpres, Galenus, in Commentar. & alibi de Temperatur. Præcipuè in Capite ὅτι τὰ τῆς ψυχῆς ἥθη, &c. Hoc innuit etiam eleganter Lucretius, Lib. vi.

*Nam quid Britannum Cælum differre putamus,
Et quod in Ægypto'st, qua Mundi claudicat Axis?
Quidve quod in Ponto'st differre à Gadibus, atque
Usque ad nigra Virum, percoëtaque Sæcla Calore?
Quæ cum quattuor inter se diversa videmus,
Quattuor à Ventis, & Cæli Partibus esse,
Tum Color & Facies Hominum distare videntur,
Largiter, & morbi generatim Sæcla tenere.*

Horum autem paulò infrà hanc reddit Rationem,

—— varius concinnat id Aer:

Sin autem varia Aeris diversorum Climatum Temperies varios omninò producit morbos, cur non & varia etiam, vel ejusdem Regionis, Tempestas diversos perinde gignat Corporis Affectus? Atque ità se profectò Res habet; verno nimirum Tempore, si longi præcipuè, ac sicci, Venti boreales continuarint, Febres *inflammatoria*, Pleuritides,

ritides, Peripneumoniæ, Anginæ certo certius invadunt. Autumno contra Febres lentæ, putridæ, quartanæ, Cholerae, Dysenteriae, &c. ferè sæviunt semper. Sic itidem, alii prorsus oriuntur morbi sub humido tepidoque Cælo, alii autem omninò & diversi sub frigido siccoque. Observationes equidem hujusmodi perpetuæ fuerunt ab Ævo Hippocratis huc usque; totam adeo superiorem Doctrinam confirmare videntur. “ Non quòd non omni Tempestatum Genere Homines, per omnia Genera morborum & ægrotent, & moriantur; sed quòd frequentius tamen quædam eveniunt. “ Sic latinus Hippocrates, Lib. ii. Præfat. — Ista Dubio procul Constitutio Aeris est salutifera maximè, quæ, ex stabilita Lege Naturæ, propriæ Anni Tempestati respondet: ideò nec Hyems tepida juvat, nec Æstas pluvia.

Quoniam verò diversa Atmosphæræ Constitutio, diverso planè modo Corpora humana afficit, ratio certe & modus hujus Diversitatis semper a Medicis est conspiciendus; &, quod de Locorum differentia dixit Celsus, æquè verum est de Varietate Tempestatum: “ differre nempe, pro Natura Locorum, Genera Medicinæ, & aliud Opus esse Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia. “ Hoc quidem abundè testantur Medici diversarum Gentium, diversis utentes Methodis; quæ tamen omnes ad Sanitatem Ægros felicissimè perducunt. Nonne ergo & Ratio quoque habenda est variarum Atmosphæræ Constitutionum, vel in eadem Regione? Optimus ille quidem, ac diligentissimus Observator, Sydenhamius, notavit; “ qua Methodo, currente Anno, Ægrotos liberaveris, eadem ipsa, Anno

“ jam vertente forsitan e medio tolles. ” Uno proclamant Ore Medici, quòd morbi vernaless multo feliciùs Sanguinis Missionem admittant quàm Autumnales: & hinc illæ forsàn Sydenhamii Lacrymæ, qui fuit semper in Venæ Sectione multus admodùm. Morbi sanè, vel Generis ejusdem (ut constanter observavi) largiorem longe possunt Sanguinis Detractionem, eamque multo faciliùs ferunt Ægroti, dum siccum adest Cœlum, & elata perstat *Barometri* Statio, quàm dum æstuosa Aeris Humiditas vim ferè Vasorum resolvit. Hoc utique perpetuum est, vel in ipsis morbis pectoris. Asclepiades olim, ut refert Cœlius Aurelianus, observavit “ apud Athenas atque Urbem Romam, “ Phlebotomia vexatos (utor Aureliani Verbis) “ vel pejùs acceptos esse Pleuriticos, in Pario “ verò atque Hellesponto resumptos ac relevatos.” Roma nimirùm atque Athenæ humidiores longè & tepidiores gaudent Aere quam Hellesponti Regio, sicco, ac sæpe perfrigido, Vento Asiatico perflata.

Robusti certe & firmi Homines facilè ferunt Sanguinis missionem; flaccidi verò, etsi æquè succidi, non ita: quia, propter Debilitatem Fibrarum, Æquilibrium Solida inter & Fluida haud restituitur confestim; unde sequitur brevis quasi Sanguinis stagnatio. Pondus autem *Atmosphæræ* magnum universum Corporis Habitum premit validè & corroborat, ac proinde Sanguinis motum incitat. Frigus, siccitate præsertim adjuncta, vim Fibrarum adauget plurimùm; accedentibus adeò simul utrisque, vis Vitæ fortior evadit, & vel ipse Corporis Habitus pro Tempore velut mutatus videtur; unde, tali durante

rante Aeris *Catastasi*, vel infirmiores ex facili
tolerant Venæ Sectionem.

Non solum in Morbis curandis plurimum va-
let Atmosphæræ consideratio, sed ad Sanita-
tem etiam tuendam maximi est momenti. Con-
traria contrariis curantur, ut in Adagio est: sic si
Ver frigidum & siccum est, Pleuritide, Peripneu-
monia, Angina, periclitamur; qui verò Diæta hu-
meſtante utuntur & Potione tepida laxante, vitio
Tempeſtatis occurrunt, morbosque evadunt ut plu-
rimum. Si Frigori autem accedit humidum multum,
Cardiaca quædam admiscenda sunt, Corpusque Ve-
ſtibus muniendum est probè, ne *Perspiratio* inhi-
beatur nimis. Æſtuosa contra udaeque Aeris Tem-
peries ſiccam omninò & astringentem poſcit Diæ-
tam, Vinum & austum Aqua frigida dilutum,
denique quæ & Vim Fibrarum comprimantem
firment, & à Sanguine Lentorem ac Putredinem
arceant. Balneum porrò tunc frigidum idoneum
est maximè. Quæ contrà Humore nimio & Tepore
pollent, aliena sunt prorsus; jurulenta ideò tunc
vitanda sunt, & tepida muliercularum Sorbitio.

Certè nullo non Tempore Anni Morbi inva-
dunt, Autumno autem quamplurimi; nam tunc
fere “ meridianis Temporibus Calor, nocturnis
“ atque matutinis, simulque etiam vespertinis
“ Frigus, est: Corpus ergo, subinde meridia-
“ nis Caloribus relaxatum, subito Frigore exci-
“ pitur. “ Hæc rectè Celsus, Lib. ii. cap. i.
Sanctorius observavit insuper, quòd ab Æqui-
noctio autumnali ad Solstitium hyemale, qua-
libet Die, minus Libra circiter perspiramus:
Medicin. Static. Sect. 2. Aphor. 41. tantoperè
nimirum prohibent *Perspirationem* humida Au-
tumni Frigora: eoque magis tunc huic ob-

noxium est malo Corpus, quo magis relaxata sint Vascula æstivo Calore, unde non satis validè propellebant contenta Fluida, quæ majorem indies Lentorem proinde contrahebant.

Si jam & his addamus, quantum Æstatis Ardor percoxerit Humores, iisque majorem induxerit Acrimoniam; haud mirum utique videbitur, si Autumnus plurimos opprimat incautos: tunc enim Humores sunt acriores solito, & eorum *Perspiratio* impedita plurimum. — His verò perpensis, Methodus *prophylactica* manifesto apparet, quæ scilicet & Fibras corroborare, ac debitam Sanguinis Fluxionem conservare potest: quibus nempe *Perspiratio* pergat ordinata probè & satis constans. Interponi verò, si quid ego judico, debent *Eccoprotica* quædam subinde, ad biliosam Colluviem evacuandam: hoc sæpe Alma molitur Natura, ea nempe gravata, *Diarrhæa*; Cholera, seu *Dysenteria*, excitatis: quibus autem tempestitiva Rhei barbari Dosis, repetita prudenter, occurrerit omninò, naturamque levaverit æquè.

Sexcenta utique hujusmodi dicenda essent, ni prælonga forent & obvia satis Lectoribus idoneis: Quorum nemo jam fortè dubitat, quin diligens *Atmosphææ* Contemplatio sit Medicis perutilis admodum.

Quod ad Methodum attinet & Medicinam, quas variis in morbis infrà laudavi, non sunt equidem vana Musei Commenta; sed, quæ, per multos jam Annos comprobata, successerunt optimè; imò (si id sit alicujus Momenti) in splendidis sæpe Personis: tanta scilicet Remediis, mihi probè expertis, fuit Fiducia.

Formulas quidem Medicamentorum exhibui nullas, quod sane vix aliquid sapit præter Osten-
tatioz

rationem Artis & pomposam Scientiæ Venditationem. Ille solum, cui Natura Morbi perspicitur, intelligit bene, quæ poscit Remedia. Plures audiui totas blaterantes *Pharmacopœias*, qui tamen ne intellexerint quidem quid vel ipse Pulsus significabat. Concinnam utique ac simplicem præscribendi Formulam laudo maximè, minimè verò Farraginem medicamentosam, ultra Garamantas, & Indos sæpe petitam, solo plerumque Novitatis Amore conscriptam. Longè verò, longèque magis, ridicula Praxis eorum est, qui temeraria Manu universalia porrigunt Arcana; omnibus scilicet Morbis accomodata: quasi nimirum esset in Natura Rerum, ut ipsissimum illud, quale demum cunque fuerit, stricto nimium, pariterque laxo, Corporis Habitui mederetur æque, ut rapidam æque contunderet Febrē, lentumque Hydropem. Sed *page Nugas! Si Populus vult decipi, decipiatur.*

Hæc Tu Romane carveto! — Sed Romæ Quis non?
Pers.

Sequentes Observationes factæ fuerunt omninò ad modum, quem præclarissimus noster JURINIUS in Actis Philosophicis, N. 379. descripsit; quemque jam omnes fere sequuntur, præ cæteris laudatissima Societas Edenburgensis. *Barometrum* nempe ex Tubo satis amplo & Cisterna latissima constructum est: Argentum Vivum verò, quo implentur, purissimum Destillatione præparaveram. *Thermometrum* idoneo situm est Loco, quod fabricavit *Hauksbeius*. *Barometrum* ad Mensē Julium, Anno MDCCXXXIII. supra Maris infimi Superficiem steterat 46. Pedes circiter;

citer; ab isto Anno autem & Mense, huc usque, fuit ad 30. Pedes tantum. Humiditatem Aeris per varia *Ihygrosopia* notavi; præcipuum verò est ad Formam D. D. Molyneux Act. Philosoph. N. 172. Infundibulo utor Diametro 25. Digtos lata, eoque circulari, ad Pluviam excipendam: ita verò positum est, ut æquè pateat undique omni Vento.

Sequens *Schema* Ventorum ex Plinio excerpti, ut notius foret de qua Plaga Cœli Ventus spirabat, cùm hoc, vel illo, nomine utor. Ubi verò & Vis Venti & Directio notatur simul, Literis usus sum Pyxidi nauticæ inscriptis vulgò, *i. e.* E. VV. N. S. & compositis N. E. N. VV. S E. S VV. & sic deinceps.

Non sum nescius utique quòd Varro duodecim facit Tractus Ventorum; Vitruvius etiam Viginti quatuor, illosque miris quibusdam Vocibus, ut erat earum amantissimus, distinguit. Tabula verò * Plinii, seu, ut vocat, Tympanum circinatum, ad generalem Ventorum Distinctionem facit satis; porrò eorum Nomina Pliniana diu fuerant Civitate Romana donata.

Favorimus equidem, apud † Aulum Gellium, discrepat a Plinio in Verbis Eurus, Caurus sive Argestes, Africus sive Libs: Eurus enim ad Exortum æquinoctialem refert, Plinius verò & Seneca ad Exortum hybernum, habentque auctoritatem Aristotelis, Lib. 2. *Μετεωρολογικ.* Capit. 6. qui expressè dicit *Ευρος, ἀπ' Ἀνατολῆς Χειμερῶν πνεῖ*; sic in Libro Aristoteli perperam adscripto,

* Confer. Caput 47. Lib. 2. cum Capite 34. Lib. 18.

† Lib. 2. Capit. 22.

πτο, περὶ Κοσμῶ Caput. 4. Ἐυρος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς περὶ
τὰς χειμερινῶς, &c. Dubitat porro ꝑ Seneca an
Argestes idem sit quod Corus; imò Favorinus
ait quòd Argestes, seu Corus, adversus Aquilo-
nem flat, & quòd Libs, sive Africus, contra
Vulturum: sed forte corruptus est hic Gellii
Locus. Nemo enim antè Corum pro Vento in-
ter Meridiem & Occidentem usurpavit unquam;
& qui potest * * Africus ex Africa ad Italiam
spirare, nisi ex Plagis Australibus? Idem de Libe
dicendum est, quòd ex Libya ad Græciam, un-
de Ventus iste Λίψ dictus est. Audi iterum
Aristotelem, Loco suprà citato de Enumeratione
Ventorum, Ἀργέστης ἀπὸ Δυσμῆς θερμῆς πνεῖ —
Λίψ ἀπὸ Δυσμῆς χειμερινῆς. Quid si Corus à ῥ,
Frigus? semper enim inter Ventos frigidos annu-
meratur: Sic Virgilius Lib. 3. Georgic. v. 356.

— *Semper spirantes Frigora Cauri.*

Argestes itidem apud Ovidium Libro 5. Fa-
storum.

Frigidus Argestes summas mulcebit Aristas.

Plymuthum Oppidum situm est ad ipsum Sinum
Portus amplissimi, qui longè latèque patet Ven-
tis australibus. Ex Oriente munitur & Occi-
dente altissimis Clivis, ad imum verò clauditur
Rupi-

ꝑ Vide Seneca Quæst. natural. Lib. 5. Cap. 16.

** Vide Horat. Od. 3. Lib. 1.

— nec timuit præcipitem Africum
Decertantem Aquilonibus.

Rupibus marmoreis: porrò utroque ejus à Lætere Æstuarium longe porrigitur. Surgunt à Tergo montes continui ad ipsas usque Alpes Damnonienses, decimum circa Lapidem distantes. — Oppidi Situm ideò descripsi, ut magis forsan (inter cætera) pateret Ratio tantæ Pluviæ, quæ hic ruit quotannis. — Ab alto nimirum Oceano, Vaporibus Nubibusque latissimus, duo inter Promontoria excelsa, Aditus panditur; quæ arduis proinde Clivis utrinque coacta, ad intimum adiguntur Sinum, ubi scopulis montibusque impingentia condensantur, tandemque sub Forma Pluviæ decidunt. — Neque hic jam memoro, quod huic haud parum adjicit Articulo, hanc Oram nempe Britannia, in modum quasi Isthmi, duo inter Maria longè porrectam.

Eo quidem lubentiùs Historiam *meteorologicam* sequentem edidi, quo magis utiliore eam fore judicavi: quandoquidem nihil hujusce modi, quantum memini, in hac occidua Parte Britannia inceptum fuit antehàc unquam. Atqui ex ipsa Argumenti Natura Latinis ego potius Literis, quàm vernaculis, sequentia descripsi: quibus siquidem Gens nostra cum Exteris Observationes suas communicare potest, illi pariter cum nobis vicissim. In hac sanè Palæstra jam plurimi, ubique fere Gentium, versantur: utinam tandem aliquando ex plurimis, diu continuatis, & toto penè Terrarum Orbe captis Experimentis extaret demùm generalis aliqua & perfecta *Atmosphæra* Historia! Opus certè utilissimum, diu multumque desideratum! Hunc ergo Obolum in Ærarium publicum conjicio, in quo
qui-

PROLEGOMENA. xxix

quidem exarando Diligentiae plurimum insumpsi;
licet Elegantiae parum; quippe Medicum ago;
non Rhetorem.

*Non nobis licet esse tam disertis,
Qui musas colimus severiores.*

Martial.

NOTÆ

NOTÆ sequentes, quæ in Opere passim occurrunt, sic explicandæ sunt.

AB i. e. Lumen Boreale ; .viz. Mense Martio, 1728. sic habens: *AB* 22. 10. P.M. VV N VV 1.; ita porrò legendum: Lumen erat Boreale Die 22. Martii, Hora Noctis decima, Vento VV N VV leniter spirante.

I Ad Diei alicujus pluvii Numerum superscripta significat isto Die haud exiguum decidisse Pluviam;

II multam;

III graviolem corruisse Pluviam;

IIII gravissimam.

Ubi Dierum Numeri Linea conjunguntur, viz. 12 — 16. significatur aliquam Pluviam omni Die, à 12. ad 16. decidisse.

X ad Caput Figuræ, Ventî vim denotantis, indicat Ventum istius Ordinis fortem; ad Imum verò, lenem; adeò ut 4^x vehementem denotet Procellam.

Per omnia Stylo utor *Juliano*, sive vetere:

Observationes factæ fuerunt bis Die plerumque, scilicet Hora fere octava matutina & sexta pomeridiana.

Literæ Romanæ, (A.) (B.) (C.) &c. ad Notationes referunt.

OBSER:

OBSERVATIONES

DE

Aere & Morbis Epidemicis.

ANNO MDCCXXVII. retorridæ Æstati (majore quàm antehàc unquam Erucarum Numero infestæ) successit Hyems pluvia satis, nec intempesta valdè, ni quòd interfuit siccus admodùm Mensis Novemb. crasso tamen valdè nubiloque Cælo fœdatus. *Mercurius* interim in *Barometro* ad Stationem præaltam evectus est. Venti orientales plerumque, aut aquilonares, afflabant, haud verò insequabatur tempestivum Gelu. Delabente *Barometro*, Decembris Initio, quàmplurima decidit Pluvia, paulò post autem resurgente Gelu rigidum invasit, a Die decimo octavo scilicet ad vigesimum secundum: Pluvia inde ad Finem usque.

Morbilli, qui toto Mense Julio Sextilique evanuerant, medio Septembri recurrebant, Pluresque adoriebantur indies; malique admodùm fuere Moris Octobri & Novembri. Pari cum his Passu progressa Tussis convulsiva quàmplurimos invasit Pueros, donec uterque morbus Caput subduxit Mense Decembri. Porro durante Octobri

3 OBSERVATIONES. [1727
bri & Novembri * Febris lenta *nervosa* haud
paucos corripuit; Tussisque vehemens in omnes
fere (A) Equos grassata est, quæ ad Finem us-
que Decembris perduravit, è qua tandem Pars
major evasit.

Ad hunc admodum desinebat Annus
MDCCXXVII. cujus exeuntis Historiam ego at-
tigi leviter, ut, siqua forsan per Conjecturas
liceret, sequentium Morborum Causas rimare-
mur: neque enim, *Epidemicorum* Naturam in-
vestigando, solum intersit cognoscere quales Dies
sint, sed & (B) quales etiam præcesserint antè;
ut cum Celso loquar, Libro secundo, Capit. I.

Totam Pluviae Quantitatem, quæ decidit hoc
Anno, sic habeto.

	Dig. Dec.		Dig. Dec.
Januario,	2.965	Februario,	4.452
Martio,	1.868	Aprili,	1.511
Maior,	5.902	Junio,	2.483
Julio,	1.080	Augusto,	0.299
Septembri,	3.867	Octobri,	2.490
Novembri,	0.826	Decembri,	4.172
			Dig. Dec.
		Summa Quantitas,	31.915.

Breves quadam Notationes.

(A) In Obsidione Trojana, primò Canes;
mox Muli, post Homines, Peste correpti fue-
runt. Haud semel observavi morbum inter Pecora
erupisse

* Vidè infra Dissertat. de hac Febre, pag. 147.

1727) *de Aere & Morbis Epidemicis.* 3

erupisse primò, dein eum ipsum paulò post Tem-
pore in Homines *epidemicè* sæviisse; quod &
Anno MDCCXXVIII. & MDCCXXXIII. fuit ma-
nifestissimum: in quibus nempe Tussis gravissima
omnes penè Equos corripuit uno, alterove,
Mense citiùs quàm Homines.

Quum nimirum hoc Animantium Genus
maximè sub Dio versetur, morbosæ Aeris *Dia-*
thesi sit valdè obnoxium necesse est, non tantum
Aerem inquinatum respirando, eumque per Cu-
tis *Poros* imbibendo forsitan; sed, dum Aquas
hauriunt, & carpunt Gramen, condensatam quasi
sub Specie Roris *Atmosphæram*, morbidis Parti-
culis contaminatam, exugunt: nam ut Lucre-
tius Libro vi.

*Aut in Aquas cadit, aut Fruges persidit in ipsas,
Pestilitas.*

Inde est fortassè, quòd morbi hujusmodi *epidemicè*
longè frequentius inter Rusticos & Paganos ori-
untur, quàm Incolas inter Urbium & Oppido-
rum; in his quippe Locis Ignes perpetui,
Frequentia Hominum, atque id Genus alia, gra-
vem noxiumque Aerem mutant maximè, aut om-
ninò depellunt: donec ita tandem sit onustus
morbosa materia, ut, rupto quasi Aggere, Tor-
rentis ad instar, irruat ubique. Hoc hisce sit
Argumento, quòd, qui intra Domicilia lucu-
lenta versabantur assiduè, rariùs *Epidemico* Anni
MDCCXXVIII & MDCCXXXIII, correpti fue-
runt.

(A) Constat utique à primo Autumno *Atmos-*
phæram fuisse crassam admodum, & Vaporibus
plurimis onustam, quos Ardor vehemens præ-
D gressæ

gressæ Tempestatis elevaverat: qui, licet hic ita condensati fuerint, ut, sæpe sub Forma Pluviæ, durante Septembri & Octobri, deciderent, atque ita nostrum non inquinarent Aerem; in aliis tamen Locis & September & October fuere crassissimo Aere foedati, & Menses proinde insaluberrimi. Per Novembrem certè, Aer, etiam hic, fuit crassus admodum & gravissimus, omni-gena nempe Fuligine è retorrída Tellure exhalata obscuratus: atque ab hac causa tanti fuit Ponderis, non à pura sua *Elasticitate* & *Gravitate* propria, quæ Vapores evehunt altiùs, eosque dispergunt æquabiliter.

Qui præsentem *Atmosphæræ* Faciem, dum Morborum *Epidemicorum* Causas disquirunt, intuentur solùm, nec respiciunt elapsam, parum utique vident, aut eorum Causas, aut Naturam: Exemplo sit Aeris Constitutio sicca & frigida, quæ, non tantùm uno, vel & altero, Die durans, nimiam Fibrarum Rigiditatem generat, & morbidam Humorù Densitatem, nisi & per Dies aliquot continuos duraverit. Rarissimè vides graves & pestilentes Febres fieri valdè *epidemicas*, si non post eximiam aliquam *Atmosphæræ* Qualitatem, diu perstantem.

Per Constitutiones Aeris mutabiles, Fibras fortè nimium corrugat hodiè siccus frigidusque Boreas, cras eas fortè relaxat nimis humidus Auster: ita quoddam quasi *Æquilibrium*, in quo Sanitas consistit, servatur; atque id maxime profectò, si quis probè cavet subitas has mutationes. Haud rarò herclè notavi, post Procellas gravesque Pluvias, Febres *epidemicas* multùm fuisse imminutas, & vi & numero; *Effluviis* nempe contagiosis & *morbificis Atmosphæræ*

1727) de *Aere & Morbis Epidemicis*. §
phæra Conspirationibus, hoc modo, dispersis;
Ideò fortè divus Augustus, cum in Gallia moræ
retur, Templum & vovit & fecit Circio, Vento
vehementissimo; eique Turbini, etsi Ædificia
sæpe diruenti, Gratias publicas agebat Gens Gal-
lica olim, referente * Seneca: utpote cui Salu-
britatem Cœli sui deberet.

* *Question. Natural. Lib. 5. Cap. 17.*



D E

CONSTITUTIONE

Aeris & Morbis Epidemicis,

Anno MDCCXXVIII.

J A N U A R I O.

PLUVIOSA admodum (A) humidaque Tempestas induxit Annum; in ipso quippe Mense Januario cecidit Pluvia ad Dig. 6. 108. immensa Quantitas! Fuit porro Nivis aliquantum, Gelu parum valdè, Procellæ utique satis. *Mercurius* in *Barometro* depressus fuit maximè, ab ipso Initio Diem XXI. adusque, sæpe infra 29. 0. Ventus ut plurimum australis erat, vel occiduus, isque sæpe nimbosus: sub finem Mensis autem Subsolanus, fiante nonnunquam Borea, Cælo Apricitatem & Columnæ mercuriali Altitudinem dedit, Nive subinde, aut Gelu sequente. A xxvi. ad xxviii. haud parum Pluviæ cecidit, etsi *Baroscopium* fuit ad 30. 0. & altius, Vulturno spirante: Argumentum sanè Aerem onustum esse Vaporibus adhucdum.

Pluvia

1728) De Constitutione Aeris, &c. 7

Pluvia Die $\frac{11}{1}$. — $\frac{111}{6}$. — $\frac{11}{8}$. — $\frac{1}{10}$. $\frac{111}{13}$. $\frac{11}{14}$. 16. $\frac{11}{17}$.
 $\frac{111}{18}$. $\frac{1111}{19}$. — 22. 26. $\frac{11}{28}$.

Vehemens Grando corruit 15. p. m. S S VV 3.
Nix gravis 23. a m. E N E 3.

Tota Quantitas adeò Aquæ pluvix collectæ
æquabat 6. 108.

(B) Maximi Maris Æstus inundantes 18. 19.
S S E 3^x. Barom. 28. 5.

ii Altitudo maxima fuit Die 31. viz. 50. 2. E b N. 2.
— minima — 18. — 28. 5. S S E 3^x.
Barometri media Altitudo 29. $3\frac{17}{31}$
Dies frigidissima fuit 25. Therm. Hauks. 69. N N VV 1.
— tepidissima — 3. — — — 50. S VV 1.
Temperies Aeris media $56\frac{5}{31}$

Ab incipiente Mense Tusses & Catarrhi fuerunt
valdè frequentes, sæpe cum Tumore Faucium
molesto, levi comitante Febricula plerumque;
Rheumatismi & Anginæ passim. Magnus adest
undique Spirituum Languor, & creber Paroxys-
mus hystericus.

F E B R U A R I O.

Altam tenuit Stationem Mercurius ab Initio
Februarii ad Diem xviii. spiraverunt ut pluri-
mum intereà Venti aquilonares, qui Cælum red-
diderunt siccum & apricum, Terramque astrictam
Gelu, ineunte præsertim Mense. Post Diem xviii.
Nix, Pluvia, Ventusque ut plurimum australis:
Temperies Aeris multo magis tepida & humida
fuit, gravi Pluvia sub finem ruente.

D 3

Pluvia

Pluvia, Die 13. 18. ¹¹20. ¹¹21. ¹¹22. ¹¹23. ¹¹25.
Dig. Dec.

Nix multa 19 = 1.924.

Levis fuit AB 26. Hora 9. p. m. E b N 1.

8 Altitudo maxima 2. 30. 3. E N E 3. } media Altitud. hoc
— minima 20. 29. 0 V V S V V 2. } Mense 29. 8 ²/₂₉

Dies frigidissima, 1. 67. N E 2. } media Altitudo Ther-
— tepidissima, 25. 47. 8 1. } mom. 57 ¹⁶/₂₉

(C) Tusses, quæ à primo Januario fuerunt valdè frequentes, jam factæ frequentissimæ, plurimis, Junioribus præcipuè, infestæ sunt; quibus accesserunt Destillationes maximæ, ac Dolores Faucium atque Dentium, cum Glandularum Parotidum & Maxillarum Tumoribus: Hæc ferè omnia in Mense superiore, at jam cum his ingruit febrilis Affectio & Respiratio difficilis, imò pluribus, medio in hoc Mense accidebant Pleuritides & Peripneumonix; quorum Sanguis extractus fuit viscidus & parùm serosus: cum tamen, durante Januario, vel ab ipsis Rheumaticis, rarò fuisset valde glutinosus. Tunc porò satis fuit exhibuisse Spirit. Volat. oleos. Elix. Asthmat. le Mort. aut tale quid ex lenioribus Diluentibus, ad Sudores eliciendos & Tussim sopiendam; rerò Venam secantes, nec Epispastica frequenter admoventes. Jam Sanguinem mittere sæpe necesse erat, & repetitis Anodynis Vehementiam Tussis lepire; Anacatharsin & facilem Respirationem larga pectorali & molli Potione detergente moliri: ad quem quoque Finem Opus sæpe fuit Medicamentorum ex Oleosis, Gum. Ammoniac. Oxymel. Scillitic. &c. cum eo tamen,

1728) & Morbis Epidemicis. 9
 men, ut, dum hæc facta sunt, Virium Languor
 Cardiaca leniora postularet; *Epispasticis* interea
 crebro applicatis. Febris namque fuit lenta ple-
 rumque, Urina neque rubra valdè erat; nec Lin-
 gua valdè arida, nec urgebat importuna Sitis.
 Hoc Mense porrò *Variolæ* erant *sporadicæ* & mi-
 tes, rarò lethales.

M A R T I O.

Ventus Martio regnans fuit occidentalis, sub-
 inde ad Austrum, ad Septentrionem subinde,
 vergens, consequente, ut solet, pluvia, seu aprica
 Tempestate. *Mercurius in Barometro* inconstans,
 rarò sublimis. Nebulæ sæpe, Procellæ aliquando,
 Nivis aliquid sub finem Mensis. Temperies Aeris
 crassa & humida, attamen non valdè frigida.

Pluvia. 1. 3. 6. 8. 9. 11. 13. 14. 16.—18. 19.
 Dig. Dec.
 20. 22. 24.—26.—29 = 3 3 17.

Procellæ 14. 15. S 4. cum maximis Maris
 Æstibus. Nix alto mane 27.

AB 22. 10. p. m. VV N VV 1. Levis AB 23. 8.
 p. m. N N VV 1. Maximus Halo circa Lunam
 11. 12.

Altitud. maxim. 3. 30. 2. Malacia. } media 29, 6 $\frac{11}{32}$
 ——— minim. 14. 29. 1. S. 4.
 Dies frigid. 27. 60. N N VV 3. } media Term. Altit. 49, $\frac{2}{3}$
 ——— tepid. 17. 45. VV 2.

Tusses frequentissimæ toto hoc Mense, levi
 plerumque cum Febriola. Febres *rheumaticæ* &
catarrhales quamplurimæ; Ægrotantes omnes ad
 Sudores erant valdè prompti.

D 4 (D) Tet.

(D) Tertianæ exquisitæ, ac semitertianæ, Febres, jam sunt frequentiores longè quàm assolent in hac Regione: in Paroxysmis urgens maximè Vomitus biliosus, æruginosus, cum immensa Pituitæ tenacis Copia; Cephalalgia gravis, ac sæpe Delirium. Perpauci nunc Variolis laborant; aliqui Rubellis corripuntur & Juniores & Adulti.

A P R I L I.

Principio Mensis multa Pluvia, cadente Mercurio; assurgente verò, medio Aprili, Apricitas, Aer interim crassus & nebulosus. A Die xix. ad Finem usque humilem plerumque Stationem tenuit Baroscopium, plurima ruente Pluvia, ita ut paucissimi intercurrerent Dies aprici. Aer fuit valde crassus, humidus & subfrigidus toto fere Mense: Sæpe Ventus occidentalis, persæpe furens Auster. Viæ publicæ omnes Aqua & Limo plenæ sunt.

Pluvia $\overline{11}$ $\overline{11}$ $\overline{1}$ $\overline{1}$ $\overline{11}$ $\overline{1}$ $\overline{11}$ $\overline{1}$
 1.—3.—5. 8. 9. 13. 19. 20. 21. 22. 23.
 $\overline{11}$ $\overline{1}$ Dig. Dec.
 25. 26. 28.—30.—4. 153.
 Grando 11. 12. VV N VV I.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 0. Malacia. } media 29. $5\frac{2}{30}$
 ——— minim. 29. 28. 9. Sb E 3. }
 Dies frigid. 11. 55. N VV 1. } media Therm. Altit. 45 $\frac{23}{30}$
 — tepid. 18. 36. S S VV 1. }

Morbi superioris Mensis, jam vi & numero aucti grassantur maximè: imò Febres intermittentes à levi sæpe Errore in putridarum Classẽ transiliunt, haud contemnendo Egrotantium Pericu-

1728)

& Morbis Epidemicis:

11

Periculo; facillimè porrò recidivæ corripunt; quos ex toto reliquerant antè.

M A I O.

Aeris Constitutio humida & Ventus australis ad medium propè Mensē duraverunt. Initio Barometer fuit depressus; à xvi. Caurus, aut Septentrio, leniter spirans *Mercurium* tenuit ad 29. 8. circiter fere ad Finem usque: Aer interim ficcus erat & subtepidus.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{11}{5}$ 9. 10. $\frac{1}{12}$ 15. $\frac{1}{18}$ 20. 21.

Dig. Dec.

= 1. 633.

Altitud. maxim. 21. 30. 0. Malacia: } media 29. $6\frac{12}{31}$

minim. 3. 28. 9. S S E 3. }
Dies frigid. 1. 46. Sb VV 3. } media Therm. Altit. $35\frac{12}{31}$
— tepid. 23-30. VV N VV 1. }

Febris *Catarrhalis* ac Tusses jam evanuerē penitus; at (E) Febres intermittentes sæviunt adhuc. Vix ullæ nunc *Variolæ*.

J U N I O.

Prior Junii Pars Ventos habuit australes & occidentuos, Pluviamque haud exiguan,; *Atmosphæra* etiam plerumque crassa erat & humida: *Baroscopium* mediam fere tenuit Stationem. Posterior Mensis Pars erat magis serena, sicca & calida; Venti ab Oriente, aut Plagis arctois.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 2. 4. 7. $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{11}{12}$ 17. $\frac{1}{20}$

Dig. Dec.

25. 26. = 1. 636.

Fulgur

Fulgur & Tonitru, 17. 26.

8 Altitud. maxim. 28. 29. 8. N. 1. } media 29. $5\frac{17}{30}$
 ——— minim. 8. 29. 2. S V V b S 2. }
 Dies frigida 10. 37. V V N V V 1. } media Therm. Altitud. 30. $\frac{14}{30}$
 — calida 29. 23. E S E 1. }

Febres intermittentes adhuc passim; aliqua putridæ, lentæ, nervosæ.

J U L I O.

Per Initia Mensis Aer fuit apricus, ficcus & fervidus; Ventus aut nullus, aut Subsolanus; Ros plurimus; labente autem *Mercurio* ix. & x. multa Pluvia, resurgente paulò post, Serenitas; dein relabente magis xv. & xvi. gravis Pluvia: varia post Tempestas ad Finem usque Julii, Vento plerumque ad Occidentem vergente: Aer interea erat longè humidior, & ad Finem valde crassus.

Pluvia $\frac{11}{9.}$ $\frac{11}{10.}$ $\frac{11}{15.}$ $\frac{11}{16.}$ 17. 18. $\frac{111}{20.}$ $\frac{1}{25.}$ $\frac{11}{26.}$ 28.
 Dig. Dec.

30. = 3. 179.

Die 2. Hora 11. p. m. malacia; permagnum observavi Lumen boreale, cujus Radii lucidi, at non colorati, vibrantes, terminari videbantur in coruscante quasi Umbella paulò ultra Zenith octo, decemve, fere Gradus, Meridiem versùs. Centrum hujus lucidæ Coronæ eodem fere Intervallo distabat ab Arcu meridiano, certissimè ad Orientem: quod idem utique haud rarò nuperis Annis notavi. Durante Splendore hoc boreali plurimus Ros decidit; si ventus fuit aliquis, à Septentrione venit.

Die

Die 22. H. 9. p. m. N. 1. leve, at insolitum.
Lumen boreale eluxit, cujus Radii pyramidales,
inverso planè Ordine, vibrabant: horum enim
Vertices ad Centrum, quasi paulò infra Horizon-
em, sub ipso Axe boreo tendebant. Die 4. & 17.
VV N VV 1. parvæ AB, at nihil insoliti. To-
nitru 8.

Altitud. maxim. 3. 29. 9. Malacia } media 29. 6.
minim. 16. 29. 0. S. VV. 1. }
Dies frigid. 23. 37. E. 1. } media Therm. Altitud. 28 $\frac{16}{36}$
— fervidus 8. 18. E S E 2. }

Febres tertianæ & duplices tertianæ adhuc;
paucæ quoque putridæ. Languores graves à
profusis Sudoribus, quibus omnes infestantur ma-
ximè: Laxis nempe & patulis Cutis Poris Hu-
mores, à Fervore Tempestatis rarefactos, & col-
liquatos, immoderatè transmittentibus.

AUGUSTO.

Ineunte Augusto Cœlum fuit plerumque su-
m, Aer siccus & fervidus, Barometer altum
venit Locum, Venti Septentrionales: exeunte
autem Aer fiebat humidior longè, & cum Mer-
curio decidit Pluvia; interim Zephyrus, Libs,
ut Corus, perflabant assiduè.

Pluvia 1. 11. 13. 17. 20.—22. 24.—27. 28.
Dig. Dec.

9. = 1.894.

AB. 18. 20. p. m. N N VV 1. Fulgura &
Procella 20. Nocte. S VV.

Maximus Maris Æstus 27. S S VV 3—28.
VV 3.

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 1. Nb VV 1. } media 29. $6\frac{20}{31}$
 ——— minim. 28. 29. 0. S VV 3x. }
 Dies frigid. 29. 38. N VV 1. } media Therm. Altit. $30\frac{4}{31}$
 — fervid. 5. 20. VV N VV 1. }

Febres intermittentes sub Finem Mensis frequentiores: *Diarrhææ* & Morbi colici plurimi.

S E P T E M B R I.

Corus fere spirabat quotidie ab Initio Septembris ad Diem xi. *Barometrum* attollens, Nubesque dispergens pulcherrimè. A xvii. ad ipsum Finem Ventus ex Oriente, flectens subinde ad Austrum, subinde ad Septentrionem, furens, sæpe perflabat, & *Mercurium* magis quàm quis crederet, deprimebat, haud multà nempe tunc decidente Pluvia: interim humidus erat & frigidus Aer.

Pluvia, 4. 6. — 8. 10. $\frac{1}{16}$. $\frac{111}{17}$. 18. $\frac{111}{23}$. — 25.
Dig. Dec.

26. = 1. 526.

Maximi Maris Æstus à 22. ad 25. perfurente Vulturno.

8 Altitud. maxim. 10. 30. 0. N VV 1. } media 29. $5\frac{25}{30}$
 ——— minim. 24. 28. 5. SE b E 3x. }
 Dies frigid. 20. 46. E b N 3. } media Therm. Altitud. $38\frac{18}{30}$
 — tepid. 1. 27. Malacia. }

Febres intermittentes passim & nonnullæ putridæ, *Diarrhææ* quamplurimæ; morbus autem colicus rarior solito hac Tempestate: haud pauci *Ophthalmia* & Tumore Colli Fauciumque correpti sunt.

OCTOBRI.

O C T O B R I.

Libs fere perpetuus flavit à ii. ad xiii. Octobris Mercurio multum cadente; Pluvia interim continua decidit: post Boreas, aut Euronotus, xxvii. adusque, scandente Baroscopio, & consequente Apricitate; inde humidus Auster gravem perpetuamque Pluviam demisit.

Pluvia $\frac{11}{2}$. $\frac{11}{3}$. $\frac{6}{6}$. $\frac{11}{7}$. $\frac{11}{8}$. — 10. 12. $\frac{111}{13}$. 20. $\frac{51}{21}$. 24.
 $\frac{11}{28}$. $\frac{111}{29}$. $\frac{11}{30}$. = 5. 386.
 Dig. Dec.

AB. 1. 8. p. m. N N E 1. levis AB. 14. 9. p. m. N E. 2. — 15. N N E. 1. — 22. E N E 1.

Altitud. maxim. 16. 30. 2. N N E 1. } media 29. $5\frac{4}{11}$
 — minim. 8. 28. 8. S V V 2. }

Dies frigid. 16. 55. N N E 1. } media Therm. Altit. $46\frac{16}{31}$
 — tepid. 2. 40. S S V V 2. }

Febres Erysipelatodes & Petechiales passim.

N O V E M B R I.

Pluvia adfuit perpetua, non tamen valde gravis, ad ix. Diem Novembris, dum Ventus ex Austro plerumque fremuit maximè. Aer interea fuit humidus valde: tunc Aquilo discussit paululum Nubes, flectens inde variè Ventus ad Occidentem, per Austrum recurrebat tandem donec Orientem attigit, mutans interim assidue Cœli Faciem & Barometri Stationem: post verò deflectens ad Septentrionem, rigidam invexit Brumam, Cœlumque serenum.

Pluvia

Pluvia $\overset{11}{1.}$ $\overset{1}{2.}$ $\overset{11}{3.}$ — $\overset{11}{8.}$ $\overset{11}{9.}$ $\overset{11}{14.}$ $\overset{11}{16.}$ $\overset{111}{18.}$ — 20. 22.
 $\overset{1111}{24.}$ $\overset{1}{25.}$ = 3. 535.
 Dig. Dec.

Procella 1. mane primo VV S VV — 15. Nocte.
 S b E — 18. H. 2. p. m. S S E. 4.

Levis AB. 22. Permagnus & vividus Halo
 circa Lunam 6. 10. p. m. S. 3. Maximus Maris
 Æstus 18. S S E. 4.

∪ Altitud. maxim. 30. 30. 2. Malacia. } media 29. $5\frac{25}{30}$
 ——— minim. 25. 28. 9. E S E 3. }
 Dies frigid. 30. 72. rigidissimum Gelu! } media Therm.
 — tepid. 7. 42. S S VV 3. } Altitud. $54\frac{24}{30}$

Morbus pestilens inter Boves. Coryzæ & Tuf-
 ses sunt valde frequentes.

D E C E M B R I.

Ab initio Decembris subsedit sensim *Mercurius* in *Baroscopio*, multa ruente Pluvia. Ventus fuit interim varius quotidie, Aer autem maximè humidus; donec Aquilo mutavit Rerum Faciem, Geluque rigidissimum protulit & Nivem; eaque borealis Ventus, aut Orientalis, continuabat ad ipsum Anni Exitum.

Piuvia $\overset{1}{3.}$ $\overset{111}{4.}$ $\overset{1}{5.}$ — $\overset{11}{7.}$ $\overset{111}{8.}$ — $\overset{1}{10.}$ — 12. Nix 17. 18.
 Dig. Dec.

21. 23. 24. 25. = 2. 273.; Nive excepta, eam namque totam non potui ullo modo colligere, quùm citò impleverit Vas recipiens, ibique congelata remanserit, avolante reliqua: fuit autem ejus Quantitas proculdubio haud exigua, cum alta fuisset undique sexdecim saltem Digitos.

∪ Altitud.

8 Altitud. maxim. 15. 30. 3. N. 1.
 ——— minim. 8. 28. 8. S b VV 3. } media 29. 7 ⁴/₃₁
 Dies frigidissimus 23. 75. N. E. 2. } media Therm. Altitud.
 — repid. 7. 51. SS VV 3. } 64.

Febres *rheumaticæ* passim, & Paroxysmi (F)
 Asthmatici frequentes: quamplurimæ Tussis,
 eæque sæpe graves, sub Finem Mensis præ-
 fertim.

Dig. Dec.

Tota, quæ decidit, Pluvia hoc Anno fuit 36. 564

Notationes aliquæ:

(A) Aer fuit ita humidus fortè quòd parùm
 dmodum Gelu fuisset. Gelu certè Atmosphæ-
 ram reddit siccam, condensando Vapores, eosque
 Terræ coagmentando; Terra interim ipsa ita
 Gelu constricta est, ut Exhalationes impediat.
 Hoc in Degelationibus est maximè conspicuum,
 ubi omne Solum, quasi Aqua perfusum, hume-
 cit, imò ferè spumescit; data scilicet Via Vapo-
 ribus à Calore subterraneo elevatis, at Gelu antè
 d Terræ superficiem astrictis. Hinc est quòd
 Gelu diu durans Terram foecundet, retentis
 empe salinis & sulphureis Halitibus, ut Agri-
 colæ norunt: atque hinc fortè post longum Gelu,
 um Degelatio accedat, morbi *Epidemici* oriun-
 tur, ut observatur sæpissimè.

(B) Nonne hi Maris Æstus exundantes, partim
 ortassè, pendebant à maxima Aeris Levitate,
 has

has in Regiones incumbentis, qui Maria nostra longè minùs premebat quàm circumfusum Oceanum; Aquis nempe hic confluentibus ad Equilibrium restituendum? Quoniam Aquam inter & Argentum vivum interest differentia, quod ad Pondera, 14. ad 1. quàm proximè; sequitur manifestè *Barometro* in hac Regione integrum Digitum subsidente, Aquas debere hic quatuordecim Digitos altiùs assurgere, quàm ubi, ex Proportionem dicta, major est *Atmosphæræ* Pressura. — Annon porrò hac ipsa de Causa fortè violentissimè urgente, displosis scilicet subitò Vaporibus Aereque pro Tempore maximè rarefacto, Columnæ istæ Aquarum (quas *Spouts* vocant) & immensi isti Fluctus (quos *Boars*) evehuntur nonnumquam? Fulgetra namque semper fere hæc comitantur *Phænomena*, quæ momentaneum quasi Vacuum faciunt. Haud semel certè memini Montem quasi Aquarum (quem a *Boar* hic vocant) perbreve intra Horæ Quadrantem, imò multo minore Temporis Spatio, inundasse ad Altitudinem perpendicularem Pedum saltem duodecim, atque mox recessisse penitùs: quod vix fortè ulla alia Ratione explicari potest.

(C) Humida valde frigidaque Aeris intemperies semper Gravedines, Tusses, & morbos à *serosa* Colluvie pendentes, gignit; idque non solum *Perspirationem* inhibendo, sed & insuper Humiditatem noxiam, Sale aereo sive Nitro gravidam, Sanguini per ipsos Cutis Poros insinuando: nec dubito, quin ob has Causas Tusses Britannos nostros longè magis infestent quàm Gallicum, aut Hesperium, Populum, qui siccior gaudet & tepidior *Atmosphæra*. An Aer ipse quidem Corpora nostra subire potest

test sub Aeris Forma, dubito; per * Cortices autem Plantarum, imò Arborum, penetrare certum est. Extra omne dubium verò aerea Humiditas Cutis Poros permeat; nec mirum, quippe durissima Ligna & Saxa penetrat. — Plura sane Experimenta hanc aerei Humoris Attractionem confirmant; & quid quæso huic sit magis Impedimento quàm Terebenthinæ, aut Argenti vivi Exhalationibus, quæ vel intimum intrant Corpus? † Juvenis quidam sanus, Jejunio & Labore confectus, Spatio unius Noctis octodecim Uncias imbibit per Poros. Hoc, etsi non tanta Quantitate, notant sæpissimè, qui Cursibus præfunt equestribus, ubi jejuniis ad certum Pondus redigendi sunt Equisones.

Tria hinc in regenda Valetudine Confectaria ducantur: 1. Ut jejunus Nemo, nec fatigatus admodum, contagioso se committat Aeri, aut Febre maligna, aut pestilente, correptos inviasat; pluribus, imò Medicis, hoc fuisse Exitio memini: tunc enim ex facili *Effluvia* morbida accipiunt.

2. Cavendum est maximè, ne quis diu in Aere inquinato versetur. Methodici olim, Teste ‡ Cælio Aureliano, vel Cubiculi Aerem medicabant: plurimum utique interest, an subfrigidam respirat Auram ardente laborans Febre, an æstuosam, liberam, an densam nimis; ideo, jubente ¶ Celso, in amplo Conclavi tenendus est; si id quidem non est, eluceat modicè Focus, quo per Caminum impura & morbida Mephitis eliciatur, quæ diu aliter stagnans magis magisque in Ho-

E

ras

* Hales's *Vegetable Statics*, cap. 5.

† Vid. *Jacob. Keil. Medicin. Static. Britan.*

‡ Lib. ii. cap. 36.

¶ Lib. iii. cap. 7.

ras pestifera redditur; atqui hoc modo perflabile fervetur Cubiculum tutissimè.

3. Hinc porrò vides quanto discumbis Periculo cum impuro Lecti Socio; quot tabidos, hac de Causa, factos novi, sanissimos olim? quantum hinc cavenda Lecti Consortio? quantum hinc marcet formosa Puella sicco admota Seni; dum ille vigescit? Nec melior potuit inveniri modus refocillandi decrepitum Judæorum Regem, David, quàm consulendo ut illum in Sinu foveret perpulchra Shunamita Virgo.

(D) Ex humida valde & minùs *elastica* Aeris Constitutione Sanguinis Lentor nimius produci-
tur facilè; unde *Circulatio* per Vasa minima haud expedita, per majora autem debito rapidior, eaque aucta plurimum à suscepto Frigore, *Per-
spirabile* subito reprimente. Unde Paroxysmus sequitur febriculofus; qui tamen brevi faceffit, amotis nimirùm Repagulis, & consequente Sudore, nisi aut Sanguis sit lentus valde aut viscidus: tunc enim vel putrida ac lenta Febris, vel ardens ac vehemens, subsequitur; prout nempe Fibrarum *Tonus*, magis minùsve *elasticus*, & Status Humorū disposuerit. Quamobrem mone-
rem Tyrones medicos, ne nimiùm forent in exhibendo Corticem Peruvianum, *Alexipharmaca* & *Salia volatilia*, præproperè, in ipso præsertim Initio Februm intermittentium, nec nisi post debitas (prout fuerit opus) *Evacuationes*: Error namque talis haud rarò Pleuritides & Peripneumonias arcessit, aut Febrem cum Delirio, vel Comate, continuam. Febris utique intermittens rarò aliquem jugulat; si tamen, ex ea, facta est continua, in malis *Æger* est (monente Celso Lib. iii. capit. 15. ad finem.)

In primis ideò Accessionibus vix aliquid Ægro necesse est, nisi ut sorbeat affatim Potum aliquem diluentem, tepidum; quod & Horrorem discutit, & Vomitus, si urgeat, promovet, finemque tandem febrili Paroxismo facit, Sudores eliciendo: ad quod idoneum est maximè ut Æger se in Lectulo contineat, durante Paroxysmo. Tunc demum Febre bene finita, ex Medicamento vomat, Alvum purget denuò, aut saltem ducat, si cita antè non fuerit; tunc enim, Rhabbaro exhibito priùs, eam comprimere licet.

Multum utique facit ad omnigenas Febres extinguendas, post debitam (si sit necesse) Sanguinis missionem, primarum Viarum à putrida *Cacochymia* Purgatio. Neque hoc solùm modo prodest Vomitus, sed & ipsa ejus Actio Obstructiones, vel in ipsis Corporis Penetralibus, reserare apta est; ad utrumque igitur Scopum eum provocare utile est; id ipsum quippe Febres quasdam intermittentes sæpe sæpius curavit.

Post secundam, tertiamve, Accessionem quod Genus Febris sit scire licet, atque exin Medicinam aptare idoneam, in qua Jure merito primum obtinet Locum Cortex Peruvianus: at nescio quo Fato, utcunque seduli fuerimus in isto eligendo, ad has Febres abigendas, Opinione longè minùs, profuit; nisi primò Cinnabari, Camphora, Myrrha; pòst *Stomachicis aromaticis Chalybeatis* adjutus. Tunc equidem *Mercurii alkalizati* Usus mihi haud innotuit, quem paulò pòst tamen mecum communicavit optimus ille, celeberrimusque Medicus, D. D. Cheyne: hanc verò Mercurii Præparationem ad plurimos Morbos maximè efficacem esse millies inde inveni. Maximam profectò vim habent *Mercurialia* con-

era Sanguinis Lentorem & Obstructiones Vasorum; imò sine Stimulo salino præparata non solum in Febribus intermittentibus esse utilissima, sed & in *Pleuriticis*, *Peripneumonicis* & *Rheumaticis*, post debitam Sanguinis Missionem, plurimum prodesse novi: dum enim lentos attenuant Humores, parùm interim rarefaciunt Sanguinem, aut exagitant, etsi Pondere suo momentum ejus multùm adaugent. Acutissimus JURINIUS demonstravit olim, * Gravitationem Globuli Sanguinis rubri esse ad Gravitationem Seri, ut 1126. ad 1030.: atqui tantæ potissimum Gravitationis effecti videntur Globuli, ut Seri Tenuitatem conservarent, & sanguineos Tubulos præstarent meabiles; ac cum magna adsit Tenacitas Humorum, & Obstructio Vasculorum pertinax, his utique utendum est, quæ multò majore polent momento.

Sub Finem verò harum Intermittentium *Stomachica Chalybeata* & *Austero Aromatica* juvabant maximè, quæ sine Tumor Pedum *oedematosus* semper, & recidivæ Febres accedebant sæpissimè; imò cùm morbus ex toto discussus fuisset, ad Recidivam præcavendam commodum erat omninò, Die scilicet octavo, vel decimo post, Corticem Peruvianum & *Martiata Stomachica* resumere, ad paucos saltem Dies. Nonne idè eadem hæcce, subinde assumpta, per bona sint ad *Prophylaxin*, dum Aer nimis humidus & parùm elasticus Sanguini Lentorem inducit, & Vim Fibrarum enervat; idque præcipuè debilioribus, ac *Systasi* Nervorum infirma affectis? Hæc utique Methodus mihi optimè cessit in *Hystericis*

* *Transact. Philosoph. Anglic.* N. 316.

stericis & Hypochondriacis sæpissimè — Hoc forsàn haud absurdum erit Monitum iis, qui haud prospera Valetudine gaudent, aut illis, qui eorum Sanitati prospiciunt. Delicatulis, ac Mollitiis fluentibus, haud injucundum, nec fortè inefficax Antidotus, erit Malum Aurantium Hispalense tostum, ex Vino rubro generoso, post debitam Infusionem:

Nihil sanè ad Febres intermittentes eradican-
das facit magis quàm frequens Vomitus, præci-
puè ubi Nausea & Vomitus urgent, quod in his
serè accidit semper: dum namque Stomachus,
seu muco acido obrutus, seu biliosa Colluviè, lan-
guet, quasi Vas iners, Fermento imbutum pu-
trido, Ingesta omnia corrumpit: hinc perpetuus
mòrbi Fomes, donec perpurgatur Ventriculus:
— Ad movendum autem Vomitus, vel De-
coctum Radicis Ipecacuanhæ, vel Infusio ex
Vino, exhibetur tutissimè; si vis aliquid fortiùs,
Vini benedicti Cochleare unum, alterumve, ad-
jici potest. Perperàm verò (quod suadent nonnulli)
oleosa, aut immensa subtepidæ Potione sollicitatur,
quarum prior oblinat potius quam deterget Ven-
triculum, eum altera onerat nimium: imò sæpe
adeò non juvant immanes isti Haustus, ut, Stoma-
chum nimio plus distendendo, Vim ejus constri-
gentem, omnemque Actionem perdant omninò.
Longè igitur longèque rectiùs promovetur Vo-
mitus modica Potione tenuis Infusus Florum
Chamæmeli, sub Finem verò Vini rubri cum
Aquæ Dimidio, Duplo, aut Triplo, prout Res
exigit, in quo lene aliquod Aromaticum sit in-
coctum: Sustainat hoc quippe totiùs Corporis
Vires, & naturalem Ventriculi Potentiam erigit
plurimum, ita ut quicquid Plicis suis inhæret ex-
primat, se nempe corrugando validiùs; adeoque

tandem Ventriculi Tunicas corroborat, ut multo minùs postea sit obnoxius Illuviei nocenti. Hinc fit quòd Vomitus ex Vino rubro austero & aromaticis parato tantum Arthriticis prodest, ubi morbus Stomachum occupaverit.

* Provocabant olim Romani Luxuriæ Causa Vomitum, quidni nos Sanitatis? Quandoquidem vix aliquid subest Periculi, modò descripta excutitur Methodo, & post debitam, si commodum est, missionem Sanguinis: nam sive plus est injectum quàm quod concoqui possit periclitari ne corrumpatur non oportet; sive jam corruptum est, nihil commodius est quàm id, qua via primum expelli potest, ejicere. Haud alio utique modo expurganda est Colluvies Stomachi biliosa, aut pituitosa, multorum sanè Morborum Origo & Fomes: quicquid enim prima Digestione corrumpitur, haudquaquàm emendatur in secunda Concoctione, adeoque qualis efficitur Chylus, talis fit Sanguis.

Nec solùm Corporis Vigorem conservat purus firmusque Stomachus, sed & Animi etiam Acumen; ideo † Carneades, Academicus, scripturus adversus Stoici Zenonis Libros, superiora Corporis candido Elleboro purgavit: perpauci sane Philosophi ex Apicii Schola prodire; vix aliquid certe Cerebro officit magis, quàm ingluvie distentus Venter.

Audi || Horatium, haud omninò Pythagoricum—

— Quin Corpus onustum

Hesternis Vitiis Animum quoque prægravat una,
Atque affigit Humo divinæ Particulam Auræ.

Qui

* Celsus, Lib. i. cap. 3. † A. Gellii, Lib. xvii. cap. 15.
|| Sermon. Lib. ii. Satyr. 2.

Qui secum reputat Nervi *intercostalis*, & *Parisi* *vagi*, five *octavi*, longas Ambages, Implexus, Ramusculos, horumque Concentum atque Consensum: quorum alteruter Veneno, aut acri aliquo tactus, Vomitus ciet illicò; qui porrò spectat, Actione Vomitus, omnem intendi Nervum, omnemque concuti Fibræ; idoneus solùm est Judex, quibus in morbis, quaque sub Conditione, excitanda sit Vomitus: in pluribus haud dubio utilis est admodum, quum & omnes Corporis Humores attenuet, omnesque promoveat Secretiones.

(E) Haud ita multum in medendi Methodo mutavi, ni quòd opportunum esse invenerim Medicamentis, suprà laudatis, addere Elixir Vitrioli, & Aquas Spadanas, aut Pyrmontenses, haurire quotidie. Nec pœnitendo utique Eventu, tunc Temporis, Balneum frigidum commendavi; præcipuè convalescentibus ab intermittente rebelli: ad Fibrarum nempè Tonum restituendum, & Humores lentos comminuendos. Hinc didici tandem quantum potest tale Remedium, ubi vix alia proficit Methodus, idque nonnumquam in pertinace Quartana: novum hoc forsàn & inauditum, mihi verò probè expertum.

(F) Dum Subsolanus afflat, seu Boreas, Aer & elasticus valdè & gravis evadit, plerumque porrò frigidior; solito magis ideò distendit, premitque Pulmones: quinetiam *Atmosphæra* ponderosior externum Corporis Habitum comprimit, & si sit frigidior, Nervos Fibrasque cutaneas constringit: minus hinc Sanguinis *εἰς τὰ ἔξω*, *εἰς τὰ ἔντερα* verò ejusdem Congestio, & proinde motus rapidior. Non mirum ideò si infirma Pulmonum *Crasi* laborantes talem Aeris

Constitutionem malè ferunt, Vesiculis nempè pulmoneis Aere distentis nimium, Vascularibus sanguiferis Cruore. His de Causis quamplurimi, Vento ad Orientem vergente, certo certius ferè Asthmatis Paroxysmo corripiuntur. His præcipuè Asthmaticis convenit Sanguinis Missio, imò, *Dyspnœa* urgente maximè, necessaria est omnino; tunc lenia *antiphlogistica* Purgantia, Gas Sulphuris, Acetum & Oxymel Scilliticum, ex Posca, Mulso, aut Potu tenui subacido, Paroxysmum solvunt: porrò Pedes demittere in Balneum ex Aqua tepida hisce Auxilio est, Humores alliciendo ad Partes inferiores. — Novi Virginem elegantem uno, alterove, Die ante Menstrua, gravi Spiritus Difficultate corripi solitam, cui hoc certum semper subitumque attulit Levamen.

Pituitosis contrà, humidisque Asthmaticis, Vomitoria, *Epispatica*, *Volatilia*, Purgantia fortiora, & Detergentia acriora opitulantur.

DE AERE

ET

Morbis Epidemicis,

Anno MDCCXXIX.

JANUARIO.

INEUNTE & exeunte Januario Aer fuit frigidus valdè, Venti aquilonares, permagna Elevatio Barometri, Nebulæ sæpè densissimæ, & nonnunquam foetidæ, Gelu frequens & rigidum valdè. Medio autem Mense, subsidente Mercurio, Pluvia, Ventusque varius, qui ab Occasu vergebat plerumque ad Septentrionem. Ad Finem orientales Venti Aerem desiccabant plurimum, quamvis fuerat antè multo humidior.

Pluvia 4. 12. 13. — 16. 19. 21. Nix 7 Noctis
Dig. Dec.
te = 0.900.

AB. permagna Die 6. H. 11. Noctis. ENE. 1.
lucidam quasi Nubem observavi, Die 14. H. 9.
m. inter Orionem, Taurum & Os Ceti, con-
fucantem undique Radiis vibrantibus, lucidissimis,

mis, etsi ne vel minima alibi extiterunt Signa
Luminis borealis, ista Nocte.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 4. Malacia. }
——— minim. 14. 29. 1. VVN VV 2. } media 29. 9³¹
Dies frigidissima 1. 74. ENE 1. }
— tepid. 19. 52. VVN VV 1. } media Therm. Altitud. 61³¹

Tumor Faucium *anginosus*, & Tusses, valde
frequentes; Perniones, etiam inter Adultos, fre-
quentissimi: Pleuritides & Febres *rheumaticae*
passim. ——— Prælonga Sanguinis missio *Pleur-*
ticos juvabat maximè, Potusque multus emolliens
eadem omninò Methodus *Rheumaticis* auxilia-
batur: atroces verò Artuum Dolores plurimùm
levabant Fomenta tepida laxantia, admota sub
inde.

FEBRUARIO.

Initio Februarii *Baroscopium* indicavit 30. 2
flante Septentrione; post Diem vii. Ventus a
Occidente venit, flectens modò ad Austrum
mox quoque ad Arctum, Pluvia cadente: à xiv
ad Finem usque Flatus perpetui, ac sæpè vehe-
mentes, ex Oriente frigidam siccamque *Atmo-*
sphaeram fecere, surgente plurimùm *Mercurio*.

Pluvia 4. 7. 9. 10. — 12. Nix 5. 14. 24
Dig. Dec.
= 1. 814.

Ventus turbineus 23. 24. Fulgura 9. H. 8
p. m. S VV b S 3.

(A) Spiritus Thermometri Hauksbeiani sæpè
ad 66. hoc Mense subsidebat, cum tamen vix
ulla uspiam visa fuerit Glacies, à xvii. ad xxi
præcipuè.

8 Altitud.

Altitud. maxima 25. 30. 3. E 3. } media 29. $7\frac{2}{3}$
 — minima 10. 29. 1. VV 3. }
 Dies frigid. 6. 71. N. 1. } media Therm. Altitud. $62\frac{18}{28}$
 — tepid. 9. 56. S. VV b S 3. }

Graves Rheumatismi & Arthritidis Paroxysmi,
 qui multo magis quam solito excruciant. Tusses
 siccae, laboriosae, frequentes sunt. Sanguis, è
 quocunque ferè detractus, est crassus valde, & per
 paululum Seri habet; ubi Febris aliquid accessit,
 admodum est viscidus: Pleuritides tamen, ac Pe-
 ripneumoniæ, non æquè frequentes sunt ac quis
 expectaverit. Multi adhuc Asthmate laborant,
 & plurimi, imò Adulti, Pernionibus vexantur.

M A R T I O.

Frequens perflavit Aquilo ad xiv. usque Martii;
 xv. fremuit Vulturnus, plurima ruente Pluvia;
 xvi. & xvii. Boreas furebat maximè; sub Finem
 lenior spirabat ab Occidente Ventus, cadente
 Mercurio: Vehementissimus autem aderat Turbo
 è Septentrione xxiv. circa Meridiem. Aer fuit
 siccus & frigidus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 12. 14. $\frac{111}{15}$. 16. 22. $\frac{1}{23}$. 24. $\frac{2}{26}$.
 Dig. Dec.

27. 28. 30. 31. Nix. II. = 2. 092.

Rigidum Gelu 10. — 13. Ventus plerumque
 N E. Procellæ 16. 17. 24.

Altitud. maxim. 17. 30. 2. N N E 3x. } media 29. $7\frac{2}{3}$
 — minim. 15. 29. 0. S E 3x. }
 Dies frigid. 11. 66. N 1. } media Therm. Altit. 54.
 — tepid. 31. 49. VV. S VV 1. }

Gravis

Gravis adhuc sævit *Rheumatismus* & *Arthritis*; nec cruciatus magis obstinatos memini nec *Arthritidem* magis *anomalam*. Tusses *orthopnoicæ* molestissimæ, plurimos corripunt, lenta sæpe cum Febre; sputa sunt maximè viscida & excreatu difficillima. His, Venæ Sectione peracta, Potio larga, diluens, calida, Detergentia dein ex Oximelite Scillino, Gum. Ammoniaco, Flor. Benzoes, &c. opitulantur, *epispasticis* non rarò admotis. Nihil magis fuit Tussi Levamento, nihil tutius, Elixir Asthmat. le Mortii & Pilul. Mathæi. At hic notandum, quod perpetuum esse debet, ubi Attenuantia & *Volatilia* liberè exhibentur, & *Vesicatoria* iterum atque iterum applicantur, multis Diluentibus utendum est: Lympha dissipatur aliter, Cruor verò incrassatur nimis & acrior evadit, unde necessariò Inflammatio & Febris augentur.

A P R I L I.

Siccus fuit & tenuis Aer durante Aprili, ac sæpe frigidus, imò Die xiii. ipsa Glacies: Ventus ab Oriente plerumque, medio quidem Mense ad Septentrionem flectens, sub Finem verò ad Austrum. Statio *Baroscopii* alta manebat ab xi. ad xxix. Magna Roratio, ac Pruina nonnumquam à xiii. ad xix. Cælumque serenum.

	<u>1111</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	Dig. Dec.
Pluvia	1. 2. 7. —	10. 25. 27. —	30. —	1. 692.
AB.	11. 10. p. m.	N N E. 2. —	levis	21.
N VV	1. Procella	9. Nocte	S E. —	25. E S E.
8	Altitud. maxim.	16. 30. 1. E N E 1.	} media 29. 6 $\frac{14}{30}$	
	minim.	25. 29. 1. E S E 4.		
Dies frigid.	13. 57.	E b N 1.	} media Therm. Altit. 46 $\frac{29}{30}$	
— tepid.	29. 40.	S S VV 1.		

Erysi.

729) & Morbis Epidemicis. 31
Erysipelas & pustulosa Febricula frequens. *Variola* passim. Tempestas infesta Tabidis, his præcipuè, qui, elapsis Mènsibus, Febre lenta pulmonaria correpti, ad Phthisin olim fuerant proclives.

M A I O.

Hujus Mensis Initio, labente *Barometro*, Pluvia, frigidaque Tempestas; Die octavo, benè Mane, etiam stagna Glacie fuere astricta: Vespere autem ejus Diei Fulgura sæpe, at sine Tonitru prorsùs. Cœlum deinceps varium, variusque Ventus; à xvi. ad Finem usque Aquilo sæpe, subsolanus sæpius, Mercurium sustulerunt, *Atmosphæra* porrò Siccitatem & Apricitatem reddiderunt.

Pluvia $\frac{111}{3}$. — $\frac{3}{5}$. 6. 10. $\frac{1}{12}$. 14. 19. 20. $\frac{1}{24}$.
 Dig. Dec.
 = 1. 560.

Levis AB. 6. 10. p. m. N b VV 3.

Altitud. maxim. 8. 30. 0. N VV 1. } media 19. $6\frac{13}{31}$
 — minim. 5. 29 1. VV S VV 3. }
 Dies frigid. 8. 54. VV N VV 1. } media Therm. Altit. $41\frac{26}{31}$
 — tepid. 28. 35. E b S 1. }

Febres peripneumonicae & erysipelatosæ. *Variolæ*, & Febriculæ cum Pustulis rubeolosis (vulgò the *Chicken-Pox*) passim, Tumores quoque Pedum urentes, at recedentes brevi.

J U N I O.

Nulla fuit *Baroscopii* Elevatio notabilis toto Junio: medio quidem mense Statio humilis, haud

haud exigua tunc ruente Pluvia. A xii. ad xxiii. Aer erat valdè crassus, ac humidus, dum Africus sæpe afflabat, intercurrente nonnunquam Malacia: Initio autem & Fine Subsolanus. Magna sub Finem Roratio.

Pluvia 2. $\frac{11}{3}$. 7. 8. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. — 14. 16. $\frac{11}{17}$.
Dig. Dec.
22. = 1.662.

8 Altitud. maxim. 26. 29. 9. N 1. } media 29. $6\frac{3}{5}$.
— — minim. 13. 28. 7. S 3.
Dies frigid. 4. 40. E 3x. } media Therm. Altitud. $32\frac{16}{3}$.
— tepid. 29. 29. E 1. }

Erysipelas & Variolæ epidemicæ. Febres intermittentes remittentes præcipuè, lentæ, nervosæ, frequentes. *Cephalalgia & Mania* passim. Tussis inter Pueros.

J U L I O.

Incipiente Julio serena satis effulsit Tempestas; Ventus orientalis isque velox admodum; a iv. Die ad x. sæpe vehemens, fidente Mercurio; inde ad Austrum deflectens *Barometrum* usque depressit, *Atmosphæra* facta nebulosa, ac humida valde: sub Finem aliquanto resurgebat flante Favonio. Rara fuit apricitas post Diem sextum, etsi Tempestas erat æstiosa valdè.

Pluvia $\frac{1}{7}$. 9. 11. 16. — $\frac{1}{18}$. 21. 23. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$.
Dig. Dec.
27. 28. 31. = 1.918.

Ventus turbineus & Tonitru 7. Nocte E. Fulgura 15. Nocte.

8 Altitud.

Altitud. maxim. 3. 29. 8. E b N 1. } media 29. $4\frac{2}{3}$
 ——— minim. 25. 29. 0. S b E 3^s. }
 Dies frigid. 8. 36. E b N. 3. } media Therm. Altitud. $28\frac{22}{30}$
 — æstuos. 22. 22. Malacia. }

Variolæ multos invadunt. — Porro toto hoc
 Mense Febris putrida, lenta, sub Finem remit-
 tens, tandemque intermittens, fuit maximè *epide-*
mica in hac Regione. Caput, Stomachus &
 Lumbi laborabant potissimum, quasi ingruenti-
 us *Variolis*, magna cum Oppressione Pectoris,
 suspiriis & gravi Languore: talis fortè affectus
 nomen dedit Febri *variolosæ* † Sydenhamii.
 Pueri, Juniores, Fœminæ, Infirmiores, hac
 febre præcipuè fuere correpti. Sanguis eorum
 extractus rarò viscidus erat; Urina cruda plerum-
 que, ac subtenuis, cum cineritia, mucosa & im-
 perfecta *Hypostasi* sæpe, quasi ex Polline farraceo
 (ἀρίστος Κελευδὴς Hippocratis:) quo Sedimen-
 tum perfectius, eo major Spes salutis effulsit.
 Lingua, non arida valdè, glutinoso quodam &
 subfusco obducta fuit Mucore. Sub morbi Fi-
 nem *Diarrhœa*, aut cruenta nonnumquam *Dysen-*
teria (præsertim si Vomitus non fuerat Initio Arte
 promotus) urgebat maximè, imò quibusdam erat
 exitio. Rubræ autem *Petechiæ*, Pustulæ milia-
 res, rubræ, urentes, aut graves erumpentes fu-
 ores, morbum sæpissimè solvebant penitus.

Venæ Sectio rarò, nisi Morbi Initio, profuit;
 Vomitoria verò erant pernecessaria: *epispastica*
 in frequentia, & gradatim admota, lenia inte-
 rà *Cardiaca* Cinnabar, *Paregorica*, sero Lactis
 Cana-

† Sect. iii. Caput. 3,

Canariensi & Potione diluta, subacida, largiù
epotis, fuere valde utilia. Quamprimùm Co
ctationis Signa, Urina nempe subsidente & remitt
tente Febre, apparebant, Cortex Peruvianus juva
bat apprimè. Sin autem Statu Morbi Coma
aut Delirium, accesserint, Opus fuerit extemplo
Cucurbitulis scarificatis, Humeris Cervicibusque
affixis, Sanguinem detrahère, applicando mox
Epispastica ponè utramque Aures præcipuè
aut Capiti derafo; injecto protinùs *Enema*
laxante.

Utcunque lenia Purgantia; ex Rharbarbaro
potissimùm, Morbi reliquias putridas sub Finem
expurgabant percommodè; *Drastica* tamen, aut
Aloetica, pestiferos omninò habuerunt Effectus
quorum nempe Usu intempestivo vim magnam
Sanguinis dejectam vidimus, & horrenda exci
tata Tormina: imò post *Catharsin*, etsi valde
lenem, Haustus *paregoricus* erat omninò neces
sarius.

Quamplurimi hoc Morbo correpti fuerunt
pauci verò periere.

AUGUSTO.

Parùm utique Pluviæ durante Augusto; Initio
quidem & sub Finem aliqua decidit, tunc quo
que è madido Noto crassus influxit & valdè hu
midus Aer. A x^o ad xxiv. fervida ac aprica
Tempestas, Subsolano plerumque afflante pla
cidè. Haud insignis erat elevatio, aut depressio
Barometri hoc Mense.

Pluvia 1. 3. 5. $\frac{1}{6}$. 9. 24. $\frac{11}{26}$. 27. $\frac{1}{29}$. 31.
Dig. Dec.

= 1. CO2.

Magna sæpe Roratio Mense medio. Tonitru è
longinquo ab Occidente 20. 23.

⌘ Altitud. maxim. 16. 29. 9. E b N 1. } media 29. 6.
— minima 6. 29. 2. VV N VV 2. }
Dies frigid. 8. 37. NN VV 1. } med. Therm. Altit. $28\frac{8}{30}$.
— fervid. 23. 18. Malacia. }

Febris *epidémica* perdurat adhuc: medio autem
Mense Pustulæ rubræ, *miliares*, longè erant fre-
quentiores quàm Mense proximè elapso. *Va-*
riola mali admodum moris sæviunt. Scabies jam
plurimos infestat, eos præcipuè, qui ab *epidemi-*
ca Febre convaluerant.

S E P T E M B R I.

Hoc Mense ruebant Vapores, quos fervor
Æstatis excitaverat, in Pluvias nempè graves &
perpetuas resoluti; Aer interim erat maximè
crassus ac humidus: rara Apricitas, *Barometer*
demissus valdè, Vulturnus fere assiduè à se-
cundo Die ad decimum sextum, isque non ra-
rè vehemens; exin ad Finem usque Libs fu-
rens sæpe.

Pluvia $\frac{111}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{11}{6}$. $\frac{111}{12}$. 15. $\frac{111}{16}$. — $\frac{11}{19}$. $\frac{11}{21}$.
Dig. Dec.
22. 23. — 30. = 6. 498.

Procella 8. Nocte. S E b S — 21. S S VV,
22. VV S VV. Turbo 10. E b N. AB. 12.
E b S.

F.

⌘ Altitud.

γ Altitud. maxim. 3. 29. 5. E b N i. } media 29. $2\frac{14}{24}$
 ——— minim. 16. 28. 7. S S E 3. }
 Dies frigid. 23. 42. VV S VV 2. } med. Therm. Altit. $32\frac{14}{24}$
 — tepid. 1. 28. VV. 1. }

Variolæ adhuc malignæ grassantur maximè cum Maculis purpureis, sæpe etiam nigris, interspersis: Statu morbi Pustulæ nigrescunt, aut crudo diffluunt *Ichore*. Crustæ nigræ diu admodum, etiam convalescentibus, adhærescunt: *Crisis* in *Confluentibus* difficillima, nec Febri sæpe Finis est nisi post xvii. sæpe non nisi post xxi. Diem; Vermibus persæpe ex Alvo dejectis. — (B) Febris *epidemica* etiamnum perdurat, rariùs autem.

OCTOBRI.

Initio Pluvia, tunc Apricitas, surgente *Mercurio*; derepentè autem cecidit: à xv. ad xxiv. Pluvia perpetua. Vento subinde ex Plagis australibus furente: à xxiv. tamen ad ipsum Finem inter Boream & Vulturnum constitit, parca cadente Pluvia.

Pluvia $\frac{1111}{1.}$ — $\frac{11}{5.}$ 6. 9. $\frac{1}{11.}$ 12. 15. $\frac{1}{16.}$ —
 Dig. Dec.
 $\frac{11}{19.}$ $\frac{11}{20.}$ $\frac{1111}{22.}$ $\frac{1}{23.}$ — 26. 31. = 3. 985.

Procella 11. Nocte. S VV — gravis cum Fulgure & Tonitru 19. Nocte. S S VV — mane E S E. Grando 12. 20. 21. AB. 14. N VV 1.

γ Altitud. maxima 8. 30. 0. Malacia. } media 29. $4\frac{26}{27}$
 ——— minima 19. 29. 0. S S VV 4. }

Dies frig. 14. 55. N VV b VV 1. Pruina mane. } med. Therm.
 — tepid. 9. 34. S VV 3. } Altitud. 43 $\frac{18}{27}$

Sæviunt adhuc *Variolæ epidemicæ*, non hic solum, sed undique ferè; eæque sæpe malignæ & atræ, quarum Crustæ nigræ, diu adhærentes, Faciem deturpant maximè.

Febris *secundaria* solito vehementiùs urget, ac perdurat diutiùs; non rarò ad vigesimum usque Diem & ultrà, pluresque morti committit. Ad hanc verò arcendam nihil successit feliciùs, nihil optatius, repetitis *Catharticis*, adjecto interdum *Calomelane*; *Paregoricis* verò interpositis subinde. Hoc non solum in carissimis meis Liberis expertus sum, sed in quamplurimis aliis, faustissimo utique Eventu; sane vix ulla alia Medicina profecit.

Qui vult de hoc Argumento plura, adeat Epistolas viri, dum viveret, undique perdocti, JOANNIS FREIND; nec non illustrissimi RICARDI MEAD, aliorumque doctissimorum Medicorum, unà conscriptas: etiamque, si non pigebit, quæ & * ipse de hac Re olim disserui.

Vix quicquam profectò in his *Variolis* magis funestum observavi, quàm Rigores accedentes, aut Horrores, in ipsa Morbi *Ἀκμῇ*: Symptomata utique in isto Morbo, isto Tempore, atro semper Carbone notanda!

Febris lenta, nervosa, jam fere cessavit penitus.

F 2

NOVEM-

N O V E M B R I.

Totus Mensis fuit procellosus admodum, ac maximè pluviosus; Libs sæpe furebat & Auster: hinc *Baroscopium* subsedit plurimùm. Maximæ sunt Inundationes undique.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{2}{2}$. — $\frac{4}{4}$. 6. $\frac{1111}{7}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{11}{11}$. — $\frac{11}{13}$. — $\frac{1}{16}$.
 $\frac{11}{18}$. $\frac{1}{19}$. 20. $\frac{111}{23}$. $\frac{1111}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{11}{26}$. 27. 30. = 6. 333. Dig. Dec.

Procella 2. S S VV—6. Nocte. S VV—18. & 19. Nocte. S VV—24. Nocte. Sb VV—27. multo mane VV N VV. Magnum Lumen boreale 5. H. x. p. m. VV N VV 1.

8 Altitud. maxim. 22. 30. 2. VV N VV 1. } media 29. $4\frac{26}{29}$
 ——— minim. 25. 28. 7. S VV 3. }
 Dies frigid. 21. 56. N. VV 1. } media Therm. Altitud. $47\frac{14}{29}$
 — calid. 3. 40. S S VV 3. }

Variolæ epidemicæ adhuc. — Febricula *catarrhalis* cum importuna Tussi, *levi Dyspnœa*, *Anorexia*, Languore & Doloribus *rheumaticis*, sævit passim; cum autem solito vehementior est, in notham abit Pleuritidem, aut Peripneumoniam: at ex facili abigitur plerumque Missione Sanguinis, ac *Emetico* leni; unum, alterumve, postea applicando *Epispasticum*, & tunc exhibendo *Diluentia*, blanda *Sudorifera*, *Papaverina*, &c. inter quæ, Sp. Volat. Oleos. — C. C. Elix. Asthmat. ex sero Lactis Canariensi diluto, tepido, profuerunt maximè.

D E C E M B R I.

Perduravit nimboſa valdè & pluvia Tempeſtas
 Diem aduſque decimum Decembris, Libanoto
 fremente; inde verò fortis ab Oriente Ventus
Mercurium erexit plurimùm, ſudo nonnunquam
 conſequentē: à decimo nono deflexit ruruſus ad
 Auſtrum per aliquot Dies, & multa Pluvia ceci-
 dit. Ad Finem Menſis Apricitas. Aer per totum
 craſſus maximè & humidus, ac ſolito tepidior,
 nempe ut in ſuperiore Menſe fere.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$
 1.—3.—5.—7.—9. 11.—15. 18.—20.

Dig. Dec.

$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$
 21. 23. 24. 25. 28.—4. 180.

Grando vehemens 3. a. m. Nix. 16. E N E 1.
 Gelu 15. 16. Procella 3. Nocte. S VV—5. S S VV.
 Permagnus Maris Æſtus 8. S S VV 3.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 2. E N E 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$
 ——— minim. 1. 29. 0. S VV 3. }
 Dies frigid. 16. 63. } media Therm. Altitud. $51\frac{17}{30}$
 — tepid. 8. 44. S 2. }

Tuſſes, Febris catarrhalis & Variolæ adhuc
 epidemicæ: Mania ſolito frequentior.

Tota Pluviæ Quantitas, Anno MDCCXXIX.
 Dig. Dec.

33. 055.

Notæ breves:

(A) Haud rarò equidem notavi, verno præfertim Tempore, Glaciem, etsi *Thermometrum Hawksbeianum* fuit ad 55. solùm; media autem Hyeme nullam, cùm tamen ad Gradum 65. & ultrà descenderit: quod quidem, Februario elapso, Diem inter decimum septimum & vigesimum primum contigit: tunc enim vix ulla, vel levissima, Glacies erat, quamvis *Atmosphæra* erat valdè frigida, Ventusque fortis ab Oriente Spiritum *Thermometri* depresserat ad 67. usque.—Notante clarissimo Cyrillo Act. Philosoph. Anglic. N^o. 424. & 450.; cùm Spiritus Therm. Hawksbeian. est ad 55. tantùm, Gelu adest Romæ plerumque.—† Gradus adeò Frigoris, quo Glacies producitur, non videtur fixus & certus: quod sanè haud leve Argumentum est Congelationem non à sola Privatione Motus, aut Caloris, pendere ‡.

(B) Annon humida calidaque Temperies Aeris, Æstate prægressa, Fibras relaxando plurimum Sanguinem atque Lympham ad Lentorem nimium disposuerat? Olea verò Salesque Corporis ad Acrimoniam justo majorem? Idque præcipuè cùm & istis accesserit *Atmosphæra* Pressura solito plerumque minor? Estne ergo manifesta satis Febris hujus, & *Variolarum* malignarum, unà grassantium, Causa?

Per talem *Atmosphæra* Constitutionem Morbi contagiosi haud dubio propagantur maximè;
tunc

† Vide *Prolegom.* p. xvi.

‡ *Ibid.* p. xiii.

tunc enim Latrinæ, Mephitides & putrida omnia, longè pejùs foetent: imò Animalium Caro, bubula scilicet, aut ovilla, longè citiùs corrumpitur quàm sicco durante, ac frigido, Aere, qui impura & morbida *Effluvia* excitat altiùs dissipatque. Cùm verò circumvolitent, imò quasi Terræ Superficiem circumvallent, Quantitate multò majore hauriuntur, non solum ipso cum Spiritu, sed & per omnes etiam Corporis *Poros*: neque enim jam *Atmosphæra* Pondus idoneum, & debita Fibrarum Vis, satis validè impellunt Humores aut Contagia propellunt; quo plus Virus autem excipitur, eò peiores edit Effectus. Frigida contrà, vel procellosa, Tempestas, aut Contagem arcet, aut pestilentem dispellit Auram.

Quinetiam perdurante Aeris Constitutione calida, ac humida, Humores ipsi Corporis Lentorem nimium contrahunt & Acrimoniam: unde Contagii Vim tunc accipiunt promptiùs. Multum utique facit instans Sanguinis status ad promovendum, aut arcendum, Veneni Effectum. Hunc Vipera mordet, aut rabidus Canis, illumque itidem; alterum cita mors abripit, alter vix quidem ægrotescit. Hinc hyberna Frigora non solum Febribus contagiosis obstant, quatenùs Aerem faciunt puriorem, sed & fibras Fluidaque Corporum nostrorum corroborando minùs obnoxia Pestilitati reddunt: atque ideò quoque Medicamen, quod hoc efficere potest, quale quidem est Cortex Peruvianus cum *Alexipharmacis* idoneis & *Stomachicis*, optimum proculdubio *Prophylacticum* erit. Ego uti soleo. Tinctura Quinquinæ cum Cortice Aurantiorum Hispalensium & Radice Serpentariæ Virginianæ ex Vino Hispanico, aut Spiritu Vini Gallici.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXX.

JANUARI O.

INCIPIENTE Anno insignis *Barometre*
 Altitudo sudum fecit Cœlum &, Borea assidue
 perflante, frigidum: *Atmosphæra* interim fuit
 tenuis & sicca, at nonnunquam glacialis quædam
 Nebula omnia Gelu quasi incrustabat, Die duo-
 decimo potissimum. Sub Finem Mensis, ver-
 gente ad Occasum Vento decidit *Mercurius*: ad
 ipsum verò Finem resurgebat, quod Serenitatem
 reduxit & Gelu.

Pluvia 14. 17. 20.—24. 27. 28. 29. Nix 4
 Dig. Dec.
 = o. 666.

⚡ Altitud. maxima 10. 30. 6. E N E 1. } media 30. 0⁵/₃
 ——— minim. 28. 29. 4. S VV 3. }
 Dies frigid. 12. 70. Malacia. } media Therm. Altitud. 59
 — tepid. 28. 52. S VV 3. }

Variolæ sæviunt adhuc, haud tamen ita lethæ-
 les: *Febris catarrhalis* plures adhuc infestat. Pa-
 roxysmi graves asthmatici frequentes.

FEBRUAR

F E B R U A R I O.

Durante Februario Ventus ab Occidente, aut Meridie, frequens Pluviam demisit & *Baroscopium*; exeunte autem Mense Aquilo Glaciem, Grandinem, Nivem, miro quodam Modo; pulchra nempe Apricitate intercurrente subinde, maxima cum Aeris Tenuitate & Siccitate, induxit: delabente tamen usque *Barometro*

Pluvia 2. — ^{III}4. — 6. ^{II}8. 11. ^I13. 15. 16. 18. 20.
Dig. Dec.

Nix 8. — perpetua 27. Grando 14. 24. = 2. 3 15.
Lumen boreale permagnum 23. H. 9. p. m.
N b E 1.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 1. E b N 1. } media 29. $5\frac{23}{8}$
— minim. 27. 28. 8. E N E 2. }
Dies frigid. 1. 66. E b N 1. } media Therm. Altit. $52\frac{15}{28}$
— tepid. 20. 48. VV 1. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed distinctæ, & rarò mortiferæ: Pleuritis & Peripneumonia passim. Morbi colici graves sub Finem Mensis, ab eadem fortè (A) Causa, quæ fuit Pleuritidis; utrisque enim Missio Sanguinis profuit maximè; Cruor- que æquè viscidus ex Colicis, ac ex *Rheumaticis*, aut Pleuriticis effluxit. Lenia tantùm & *anti-phlogistica Purgantia* juvabant, nocebant prorsùs *Drastica* & Medicamenta calidiora; imo horrenda sæpe excitabant Tormina, ac Urinam sup- primebant penitus: *Clysmata* utique & Fomenta emollientia inveni utilissima.

MARTIO,

M A R T I O.

A quarto Martii Die octavum adusque Auster nimbosus Mercurium maximè depressit, plurima ruente Pluvia; inde ad decimum quintum nulla, nisi decimo, afflante plerumque Favonio: tunc cadente rursus Barometro Pluvia quoque descendit usque ad vigesimum primum: sub Finem verò resurgebat Barometer, licet Ventus variabat quotidie.

Pluvia	$\frac{11}{3}$.	$\frac{11}{4}$.	$\frac{1}{5}$.	$\frac{1}{6}$.	$\frac{11}{7}$.	10.	15.	$\frac{11}{17}$.	$\frac{11}{18}$.	$\frac{11}{19}$.		
	$\frac{11}{21}$.	$\frac{1}{25}$.	26.	28.	29.	Grando	5.	25.	= 3.	432.	Dig. Dec.	
Levis	AB.	9.	H.	11.	p. m.	Malacia.	Procella	gravisque	Pluvia	6.	sera Nocte.	SS VV.

Altitud. maxim.	31.	29.	9.	N 1.	} media 29. $4\frac{12}{31}$
minim.	7.	28.	5.	S b VV 3x.	
Dies frigid.	1.	63.	N N VV	1.	} media Therm. Altit. $49\frac{22}{31}$
— tepid.	13.	42.	Malacia.		

Variola adhuc *epidemicæ*, at Ruri maximè. Morbi colici graves passim; necnon Peripneumonix Affectibus, *nervosis* stipatæ, sub Finem Mensis præcipuè.

A P R I L I.

Ab ipso Initio Aprilis ad decimum octavum Diem varia fuit Cœli Facies ac Tempestatis, variante paululùm subinde *Baroscopio*: tunc Subsolani Afflatus Nubes dispulere & Pluviam, *Atmosphæra* quoque sicca facta est & tenuis valdè.

Malacia

Malacia interfuit frequens hoc Mense, plurimum Noctu decidente Rore.

Pluvia $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{11}{11}$. 13. $\frac{11}{16}$. — 18. — 1. 258.
 Tenuis Glacies mane 20. E b N 1. Levis AB.
 1. Malacia — 3. VV N VV 1.

Altitud. maxim. 20. 30. 1. E b N 1. } media 29. $7\frac{11}{29}$
 ——— minim. 17. 29. 3. VV S VV 2. }
 Dies frigid. 4. 52. N VV b VV 2. } med. Therm. Altit. $43\frac{6}{29}$
 — tepid. 28. 37. Malacia. }

Morbus colicus & *Variolæ* adhuc passim. Fe-
 bres *nervosæ*, remittentes, intermittentes, levi-
 sæpe Delirio accedente, frequentes. Tumores
Capitis erysipelatosi, medio præsertim Mense.
 sub Finem Tusles, Pleuritides, Peripneumoniæ,
 & veræ, & nothæ.

M A I O.

Fremuit ab Oriente, aut Septentrione, Ventus,
 accedente magna *Atmosphæræ* siccitate, donec
 octavo Die, stagnante Aere, pluvia decidit:
 ab undecimo ad vicesimum incerta admodum &
 Pluvia Tempestas, declinante *Barometro*, humido-
 que facto Aere; dehinc, etsi Pluvia fuit parca,
 Tempestas haud aprica sequuta est.

Pluvia $\frac{11}{8}$. 11. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. 15. $\frac{1}{17}$. $\frac{11}{18}$. 19. $\frac{1}{23}$.
 Dig. Dec.
 25. 28. = 1.604.

Altitud. maxim. 1. 29. 8. E b N 3. } media 29. $5\frac{2}{30}$
 ——— minim. 19. 29. 0. S 2. }
 Dies frigid. 3. 46. N b E 2. } med. Therm. Altit. $37\frac{22}{30}$
 — tepid. 31. 30. N VV 1. }

Febres

Febres intermittentes & remittentes cum profusis Sudoribus jam grassantur, quibus, in Paroxysmis, accedit sæpissimè aut Delirium, aut *Diarrhæa*: hæ, vel ex levi Errore, in continuas malignas *nervosas*, transibant haud infrequenter. Crebræ quoque hoc Mense fuere Febres *rheumaticæ*, pleuriticæ, peripneumonicæ; facile autem & abundè (B) expectorabant Sputa flava, subrubicunda, eaque brevi *judicatoria*; adeò ut, nisi ipso Morbi Initio, Venæ sectionem, saltem repetitam, haud desiderarent.

J U N I O.

Prævaluit hoc Mense Ventus occidentalis; nunc ad Austrum, nunc ad Septentrionem flexus; & medio & exeunte Junio Aer valdè humidus: nulla fuit notabilis *Barometri* elevatio hoc Mense.

Pluvia 6.—9. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{15}$. 17. 18. 24.
Dig. Dec.
26.—28. = 1. 715.

8 Altitud. maxim. 1. 29. 8. N V V 1. } media 29. $5\frac{16}{30}$
— — — minim. 15. 29. 1. S V V 1. }
Dies frigid. 10. 41. V V N V V 1. } media Therm. Altit. $83\frac{3}{30}$
— calid. 28. 28. Malacia. }

Jam fere vaneſcunt penitùs Febres *ouvexés*: vix ullæ niſi de Languore Virium Querelæ, quod inter omnes.

J U L I O.

Spiravit usque ab Occidente Ventus, is verò lenis, & paulò magis vergens ad Austrum, toto Julio, Malacia sæpe interveniente: eadem pene, quæ in superiore Mense, Tempestas, ni quòd *Atmosphæra* magis humida esset, tepida & nebulosa, sub Finem Mensis præsertim.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1111}{7}$. 8. 10. 16. 25. — $\frac{1}{28}$. $\frac{111}{29}$. 31.
Dig. Dec.

= 2. 050.

Tonitru è longiquo 1. Fulgur & Tonitru cum gravissima Pluvia. 7. VV. 1.

Altitud. maxim. 15. 29. 9. Malacia. } media 29. $6\frac{2}{31}$
— minim. 29. 29. 3. VV & VV 2. }
Dies frigid. 2. 40. NN VV 3. } media Therm. Altit. $31\frac{17}{31}$
— calid. 22. 27. Malacia. }

Variolæ mali admodum Moris per totam fere Cornubiam: maximæ de Languoribus Querelæ undique, ac plurimi *hysterici* & *hypochondriaci* Paroxysmi. Exeunte Mense Icterus frequens valdè, ac plures Febres lentæ; aliquæ *miliares*. Jam Lues bovina grassatur.

A U G U S T O.

Ab initio Augusti ad Diem decimum septimum Ventus fuit varius, plerumque verò ab Occidente; tunc orsus est Aquilo, sudo consequente Cœlo: inde Boreas, aut Vulturnus ad ipsum Finem. Aer fuit hoc Mense humidus sæpe

Sæpe & nebulosus; à decimo septimo tamen ad
vicefimum tertium satis fæccus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 6. 9. $\frac{11}{14}$. 15. 23. $\frac{11}{26}$. 27. 29. $\frac{11}{30}$.
Dig. Dec.
= 1. 538.

Magna AB. 28. E 2. Fulgur & Tonitru è
longiquo 26.

Altitud. maxim. 18. 30. 0. N. 1. } media 29. 6.
— minim. 26. 29. 2. S S E 2. }
Dies frigid. 24. 39. E N E 1. } media Therm. Altit. 29 $\frac{3}{11}$
— calid. 12. 22. Malacia. }

Morbus regius frequens etiamnum cum Febris-
cula & gravi nonnumquam *Hæmorrhagia*. *Variolæ*
adhuc in Vicinia Cornubiensi; perpauci aliter
Morbi.

S E P T E M B R I.

Multa Pluvia decidit inter quartum & deci-
mum quintum Diem Septembris, Vento interim
variante quotidie; post id Tempus Eurus ferè
perpetuus, at Pluviæ parum, quamvis Cælum
fuit plerumque nubilum, & Aer sæpe valdè hu-
midus. Maxima Roratio à decimo septimo ad
vicefimum quartum.

Pluvia 4. $\frac{1}{5}$. — 10. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{12}$. — 15. 26. = 2. 068. Dig. Dec.
Levis AB. 24. E b S 1. — 27. N N V V 1. —
magis lucidum 26. Malacia.

Altitud. maxim. 18. 30. 0. E 1. } media 29. $5\frac{23}{29}$
— minim. 11. 28. 8. S V V 3. }
Dies frigid. 18. 45. Pruina. } media Therm. Altitud. 34 $\frac{14}{29}$
— tepid. 6. 29. S 2. }

Plures

1730)

Constitutio Aeris, &c.

49

Plures *Apoplexia* & *Paralysi* correpti sunt :
Mulieres multæ Tumore Crurum *erysipelatoso*
vexantur: Tusses & *Coryzæ* sub Finem fre-
quentes.

O C T O B R I.

Perflavit Diem adusque octavum Ventus orient-
alis violenter, quarto autem & quinto vehe-
mentissimè; adeò ut omnes fere Arbores, ictas
quasi Fulmine, Foliis spoliaverit; imò plures
vertit funditùs. Postea multo lenior ab Occasu,
ut Meridie, successit Ventus, Finem adusque
durans, multa interim ruente Pluvia. (C) Tan-
tos excitavit Vapores Procella Mensis initio, ut
reddita esset inde Atmosphæra maximè humida;
Frondes Arborum Gustu valde falsas deprehendi
d tertium & ultra à Littore Lapidem: adeò
Mare perturbavit.

Pluvia 6. $\frac{2}{7}$. $\frac{1}{8}$. — 10. $\frac{11}{12}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{11}{17}$. $\frac{11}{18}$. — $\frac{11}{23}$.

„ „ Dig. Dec.
— 25. $\frac{11}{28}$. — 30. = 3. 372.

Procella 3. E 4. — 4. E 4. — 5. E b N 4.

Altitud. maxim. 16. 29. 8. VV 1. } media 29. $4\frac{8}{30}$
— — minim. 5. 29. 1. }
Dies frigid. 6. 53. E 3. } media Therm. Altitud. $41\frac{5}{20}$
— tepid. 15. 38. Malacia. }

Multæ Tusses & Affectiones *rheumaticæ* toto
hoc mense, at fere sine Febre. Morbi colici,
Diarrhæa plerumque comitante, quamplurimos
invadunt; at longè vehementiùs cum sine *Diar-*
rhæa. Asthma, & notha Pleuritis, passim.

NOVEM

N O V E M B R I.

Initio Mensis horrida Tempestas; primo Die Fulgur cum Tonitru vehemens, gravissima ruente Pluvia, Libs. porrò sævissimè perfurebat; ab octavo autem magis læta Rerum Facies, *Mercurio* resurgente, ac Favonio flante: decimo sexto tamen Libs. recurrit nimbosus & pluvius admodum, Aer interim maximè humidus. A vicesimo sexto Septentrio perpetuus, qui *Barometrum* reddidit elatum valdè, Aeremque ficcum, accedente Gelu.

Pluvia $\frac{III}{I}$ 1. — $\frac{II}{3}$ 3. — $\frac{II}{5}$ 5. 6. $\frac{II}{8}$ 8. 10. 11. 15. $\frac{IIII}{17}$ 17. $\frac{I}{18}$ 18.
Dig. Dec.

19. 20. 21. 22. 23. 27. — 4. 480.

Procella 1. S. VV 4^x. — 2. S VV 4^x. — 3. S VV
b S 4^x. — S VV 4. Nix multa 25. p. m.

⌘ Altitud. maxim. 30. 30. 4. N. 1. } media 29. $7\frac{3}{29}$
— minim. 3. 28. 9. S VV b S 4^x. }
Dies frigid. 30. 65. N. 1. } media Therm. Altitud. $48\frac{28}{29}$
— tepid. 22. 41. VV 1. }

Morbi colici plures cum affectibus *rheumaticis*: Gravedines & *Catarrhi* frequentes: *Synochus* putrida passim.

D E C E M B R I.

Permagna fuit *Barometri* Altitudo Mense Decembri, Septentrione, Borea, aut Euro, afflantibus assidue.

Incipiente Mense rigidum Gelu, tunc quoque, ac sæpe post, serenitas: à vigesimo primo ad

1730)

Constitutio Aeris, &c.

51

ad Finem usque Aer valde humidus, Pluvia subinde cadente.

Pluvia 8. 10.—12. $\frac{1}{16}$. 23. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{26}$.—28. 31.

Dig. Dec.

= 1. 190.

8. Altitud. maxim. 3. 30. 5. Nb E 2. } media 30. $0\frac{22}{28}$
 ——— minim. 23. 29. 5. S S. E 2.

Dies frigid. 2. 68. N NE 1. } media Therm. Altitud. $58\frac{24}{28}$
 — tepid. 27. 50. Malacia.

Colica fuit frequens haftenus; Rheumatismi porrò cum Inflammatione multò majore, quàm antea: Tusses siccae, laboriosae cum Tumore Faucium: Peripneumonia passim, sub Finem verò Mensis praecipue. Febres lentae, nervosae per Viciniam, at in Oppido rarius.

Tota Pluviae Quantitas, quae hoc Anno decidit, fuit 25. 698.
 Dig. Dec.

Notationes aliquae.

(A) Nihil sanè in Artem medicam pestiferum magis unquam irrepsit, quam generalia quaedam nomina Morbis imponere, iisque aptare velle generalem quamdam Medicinam. Ita videlicet omnis Dolor Ventris Morbus colicus nuncupatur protinus; indito sic Nomine, quid ultra Empirici, Batrones, id Genus omne, quàm Arcanum quoddam porrigere, aut Pharmacopœiae cujusdam Indicem evolvendo, quærere quid ibi ad Colicen?

G

Quid

Quid inde? Elixir Salutis, Tinctur. sacra, Pil. Coch. min. vel è Duob. aut tale quid, exhibetur illicò; seu inflammata sint Intestina, seu constricta *Spasmo*: unde sæpe Toxica potius, quàm Remedia, fiunt. — Prudentis autem est Medici primò æstimare Morbi Causam, eumque deinde solvere tentare. — Adeò nimirum ubi sævit abdominis Dolor vehemens, fixus, pulsans; & acris Calor adest, Pulsusque velox & tensus, non protinùs exhibenda sunt acria *Cathartica*: quò plùs enim proceditur, *drastica* urgendo *Pharmaca*, eo vehementiùs furit Morbus, donec supervenit tandem *Ileos* crudelis, *Sphacelusque* demùm lethalis. Sed ante omnia, Sanguis mittendus est, nec parcè nimis: pòst enim Alvus vel leni respondebit *Cathartico*, obserata secùs validissimo. Ubi vero Pituita tenax & acida dominatur, & colicos producit Dolores, Res longè aliter se habet.

(B) In Morbis utique pulmonariis, ubi Excreatio facilis & expedita est satis, adeò non juvat Sanguinis Missio, ut eam sæpe supprimat omnino: nullo ideò Modo indicatur ex Ufù fore, nisi evidens adsit *Plethora*, aut vehemens aliquis Dolor, aut *Dyspnœa* gravis, aut sinceri Sanguinis Sputum, urgeat. Audi Coum Senem, Πτύελον χρί' ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν Ἀλγύμασι τοῖσι περὶ τὸν Πλευμόνα καὶ τὰς Πλευράς, ταχέως τε ἀναπτύεσθαι καὶ εὐπετέως. Hippocrat. Prognostic. vide & ibidem paulò infra: peridò Coac. Prænotion. 13. Sect. de Pleuritide & Peripneumonia, ex editione Dureti: perpende etiam, quæ Ballonius in Epidemic. de hac Re optimè conscripsit; si is non est, quæ ex eo & Dureto diligenter congeffit Baglivius, Appendic. ad Pleuritidem. Tyroni certè medico consulo, ut

ut non audeat tractare Pectoris Morbos, antequam ista probè perlegerit.

(C) Plures utique Vapores excitat Procella quàm vel Sol ardentissimus, potissimum si à Mari venit: hinc post Procellas graviores Atmosphæra plerumque redditur nebulosa valde, & graves corruunt Pluviæ; condensatis scilicet modò Vaporibus, quos Vehementia Tempestatis disperferat undique.

Minutissimæ quidem Aquarum Particulæ, sub Forma Vaporis, per Aerem diffusæ se mutuò fugere videntur; at Frigore condensatæ, vel adversis concurrentibus Ventis congestæ, aut Montibus impactæ obstantibus, in mutuos Amplexus ruunt & decidunt illicò.

CONSTITUTIO

AERIS, &c.

Anno MDCCXXI.

JANUARIO.

CUM novo Anno frigidissima Tempestas invasit ; omnia constricta Gelu, Nive omnia plena ! Asperam autem lenivit Brumam continua fere & pulchra serenitas. Venti aquilonares dominati sunt per totum Januarium, perdurante ad Finem usque rigidissimo Gelu ; Aer interea fuit valdè purus & siccus . Exeunte Mense (A) *Barometer* decidit plurimum, quod demirabar utique ; quoniam ex iisdem Plagis flare perstabat Ventus : hoc verò accidebat forsan ob Copiam Nivis aliis in Locis delapsæ.

Nix 2. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. 5. 24. 26. Grando nivosa
Dig. Dec.

30. 31. Imbres 11. 12. = 0.622.

Fortè vix Dimidium Nivis collectum fuit ; Nix nempe in Excipulo congelata, ibique restans, Locum haud dedit succedenti, adeò ut plurima esset difflata.

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 12. 30. 3. N E 2. } media 29. $9\frac{2}{12}$
 ——— minim. 28. 29. 1. N 1.
 Dies frigid. 31. 76. N. 2. } media Therm. Altit. $66\frac{2}{12}$
 — tepid. 21. 58. Malacia. }

Sævit Morbus colicus usque cum acerbo sæpe
 Dolore *Rheumatico*. Tussēs siccæ, laboriosæ, &
 Accessiones graves *Asthmaticæ*, frequentes, cum
 Tumore Faucium *anginoso* sæpissimè: his maxi-
 mè profuit *Hydromel* tepidum, Serum Lactis *Ca-*
nariense dilutius cum Elix. *Asthmat.* aut Pil. Ma-
 thæi; interposito nonnumquam Oximelite Scil-
 lino & applicatis Humeris Cervicibusque *Vesica-*
toriis. Cruciavit plurimos plurimùm Arthritis,
Variolæ passim in Cornubia.

F E B R U A R I O.

Initio Februarii resurrexit *Mercurius*, at Frigus
 remisit; octavo & nono, ab Austro Procella *Bar-*
ometrum depressit plurimùm: à decimo octavo
 ad Finem usque Venti Septentrionales Nubes a-
 begerunt, nulla omnino decedente Pluvia; sur-
 gente iterum *Baroscopio*.

Pluvia 3. $\frac{11}{4}$. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{11}{13}$. $\frac{11}{14}$. $\frac{11}{15}$. 16. 18.
 Dig. Dec.
 Nix 20. Grando gravis 1. = 1. 706.
 Lumen boreale parvum 19. H. 10. p. m.
 N b E 1.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 3. E N E 1. } media 29. $6\frac{13}{17}$
 ——— minima 9. 28. 9. S S E 4.
 Dies frigid. 1. 73. N N VV 1. } media Therm. Altit. $57\frac{17}{17}$
 — tepid. 10. 53. VV 1. }

Tussis *Asthmatica* frequens adhuc. Pleuritides & Peripneumonix haud paucae. Morbus *anginosus* (*the Strangles* dictus) inter Equos saevit plurimum.

M A R T I O.

Statio *Baroscepii* toto Martio fuit valde sublimis, Ventus ferme assidue borealis, Malacia tamen saepissime intercurrente: Aer purus & maxime siccus, exeunte Mense praesertim: Pluvia parca admodum, at pulchra plerumque Serenitas.

Dig. Dec.

Pluvia 4. 12. 18. 27. = 0. 140.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 2. 30. 4. Malacia.} \\ \text{minim. 12. 29. 7. Malacia.} \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media } 30. 0\frac{22}{31}$
$\begin{array}{l} \text{Dies frigid. 1. 62. N b VV 1.} \\ \text{— tepid. 14. 45. NN VV 2.} \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media Therm. Altit. } 50\frac{6}{31}$

Tusses adhuc & Angina valde frequens inter Equos. Graves Arthritidis Paroxysmi, saevi quoque *Rheumatismi*.

(B) Pleuritides, Peripneumonix, Pleuro-peripneumonix; Tusses siccae, asthmaticae, laboriosissimae, sunt valde *epidemicae*; perparce admodum expuunt Aegroti, anhelant maxime; multi moriuntur.

A P R I L I.

Boreas, isque saepe velox valde, à primo ad duodecimum Diem Aprilis perflavit; Tempestas interea fuit admodum serena & pro Anni Tempore, frigida maxime & sicca: à decimo tertio

1731)

Constitutio Aeris, &c.

57

tertio ad viceſimum Libs, aut Favonius, Pluvia
cadente & *Mercurio*: recurrebat dein ad Orien-
tem Ventus, viceſimo ſecundo & tertio valde
procelloſus, magis poſt vergebat ad Auſtrum,
humefcente *Atmoſphæra*.

Pluvia 13. ¹¹15. ¹16. ¹18. 19. 23. 24. 26. 28.
Dig. Dec.
= 1. 254.
Gelu 7. 10. 11. Tonitru 18. Per magna AB.
26. 10. p. m. N VV 1.

Altitud. maxima 7. 29. 9. E N E 3. } media 29. 5.
— minima 16. 28. 8. S S VV 3. }
Dies frigid. 10. 61. N E b N. 2. rigidum Gelu. } media Therm.
— tepid. 28. 43. E S E 2. — — — } Altit. 48 ²¹/₂₉

Jam morbus inter Equos evaneſcit. *Variola*
paſſim: Pleuritides & Peripneumoniæ frequen-
tiſſimè ſæviunt, ob Humorū Tenacitatē &
difficilem Excreationem Morbus evadit valde
periculoſus; ubi verò expuitur facile, brevi ſe-
datur; præcipuè ſi Sputa miſta ſunt rufo quo-
dam Sanguine: Spumantia ſanè & aquoſa mini-
mè laudo.

M A I O.

Hoc Menſe Subſolanus, aut Vultur-
nus, flabant majore ex parte, Libs aliquando, Caurus
ſæpiùs; ad Finem verò fremebat Aquilo: à de-
cimo nono ad triceſimum primum Aer erat maxi-
mè ſiccus.

Dig. Dec.

Pluvia 4. 5. 6. 8. 10. 16. 17. 22. 24. = 0. 634
Fulgur & Tonitru 22. 24. Malacia.

Altitud. maxim. 30. 30. 1. NN E 3. } media 29. 7.
— minim. 6. 29. 3. S E 1.
Dies frigid. 1. 48. S E 1x. } media 36 $\frac{8}{31}$
— tepid. 23. 18. N VV 1.

Morbi Pectoris adhuc. *Variolæ sporadicæ* ;
passim *Erysipelas* ; Ischias solito frequentior ;
Tempestas autem ut plurimum salubris est.

J U N I O.

Procedente Junio Aer fuit valde siccus, Ventus
subsolanus, aut arctous, Malacia non rarò inter-
currente; sensim autem delapsus est *Mercurius*,
Aerque factus est sensim humidior. A vicesimo
Libs plerumque regnavit, *Atmosphæræ* Tempe-
riem, ut solet, reddens humidam valde, nebulo-
sam, atque etiam frigidior.

Pluvia 10. 16. — $\frac{11}{19}$. $\frac{111}{20}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{11}{24}$. 25. 26.
Dig. Dec.
28. = 2. 148.

Altitud. maxima 1. 30. 0. E 2. } media 29. 4 $\frac{25}{26}$
— minim. 20. 29. 1. VV S VV 1.
Dies frigid. 7. 38. N 1. } media Therm. Altit. 31 $\frac{2}{26}$
— tepid. 20. 29.

Variolæ epidemicæ exque sæpe mali moris; sub
Crisin aut Humore crudo plenæ, aut nigram ex-
hibentes Faciem. *Erysipelas* frequens, cætero-
quin Mensis fuit saluber satis.

J U L I O.

J U L I O.

Haud notabilis fuit *Barometri* Ascensus; aut Descensus, hoc Mense; Ventus inconstans, *Malacia* porro interveniebat sæpissimè, multo decedente Rore: Aer utplurimum siccus fuit & non rarè valde calidus, præsertim exeunte Mense.

Pluvia $\frac{11}{7}$. $\frac{3}{8}$. $\frac{11}{15}$. $\frac{11}{16}$. $\frac{11}{20}$. — $\frac{11}{23}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{31}$. = 1. 300.
 Dig. Dec.
 Fulgur & Tonitru 31. p. m. S S E 12.

Altitud. maxim. 10. 29. 8. *Malacia*. } media 29. $5\frac{25}{26}$
 ——— minim. 31. 29. 3. S S E 1. }
 Dies frigid. 19. 37. E N E 1. } media Therm. Altitud. 27.
 — calid. 30. 21. *Malacia*. }

Crebræ adhuc *Variolæ*: Febres intermittentes; tertianæ potissimum, sub Finem Mensis, at Ruri maximè.

A U G U S T O.

Ventus ab Exortu perflavit toto Augusto fere; Initio ad Septentrionem declinans, *Barometro* tamen haud multum surgente: sub Finem *Vulturnus* plurimos attulit Vapores & Pluviam.

Pluvia 1. — 3. 9. 10. $\frac{1111}{21}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{11}{26}$. $\frac{11}{27}$.
 Dig. Dec.
 8. 31. = 1. 988.
 Levis AB. 16. N b E 1. Fulgur & Tonitru 9.
 — 21. E S E 2.

Altitud. maxim. 12. 29. 9. N E 1. } media 29. $4\frac{12}{30}$
 ——— minim. 26. 29. 0. E S E 2. }

Dies

Dies frigid. 12. 38.

— calid. 8. 22. N 1. } media Therm. Altitud. 29.

Sævæ Variolæ, & Febres miliares rubræ, epidemica; Tussis convulsivæ inter Pueros.

S E P T E M B R I.

Ineunte Septembri Libs, aut Favonius; ab undecimo Eurus fere perpetuus; Malacia frequens autem medio Mense cum Roratione maxima: ad Initium & ad Finem Aer erat valde humidus.

Pluvia ¹1. ²2. ⁴4. ⁶6. ⁸8. ¹⁸18. ²³23. ²⁴24. ²⁶26. ²⁷27.
Dig. Dec.

28.—30. = 1. 300.

Levis AB. 13. Malacia, permagna autem 27.
H. 10. Malacia.

Altitud. maxim. 11. 30. 0. E 1. } media 29. 5 ¹⁹/₂₅
— — — minim. 27. 29. 2. S S E 2.

Dies frigid. 9. 42. VV N VV 1. } media Therm. Altitud. 52 ²¹/₂₅
— tepid. 1. 30. S VV 1.

Variolæ passim. Febris miliaris cum pravis admodum Symptomatibus haud infrequens. Cholera plurimæ.

O C T O B R I.

Principio afflavit Zephyrus, Malacia sæpe interposita; ortus est Vulturnus undecimo, qui duravit fere ad Diem vigesimum septimum, flante tamen Borea à vicesimo ad vicesimum secundum: ad Finem Libs infremuit, labente plurimum Baroscopio.

Pluvia

Pluvia ¹¹6. ¹¹9. ¹¹13. ¹¹14. ¹¹15. ¹¹16. ¹¹24. ¹¹25. ¹¹27.
¹¹28. — ¹¹30. ¹¹31. = 2. 366.
 Dig. Dec.

Fulgur & Tonitru 14. Vesperi, Malacia.

Cholera adhuc, Febre sæpe comitante, & non
 rarò Eruptione *miliari* salutifera: colicus insu-
 per Morbus jam grassatur.

N O V E M B R I.

Per Initia Novembris *Barometri* Statio fuit
 humilis, etsi Eurus Zephyro successit, qui spira-
 vit à quinto ad duodecimum; à decimo tertio
 ad vicesimum tertium *Corus*, aut *Favonius*, sur-
 gente *Mercurio*: inde *Boreas*, Finem adusque
 perflans, Nubes dispulit, Aerem siccavit pluri-
 mum, rigidumque Gelu induxit.

Pluvia ¹1. — ¹¹4. ¹5. ¹7. ¹8. ¹¹9. ¹¹10. ¹¹14. ¹¹18. ¹¹20. ¹¹22.
 Dig. Dec.

Nix 28. = 2. 356.

8 Alitud. maxim. 26. 30. 2. N E 3. } media 29. $6\frac{2}{19}$
 ——— minim. 8. 28. 7. S E 3. }
 Dies frigid. 30. 66. N N E 1. } media Therm. Altit. $50\frac{10}{29}$
 — tepid. 3. 40. V V 1. }

Mensis minimè morbosus: nihil nisi morbus
 colicus, isque fere à *Pomaceo* novello.

D E C E M B R I.

Alta fuit *Barometri* Statio toto fere Mense;
 flante plerumque *Cauro*, aut *Aquilone*: Libs
 verò interdum Nubes atque Pluviam invexit.
 Gelu,

Gelū, idque rigidum, à decimo nono ad vicesimum sextum, Borea furente; Aer interea pro Anno Tempore fuit siccissimus.

Pluvia 2. 5. — 8. 10. 13. 15. — 17. 25. 28.
Dig. Dec.

— 30. Grando 7. Nix 26. — 1. 452.

Levis AB. 19. N. 1. Procella 13. fera Nocte:
N W.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. NN VV 1. } mediā 29. 8 $\frac{2}{3}$
— minim. 6. 29. 4. VV b S 2.

Dies frigid. 52. 67. N E 18. } mediā Therm. Altit. 56 $\frac{12}{18}$
— tepid. 12. 49. VV N VV 1.

Morbus colicus adhuc *epidemicus*; Gravedines
frequentes.

Dig. Dec.

Tota Pluviae Quantitas hoc Anno fuit 17. 266.
at magna pars Nivis, Mense Januario, amissa fuit.

NOTATIONES.

(A) Haud exiguum saepe, ac subitum, *Mercurii* Descensum notavi, cum instantis *Atmosphaerae* Facies nulla hujus Indicia prodiderit; sed inquirendo diligentius, aut vehementes Imbres corruisse, aut Fulmina, inter finitimos reperi: unde circumfusus Aer ad *Æquilibrium* restituendum illuc ruebat confestim.

(B) Ortum duxisse videntur hi Morbi *inflammatorii* à diuturna Frigiditate Aeris ac Siccitate, quæ Fibras tensas nimium & Sanguinem plus
justo

justo densum effecerant. Notavit olim Hyppocrates, quod aquilonia Tempestas Tusses moveat, ac dolores Lateris & Pectoris excitet, Aphorism. v. Sect. 3. Ego verò observavi sæpissimè, quod quo sicciora fuere Tempora, eo parior Exscretio, ac Pectoris Purgatio difficilior evenit; quod tamen in Morbis pulmoneis permagni haud dubio momenti est: vix utique scilicet solvitur Peripneumonia sine larga Sputorum ejectione. Nec id magis promovet aliquid quàm larga & frequens Potatio tepidi alicujus Liqueoris *antiphlogistici*, nitrosi, leniterque detergentis; præcipuè post debitam Sanguinis Missionem: quod si minùs ex Voto procedat, Gummi Ammoniacum, Scillitica, Oleosa, detergentia, *Mercurialia* idonea, & nonnumquam etiam *Volatiliza*, adjicienda sunt. At bibere assatim tepidè, imò calidè, perpetuum esse debet, durante præsertim magna *Atmosphæ* siccitate: quod & Vapore Pulmones fovet & relaxat, & Sanguinem satis fluidum conservat. “ Fervida hæc Liqueorum Potio (ait Baglivi) est mihi in Secretis pro dissolvendis pertinacibus Visciditatibus in Pleuritide epidemica & maligna, nec non in aliis Pectoris Morbis, à tali Causa pendentibus. “

At si nimia fuerit in Pulmones Destillatio, eaque cruda & acris, eam lenire oportet Opiato idoneo, quale est Syrupus e Meconio, Laudanum, Elixir asthmaticum, Pilula Mathæi, &c. Cursumque Humoris avertere debemus *Epispasticis* admotis; idque præcipuè Suris internis, modò magna adsit *Dyspnæa* & *Anacatharsis* difficilis: sunt enim salutifera maximè. Vel ipse Medicinæ Parens Abscessus ad Tibias ortos in Morbis,

Morbis etiam vehementibus Pulmonis utiles pronuntiavit: αἱ δὲ Ἀποσάσεις αἱ ἐς τὰ Σπλένα, &c. Hippocrat. Lib. Prænotion. Quantus sanè Consensus est has inter Partes ab hoc uno elucescatis; quod, qui ex Asthmate veteri Tumore Pedum hydropico laborant, Asthmate liberentur: sponte autem evanescente Tumore, vel Arte repulso, protinùs anhelant.

Sed ut in Peripneumonicis movere Sputa opportunum est maximè, id in simplice Pleuritide moliri ineptum est prorsùs. Nihil enim hic æquè juvat ac larga, frequens, & matura Sanguinis Missio, interposita quoque multa, diluente, emolliente Potione: hæc enim Sanguinem diluit & fovet, dum Fibras nimis rigidas relaxat, tandemque coacta resolvit; præcipuè Nitro & Camphora rectè assumptis; quibus & subinde rectissimè adjungitur Papaveris Lacryma, ad compescendam nempe Doloris Vehementiam: huic enim inest etiam relaxandi Vis maxima, adeoque in omnibus Morbis, ex nimia *strictura* (ut Methodici loquuntur) ante omnia juvat. Hinc est quod rapidum nimis Sanguinis Cursum reprimat, & morbidæ materiæ *Pepsin* promoveat maximè: hinc vides plerumque post Opii Usus Sedimentum in Urinis copiosum.

Vera sanè Pleuritis haud magis *Bechica*, *Ecclegmata*, atque id genus alia, poscit quam Inflammatio Cruris, aut ipsa Podagra: longè profectò magis proficimus Fomentis idoneis; hæc enim sæpissimè levant Dolorem, Morbumque evocant. — Imò in pertinace ac sævo Dolore Cucurbitulæ, atque etiam ipsæ scarificatæ, juvant maximè, aliis vix aliquid proficientibus. Sic Celsus, Capit. de Laterum Dolore. “ Confu-
“ gien-

“ giendum ad Cucurbitulas est antè summa in-
 “ cisa Cute. “ Sic Aretæus Cappadox, *Ἐνδελ-
 λοτάτη γὰρ ἐπὶ τῶν Πλευριτικῶν ἢ ἀπὸ Σύνιης Ὁρελείης*,
 Cap. de Curatione Pleuritid. Quidni & *Epispa-
 stica* quandoque in graviore Casu admoveantur?
 Veteres sanè frequenter Sinapi super Pectus im-
 ponebant. — Vivit adhuc & viget bonus qui-
 dem ad sacra Minister, qui, multis abhinc An-
 nis, Pleuritide sævissima correptus erat. Hunc
 nihil prælargæ, eaque quater repetita, Sanguinis
 Detractio juvabat, Anodyna & Fomenta parum,
 brevi recurrente vehemente Dolore: tandem le-
 vi Scarificatione facta, leniterque Cucurbitulis
 extracto Cruore, *Vesicatorium* superimponi iussit.
 Quid fit? intra perpaucas Horas evanuit omnino
 Dolor, neque postea recurrit. Fateor equidem
 quod Ulcuscula paulo difficilius sanarentur; sed
 quid istud, ubi Mors aliter brevi fuerit pro
 Remedio?

Quandoquidem ergo tanta sit differentia Pleu-
 ritidem inter & Peripneumoniam, non erit alic-
 num forsan *diagnostica* utriusque Signa descri-
 bere.

Proprium est Pleuritidis incipere à Rigore,
 quem mox Calor ardens excipit; hisque confe-
 ctim accedit Lateris Dolor vehemens, pungens,
 nunc ad Spinam, ad Claviculas sæpe, nonnun-
 quam ad anteriora Pectoris, tendens: dum verò
 hæc vigent, insignis adest Pulsus Durities, Chor-
 dæ admodum tensæ vibrantis adinstar. Hæc qui-
 dem Pleuritidis Signa *pathognomini* *κώτατα* pro-
 sùs agnosco; Tussis utique, Pace dixerim Ga-
 leni, haud rarò abest omnino.

Peripneumonia, ut ex Hippocrate Celsus, plus
 Peri-

Periculi quàm * Doloris habet. Pulmonum Gravitas ac *Dyspnœa*, Pectoris Oppressio, & Spiritus ex Ore fervens, purulentorumque Rejectio, Febre comitante ac Tussi, propria & minimè fallacia sunt Peripneumonix Indicia.

Fateor equidem quod hi Morbi, longè frequentius quàm vulgo putatur, aut invadunt unà, aut invalescenti Pleuritidi Peripneumonia quoque accedit: ideò Riolanus horum conjunctionem rectissimè nominavit *Pleuripneumoniam*. — Perpende modò utriusque Morbi Sedem, ita Rationem ex facili videbis cur hoc evenit sæpissimè. Exeunt namque ex *Aorta* ad Angulos pene rectos Arterix *intercostales*, ex quibus pleuritix; exeunt ex eadem ad eundem fere Modum Arterix *Bronchiales*, Pulmonis Substantiam irrigantes. Jam ergo cùm multo abundat Glutine Sanguis, & Vasa, solito magis elastica, Humores validissimè propellunt, Pars magis viscida Sanguinis, utpote levior ad Aortæ Latera urgetur, dum fluit mobilior puriorque per Axim Canalis; proinde & in Vascula Pleuræ & Pulmonis, modo descripto ab Arteria magna producta, impellitur: unde Sanguis maximè crassus, parumque idoneus harum Arteriarum Ramusculos permeare, Obstructiones ibidem ac Inflammationes creat. Quis adeò non videt, ita non mirandam esse Peripneumoniam cum Pleuritide conjunctam, ut mirum magis videatur, cur uterque Morbus, eadem urgente Causa, non semper concurrat simul; eoque magis cùm Lobi Pulmonum Pleuræ

* *Ἀπὸνία ἢ μένος Φυέλιμον Πνεύμων, ἀπὸνος γὰρ ὁ Φύσις αὐτῆς; Aret. Cappad. Capit. de Peripneum.*

Pleuræ coalescant, quod non rarò, cætera sanis, accidit?

In ipso quidem Initio omnis Peripneumoniæ Sanguis rectissimè mittitur ex magno Vase, per magnum Vulnus, ut Quantitas & Vis ejus minuantur, & Locus adsit Diluentibus; ac ne, dum urget usque Inflammatio in extremis *Bronchialibus* Arteriis, ipsi etiam Ramusculi Arteriarum pulmonialium inde compressi, obstructi quoque brevi fierent, unde sævissima oriretur Peripneumonia, jugulans ocysimè; potissimum si multæ *Arteriolæ pulmonales* affectæ sint: quo in Casu vix aliquid proficiat nisi largissima Sanguinis Detractio, imò fere ad Deliquium usque. — Pro ratione autem majoris aut minoris, respirandi Difficultatis, major, minorve, Cruoris Quantitas emitti debet. Pulsus enim haudquam in hoc Morbo hujus satis fidus est Index; quandoquidem sæpe ob impeditum Sanguinis Cursum mirè turbatus: imò qui vix sentiendus erat ante venæ Sectionem, sæpe post validè pulsatur. — Haud tamen tutò mittitur post Diem quartum; utique si Sputa subflava, rubescentia, copiosa, libere rejiciuntur. Vide Notationem (B) Anno MDCCXXX.

Hæc pauca cursim de Pectoris Inflammationibus protuli; qui vult plura, eaque perfecta omninò, perlegat diligenter consummatissimos Boerhaavii Aphorismos Capit. de Peripneumonia, &c. — At proh Dolor, dum hæc scribo, ad Deos abit Vir immortalis, quem *Sæcula nulla tacebunt!*

MDCCXXXII

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXII.

JANUARI O.

MENSIS Januarii Principio afflavit Aquilo, & Sudum fecit & Gelu rigidum, *Atmosphaeram* quoque maximè siccam. Totum hoc pulchrum Ventus à Meridie brevi subvertit; imò xv. & xvi. gravissima ruebat Pluvia, inde Malacia perpetua fere ad Diem vicesimum secundum: post varia admodum, at plerumque pluvia Tempestas, cadente *Mercurio*.

Pluvia 8. 11. ^{III}15. ^{III}16. 17. 19. 22. 23. ^I24.
25. ^I26. ^I27. ^I28. ^I29. = 3. 564. Dig. Dec.
Lumen boreale parvum. 18. Malacia.

8 Altitud. maxim. 24. 30. 0. Malacia. } media 29. 6.
minim. 27. 28. 9. S VV 3.
Dies frigid. 9. 70. N. 1. } media Therm. Altit. 58 ⁵/₂₆
— tepid. 26. 50. S VV 2.

Morbus colicus Passim: Tusses, Raucedines, Gravedines & Tumores Faucium valde frequentes.

FEBRUA-

F E B R U A R I O.

Toto hoc Mense Ventus occidentalis prævaluit, aliquando ad Septentrionem, sæpius ad Austrum flectens, continua quasi cadente Pluvia, haud tamen gravi: nullum Gelu.

Pluvia 2. ¹/₄ — ¹/₇ — ¹¹/₁₀. ¹/₁₁. ¹/₁₂. 14. 16. 19.

¹¹¹ Dig. Dec. 21. — ¹¹ 23. 25. 26. 28. = 2. 924.

Levis AB. 7. W 1. Procella: 6. multo mane: S S W 4^r. — 10. Nocte: S W b W.

8 Altitud. maxim. 13. 30. 1. V V N V V 1. } media 29. 7³/₂₉
 ——— minim. 7. 29. 1. V V 1.
 Dies frigid. 8. 36. V V N V V 1. } media Therm. Altit. 49.
 — tepid. 4. 44. S S V V 2.

Idem, qui in precedente Mense, Morbi, ac severiores: (A) Tusse convulsivæ frequentes inter Pueros.

M A R T I O.

Incerta fuit durante Martio Tempestas; nunc nimboſa, sæpe tranquilla, Vento variante sæpiſſimè, plerùmque vero è Septentrione. Initio & paulo ante Finem Barometri Statio erat satis alta, Aerque ſiccus & purus; medio autem Mense, eoque deſinente, concidebat Mercurius & Pluvia multa.

Pluvia ¹/₁. 2. 5. 6. 7. 9. ¹¹¹/₁₂. 13. ¹¹/₁₄. ¹¹/₁₈.

¹¹¹ Dig. Dec. 27. ¹¹ 28. — ¹¹ 31. Nix. 10. ¹¹ 11. = 3. 174.

H 2

Fulgur

Fulgur & Tonitru 28. p.m. Procella 2. Nocte,
w N w — gravis 29. mane, S E 4^x.

8 Altitud. maxim. 4. 30. 2. Malacia. } media 29. 6¹/₃₀
— — — minim. 30. 28. 8. E S E 3^x. }
Dies frigid. 21. 64. N b VV 1. rigid. Gelu. } media Therm.
— tepid. 20. 43. Malacia. } Altitud. 49²⁶/₃₀

Tusses & Gravedines adhuc: Pleuritides, Rheu-
matismi, Peripneumonix, præcipuè verò nothæ,
sæviunt passim: *Variolæ Sporadicæ*.

A P R I L I.

Barometer haud fuit elatus per totum Aprilem;
quamvis Aquilo spiravit nonnunquam, ac Ma-
lacia interfuit sæpe: Medio & Fine Mensis Aer
liquidus erat & valde siccus: à decimo octa-
vo ad vigesimum quartum humidus, perflan-
te Austro.

Pluvia $\frac{6}{1}$. $\frac{11}{3}$. 7. 10. $\frac{21}{15}$. $\frac{1}{18}$. $\frac{11}{19}$. $\frac{1}{20}$. 21.
Dig. Dec.
22. 23. $\frac{11}{25}$. 27. = 2. 196.

8 Altitud. maxim. 28. 29. 7. N 1. } media 29. 4¹⁶/₂₉
— — — minim. 25. 29. 2. S b VV 3. }
Dies frigid. 16. 53. Malacia. } media Therm. Altitud. 44²/₃₀
— tepid. 27. 38. E S E 1. }

Iidem usque regnant Morbi: *Variolæ* in Vici-
nia epidemica.

M A I O.

Subfrigida fuit *Atmosphæra* hoc Mense, à de-
cimo sexto ad vicesimum secundum sicca valde
& fuda:

1732)

Constitutio Aeris, &c.

71

& suda: Ventus tamen ex Plagis australibus *Baroscopium* depresso.

Pluvia 1. $\frac{11}{3}$. $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{8}$. — $\frac{1}{12}$. 22. $\frac{11}{23}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{11}{26}$.
Dig. Dec.

— 28. 30. = 2. 424.

8 Altitud. maxim. 21. 29. 7. N V V 1. } media 29. $4\frac{29}{31}$
— — minim. 27. 28. 8. S S V V 3. }
Dies frigid. 21. 50. N V V 1. } media Therm. Altit. $40\frac{26}{31}$
— tepid. 16. 36. Malacia. }

Cholera Morbus passim; Diarrhæe frequentes;
Ferox Tussis plures cruciat Infantes ac Pueros,
eosque sæpe in Spasmos adigit.

J U N I O.

Ab Initio Junii ad Diem usque decimum
octavum vix ulla Pluvia; Aer interim fuit ma-
ximè siccus & purus admodum, at sæpe frigidu-
lus. A Die quinto ad duodecimum Eurus, aut
Malacia: à decimo nono ad vigesimum secun-
dum gravis Pluvia, Zephyro flante; Septentrio
autem post *Barometrum* erexit. Permagna Rora-
tio hoc Mense, sub Finem præsertim.

Pluvia 17. $\frac{1}{19}$. $\frac{1111}{20}$. — $\frac{11}{22}$. 24. = 1. 270.
Dig. Dec.

8 Altitud. maxim. 26. 30. 0. N N V V 1. } media 29. $6\frac{2}{29}$
— — minim. 10. 29. 2. Malacia. }
Dies frigid. 2. 40. N V V 1. } media Therm. Altit. $31\frac{12}{29}$
— calid. 28. 26. N. 1. }

Febres *miliare*s compositæ & *Rubeolæ* pas-
sim.

H 3

JULIO.

J U L I O.

Ad Principium & sub Julii Finem Aer fuit valde siccus; Ventus enim è Septentrione spiravit, sed lenis admodum; ab octavo autem ad decimum quartum Pluvia multa, flante Noto. Frequens currente mense Malacia & Ros plurimus.

Pluvia 8. ^{||||} 9. — ^{||} 11. — ^{|||} 13. — ¹ 14. 22. ¹ 27. 28.
 Dig. Dec.
 = 2. 288.

Altitud. maxim. 1. 29. 8. Malacia. } media 29. $5\frac{13}{31}$
 ——— minim. 12. 29. 0. S S E 2. }
 Dies frigid. 14. 38. S S V V 1. } media Therm. Altit. $29\frac{19}{34}$
 — calid. 31. 24. N N V V 1. }

Tempestas maximè salubris.

A U G U S T O.

Ineunte & exeunte Augusto Ventus ab Oriente *Atmosphæram* siccavit plurimum; inter nonum & vicesimum sextum varius fuit, nunc scilicet ad Austrum, nunc ad Septentrionem. Parum admodum Pluviæ hoc Mense decidit, at immensa Vis Roris.

Pluvia 9. — 12. 19. ¹ 23. = 0. 362. Dig. Dec.

Altitud. maxima 30. 29. 9. E b N 2. } media 29. $5\frac{16}{30}$
 ——— minim. 12. 29. 2. S 2. }
 Dies frigid. 31. 38. E b N 1. } media Therm. Altit. $28\frac{12}{30}$
 — calid. 19. 23. S 2. }

Diarrhæa

Diarrhææ frequentes : Febres intermittentes
passim.

Morbilli jam ingruunt, Fine nimirum Mensis.
Tusles plures jam vexant Equos.

S E P T E M B R I.

Diem adusque decimum Septembris *Mercurii*
Statio fuerat sublimis, Boreas interim ocyùs af-
flans *Atmosphæram* reddiderat maximè puram: à
decimo autem ad vicesimum quintum Libs, aut
Caurus, multa cum Pluvia; inde Eurus.

Pluvia ^{III} 11. ^{III} 12. — ^I 15. ^{III} 17. 18. 19. 21. 23.

^{III} Dig. Det.

27. = 3.050.

Procella 26. Nocte. E S E. Tonitru Nocte
12. S W 1.

Altitud. maxim. 2. 30. 1. N E 2. } media 29.6.
— minim. 13. 29. 0. V V N V V 2. }
Dies frigid. 30. 45. E 3. } media Therm. Altitud. 35.
— tepid. 10. 29. S V V 2. }

Morbilli epidemici. — Angina tussiens undi-
que inter Equos (dicta *the Strangles*) quæ plu-
rimos suffocat prorsus.

O C T O B R I.

Gravissima sæpe & perpetua fere Pluvia deci-
dit mense Octobri, nimbis ab Austro unà furen-
tibus, plurimùm etiam subsedit *Baroscopium*: id
verò sub Finem crexit Ventus aquilonius, Ae-
remque ficcavit.

Pluvia $\frac{11}{2}$ — $\frac{11}{5}$ $\frac{11}{7}$ — $\frac{11}{9}$ $\frac{11}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{11}{14}$ — $\frac{11}{16}$ 17.
 $\frac{11}{19}$ $\frac{11}{20}$ $\frac{11}{21}$ — $\frac{11}{23}$ $\frac{11}{24}$ — $\frac{11}{26}$ $\frac{11}{28}$ = 6. 342.
 Dig. Dec.

Procella 14. p. m. Fulgur & Tonitru 22. mane
 S b E 2.

Altitud. maxim. 30. 29. 8. NNE r. } media 29. $2\frac{26}{29}$
 ——— minim. 14. 28. 7. S VV 4x. }
 Dies frigid. 31. 52. E b N 1. } media Therm. Altit. $3\frac{5}{29}$
 — tepid. 1. 34. E 1.

Tusses, Coryzæ & Morbilli maximè epidemici
 Jam morbus Equorum sævit maximè.

NOVEMBRI.

Aer fuit valde siccus & tenuis, Ventusque ab
 Oriente, aut Septentrione, toto Novembri, is-
 que à sexto Die ad decimum furibundus: à vi-
 cesimo ad Finem usque omni mane permagna
 Pruina & Gelu, dum lenis Aquilo spirabat.

Pluvia 1. 2. 10. — 12. 16. — 18. $\frac{11}{19}$ 30.
 Dig. Dec.
 = 0. 584.

Turbo aquilonalis 6. H. 9. nocturna.

Altitud. maxim. 25. 30. 4. NE b N 1. } media 29. 9.
 ——— minim. 12. 29. 4. ESE 1. }
 Dies frigid. 29. 63. NE 1. } media Therm. Altit. $55\frac{18}{30}$
 — tepid. 1. 48. E b S 1. }

Morbilli adhuc, & Morbus epidemicus inter
 Equos.

D E C E M B R I.

Perstitit usque ad decimum Ventus aquilō-
nius, hinc Subsolanus: à decimo sexto ad Fi-
nem usque Libs, aut Auster, permulta ruente
Pluvia, ac subsidente plurimūm *Mercurio*. *Atmo-*
sphaera Initio valde sicca erat & frigida rigido
cum Gelu; à decimo sexto autem tepida, ne-
bulosa & humida.

Pluvia 4. $\frac{1}{13}$. — $\frac{1}{16}$. 18. $\frac{111}{19}$. $\frac{1111}{20}$. — 22. $\frac{1}{23}$.
Dig. Dec.
24. $\frac{111}{25}$. $\frac{11}{26}$. 27. $\frac{1}{29}$. $\frac{11}{30}$. 31. = 4.918.
Fulgura 20. 21. Nocte. Procella 29. Nocte
S 4^r. Nix 10. E b N 1.

Altitud. maxim. 2. 30. 2. N E 1. } media 29. $5\frac{20}{28}$
— minim. 31. 28. 8. S V V 2. }
Dies frigid. 8. 66. N E 2. } media Therm. Altitud. $54\frac{13}{28}$
— tepid. 25. 44. S 1. }

Tūsſes, Gravedines, Anginæ, valde frequen-
tes. Lues equina adhuc grassatur, sed immi-
nuta valde est.

Tota Quantitas Pluvix, Anno MDCCXXXII.
Dig. Dec.
= 33.096.

De Pertussi Puerorum.

(A) Ingens adfert Solamen (inquit *Syndeham*)
Venæ Sectio *Pertussi* Infantum, in qua Remedia
quælibet, Pectori dicata, longo post se linquit
Inter-

Intervallo: Idem hoc sentit *Harris* de Morb. acut. Infant. — Oleosa utique & mucosa Medicamenta damno prorsus; quippe quæ Morbum augent, non abigunt certè: iis utcunque Praxis vulgata utatur.

Quæ mihi adeò magis esse ex Usu, longa probavi Experientia, sequuntur. — Sive evidens *Plethora* adsit, sive Sputum Sanguine tinctum, Venæ Sectionem præcipio semper; idque præcipuè, si Febricula, quòd sæpe fit, urget, aut Vultus inter tussendum fere nigrescit: hanc insuper repeto nonnunquam, pro Ratione scilicet Virium & Ætatis. Mox levem moveo Vomitus Syrup. Flor. Persicor. Oxymel. Scillitic. Infus. aut Decoct. Ipecacuanhæ. — Tussis enim, partim saltem, est à Stomacho, ut monuit olim *Waldschmidt*; nam vix unquam cessat Tussis convulsiva Paroxysmus antequam irritans Pituita tenax Vomitu rejicitur: imò tanta sæpe est Illuviei Copia, ut Vomitionem terve, quaterve, proritare necesse sit.

Solvenda porrò subinde est Alvus, at lenibus tantum utendum est *Catharticis*, nempe Rhabarbaro, Mercurio alkalizato, Calomelane. Proluvies namque mucosa hoc modo expurgatur, adeoque nec Chylum inquinat, nec, Vasa Lactea subeundo, Sanguinem. Nocet utique astricta nimium Alvus: nam Febriculam infert, aut Dyspnoeam aggravat maximè. — Nec solum Evacuantibus opus est, exhibenda sunt etiam quæ & Nervos & Stomachum confirmare valent, ac Lentorem Sanguinis attenuare. Hoc Opus absolvent optimà *Mercurialia*, & Cortex Peruvianus, *Stomachicis* idoneis adjectis. Spiritus interea Difficultas & Pectoris Oppressio Solutionem Gum.

Ammo;

Ammoniac. Expressionem Milleped. aut tale quid desiderant sæpe; Vehementiam autem Tussis interdum compescere licet Elix. Asthmat. le Mort. è Syrup. Diacod. quod quidem est optimum, ac tutissimum, in hoc morbo *Anodynum*. Atqui si humor acris admodum in Laryngem, aut Pulmones, destillat, eum oportet avocare admoto Cervicibus *Epispastico*.

His cedit Remediis facile hic Morbus, aliàs sæpe contumax admodum; nec nisi Tempore & Mutatione Cœli fugandus: decantata sanè Muliercularum *Specificæ* (quantum ego unquam observavi) meræ sunt Quisquilie; imò Muscus pyxidatus, modò si quid valeat, propter Vim astringentem, adeoque corroborantem, & ad Naturam Corticis Peruviani aliquanto accedentem, valet. Nobile namque hoc Indiæ *Pharmacum* non solum lentos attenuat Humores, sed & totum *Systema* Fibrarum confirmat; atque sic utraque Facultate agendo Febres intermittentes discutit. — Atqui periodica hujus *Pertussis* Accessio, haud minus certa sæpe quàm vel Intermittentium Paroxysmus, non multum abesse ab earum Indole hunc Morbum indicat: hoc magis etiam probabile videtur, quod uterque Morbus, eadem plerumque Tempestate, grassatur, ab eadem propè Causa pendet, & iisdem fere curatur Remediis.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXIII

JANUARIUS

INGREDIENTE Anno Pluvia frequens *Atmosphæram* humidavit, Vapores autem paulò post Ventus ab Oriente discussit, à decimo sexto ad vicesimum quintum durans, surgente *Barometro*. Per paululum hoc Mense Gelu, imò exeunte eo Aer erat valdè nebulosus & pro Anni Tempore tepidus.

Pluvia 1. — ^{II}4. 5. ^{II}7. ^{III}8. ^I9. 15. 22. ^{III}29. 30.
Dig. Dec.

§ 1. = 2. 384.

Procella 7. Noctè. S. Gelu 14. N w 1. — 2 1/2
E N E 2.

⌘ Altitud. maxim. 24. 30. 2. E 1. } media 29. 7 ²⁰/₃₁
— minim. 8. 29. 3. S VV 3. }
Dies frigid. 21. 62. E N E 2. } media Therm. Altitud. 51 ²⁵/₃₁
— tepid. 28. 47. S 1. }

Tusses, Coryzæ, Morbilli frequentissimi

FEBRU-

F E B R U A R I O.

Flavit ab Occidente Ventus toto Februario,
ad Austrum vergens subinde, non rarò etiam ad
Septentriones: Aer intereà fuit humidus & algi-
dus, at non æquè crassus ac elapso Mense.

Pluvia $\frac{11}{1}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{11}{6}$ $\frac{1}{7}$ 8. $\frac{1}{11}$ 14. 17. — $\frac{111}{20}$ $\frac{1111}{22}$

Dig. Dec.

$\frac{11}{24}$ — $\frac{1}{28}$ = 3.734.

Procella 1. Nocte. S W. Levis AB. 2. H. 10.
N N W 1.

Altitud. maxim. 15. 30. 0. N N V V 1. } media 29. $6\frac{12}{26}$
—— minim. 4. 29. 2. S V V 2. }
Dies frigid. 10. 60. N V V 1. Gelu & maxima Pruina. { media
—— tepid. 7. 49. S S V V 2. ———— { Therm.
Altitud. } $53\frac{12}{26}$

Morbilli plures Infantes Puerosque pereme-
runt; declinante nempe Morbo, quasi Peripneu-
monia suffocatos: nihil profuit fere nisi tempe-
stiva Sanguinis Missio.

Hoc Tempore hanc Regionem infestavit Mor-
bus, omnium quotquot ego saltem memini ante-
hac maximè *epidemicus*; omnes pervasit Domos,
Pauperum Tabernas Regumque Turres: vix
unus, aut alter, Rure, vel in Urbe, Senex, aut
Puer, robustus, aut infirmus evasit. — Quan-
doquidem ergo tanta fuit ejus in omnes Vis
(idque profectò citius, tardiusve, per magnam
Terrarum Partem) è Re fore duxi accuratam
Morbi, prout hic se habuit, Historiam Scri-
ptis mandare.

Ab

Ab ipso Initio Februarii, & in Cornubia, & in Damnonia citeriore, sævierat Morbus hic *epidemicus*; nos tamen Plymuthi ante iv. Iduum Februarii vix attigit: quo Die, nempe Saturni, plurimi subito quasi correpti erant, postridie innumeri, ad xv. kalend. Martii omnes undique.

A levi incepit Horrore Morbus, cui mox accessere vagi & incerti Calores, Gravedo, magna ac importuna valde Sternutamenta; Dolor tunc Dorsi & Artuum errans, ac Pectoris sæpe, at non consistens, gravissimam verò propter Tussim non rarò valdè molestus: Tussi interea & Sternutatione immensa Vis Muci tenuis & acris ejecta fuit. Hæc quasi à Frigore (ut dicitur) recens suscepto; paulò post tamen Febris aliqua, interdum haud exigua, secuta est, Pulsusque velox, nequaquam verò, ut Pleuriticorum, durus & tensus; neque erat Urina valde rufa, sed crassa, ac plerumque subalbida: Lingua non arida, sed plurimo albescente mucò obducta fuit: Omnibus fere aderat Insomnia, Vertigo insuper, aut atrox Capitis Dolor angebat plurimos, levi nonnumquam comitante Delirio. Tinnitus Aurium quamplurimis molestus fuit, multisque in Meatu auditorio Dolor acutus, in Abscessum aliquando desinens; Aspretudo tamen & Faucium Apostemata frequentius enata sunt. Omnes penè ad Sudores fuere valde proclives; qui multi, faciles, continui, intra Biduum, aut Triduum, erumpentes Febrem fere discusserunt prorsus; Urina plurima, subalbida, aut subflava, deponente Sedimenta; lateritia verò rarò admodum: plurimis autem, an ob profusos Sudores, an ob *Epispastica*, nil statuo, fuit valde difficilis.

Alvus

Alvus biliosa Morbum sæpissimè absolvit: haud rarò Pustularum urentium Eruptio.

En Morbi hujus *epidemic*i, ut hìc sæviit, Descriptio! Cui quidem licet omnes fermè succubere paululùm, Letho tamen (si numerum spectes) paucissimi, quos inter Infantes præcipuè, ac Senes pulmonarii.

Abiit plerumque vel intra Quatriduum perbreve, manente solum infesta Tussi, eaque sæpe diuturna valde, cum majore Virium Dejectione quàm quis, pro Ratione Valetudinis, crediderit: idque præsertim, ubi intempestiva Sanguinis Missio præcesserat.

Illos potissimùm Venæ Sectio adjuvit, quos Pectoris Dolor, aut Gravitas, oppresserat; idque ingruente, non sanè declinante, Febre: Omnium penè sanguis albida quadam Pellicula connectus fuit, haud tamen valde glutinosa; nisi, ubi, ob Missionem Sanguinis diutiùs neglectam, in Pleuritidem, aut Peripneumoniam, Febris abierat; quod quidem haud paucis contigit, ex nimio præsertim *Volatilium*, & *Cardiacorum* Usu.

Nausea, aut Vomitus urgens, lene postulabat *Emeticum*, quòd & Stomachi Ægritudinem & Pectoris Oppressionem levabat maximè. Sudores exprimebat insuper; ad quos promovendos Potus multus, tepidus, diluens, etsi Sitis non admodùm urgebat, erat necessarius omninò: quippe sine Sudore vix unquam lætus hujus Morbi exitus. Serum vinosum dilutiùs fuit instar omnium, tepidè epotum; quod utique tanto erat in Usu; ut vix satis suppeteret Lactis ad id conficiendum.

Perutilia fuere, nec omittenda, *Vesicatoria*, pone Aures ac inter Scapulas admota; Dolori Capitis

Capitis enim atque Tumori & Asperitati Fau-
cium certissimum tulerunt Levamen: quinetiam
nimiam in Pulmones Destillationem, Cursum
scilicet acris Colluviei avertendo, prohibuerunt.
——Me adhortante, pro Remediis fuere ma-
ximè Lap. Contrayerv. Spirit. Volat. Oleos. Sp.
C. C.—Lavend. C. Elixir. Asthmat. le Mortii,
& Potiones ex Spermat. Ceti solut. cum larga
Potione Decocti cujusdam pectoralis tenuis, aut
Seri Lactis dilutissimi: quæ & percommode
simul Tussim lenibant, ac Sudores eliciebant
optimè. Ubi verò, post Sanguinis emissionem,
Respiratio gravior & Excretio difficilis preme-
bant, Solutio Gummi Ammoniaci cum Oxy-
melite Scillitico fuit necessaria prorsus: jam
enim instar Peripneumoniæ nothæ urgebat Mor-
bus, & eandem omninò Postulabat medendi
Methodum; Pectoralia nempe maximè inci-
dentia, & Tibiis *Epispastica*; *Emetica* nonnun-
quam, aut lenia *Cathartica*.

Furebat Tussis per totum Morbi Impetum;
sæpe adeò vehementer utique, ut eam *Anodynis*
cohibere fuisset difficile satis: imò usque adeò
interdum perduravit post Febrem abactam, ut
haud paucos, post unum alterumve Mensem,
in Tabem lethalem abriperet; illos præcipuè,
quibus fuerat olim ex Pulmonum Infirmitate
Valetudo minùs prospera. Cum verò notaverim
frequenter, quòd Tussis, oborta *Dyarrhæa*, pro-
fligata esset, *Eccoprotica* ex Rhabarbaro, Manna,
Tartaro solubili, &c. exhibui subinde, facessente
Febre; optato (quod solet) Eventu, Duce Na-
tura: quæ porrò Cibi Appetentiam, toto Morbi
Tempore prostratam valde, brevi restituebant.

1733)

Constitutio Aeris, &c.

83

Morbus fuit herclè, ni ex admissio gravi Errore, rarò lethalis, quem tamen multi, vel ob ipsam ejus Frequentiam, temerè spernentes, feras dedere Poenas Stultitiæ, asthmatici, hectici, tabidi.

M A R T I O.

Januario & Februario tepidiore, successit Martius per Initia paulò frigidior; Ventus quippe ex Plagis arctois spiravit, surgente Barometro: post verò frequens Vulturus *Mercurium* demisit, multamque Pluviam. Ab octavo ad vigesimum secundum Aer satis ficcus fuit & tenuis, inde multo humidior.

Pluvia 1. $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{8}$. 14. — $\frac{11}{16}$. 17. $\frac{11}{23}$. — $\frac{11}{25}$. — $\frac{11}{27}$.
Dig. Dec.

$\frac{1}{28}$. Nix 10. $\frac{1}{21}$. Grando 9. 19. = 3. 098.

Levis AB. 21. 10. p. m. N W 1. Gelu rigidum 10. 11.

8 Altitud. maxim. 3. 30. 2. N N VV 1. } media 29. $4\frac{2}{8}$
— minim. 21. 28. 9. S E 3.
Dies frigid. 10. 62. N b E 1. } media Therm. Altit. $52\frac{23}{28}$
— tepid. 28. 44. E S E 2.

Incipiente Mense Febris *catarrhalis* undique maximè *epidemica*, quæ & adhuc perdurat; jamque etiam Pleuritides, Peripneumonix, & veræ, & nothæ, Anginæ quoque frequentes.

A P R I L I.

Ventus ab Oriente, ad Septentrionem verò sæpe deflectens, toto Aprili prævaluit, unde Aer
I ficcus

liccus & frigidulus evasit; sub Finem præsertim: Malacia tamen subinde & Nebulæ aliquando intervenere.

Pluvia $\frac{11}{8}$. $\frac{111}{13}$. 15. — $\frac{1}{17}$. 18. $\frac{111}{22}$. = 2. 284. Dig. Dec.

⌘ Altitud. maxim. 19. 30. 0. Malacia. } media 29. 6.
 ——— minim. 13. 29. 1. S E 1.

Dies frigid. 27. 50. N E 3. } media Therm. Altit. $42\frac{26}{30}$
 — tepid. 22. 38. Malacia. }

Febris *epidemica* adhuc passim Rure; multique nunc tabescunt ex malè judicata Febre. Peripneumonia & Pleuritide multi corripiuntur.

M A I O.

Hoc Mense mediam plerumque Stationem tenuit *Baroscopium*, flante fere quotidie Subsolano; *Atmosfera* maximè sicca fuit & tenuis; à duodecimo ne vel Guttula Pluviæ, at Ros plurimus & Malacia frequens.

Pluvia $\frac{111}{6}$. — $\frac{1}{8}$. 10. $\frac{1}{11}$. 12. = 1. 010. Dig. Dec.

⌘ Altitud. maxim. 22. 19. 8. E 1. } media 29. $5\frac{10}{27}$
 ——— minim. 7. 29. 2. Malacia. }

Dies frigid. 5. 46. E 2. } media Therm. Altit. $37\frac{10}{27}$
 — tepid. 30. 28. Malacia. }

Febres pulmonariæ, ac intermittentes, invadunt plures. Haud pauci modò Phthisici mortui sunt, rupto interdum Pulmonis Apostemate; illi præcipuè, qui ex Febre *catarrhali* in Tabem incidérant, & quibus etiam inde Tumor Pedum aquosus accesserat.

J U N I O.

Venti fuerunt mutabiles durante Junio, sæpe ex Oriente, sed ab Occidente sæpiùs ad Austrum plerumque vergentes: intervenit haud rarò Malacia. Initio Aer erat ficcus; Fine & ficcus & calidus. Maxima Roratio sæpe.

Pluvia $\frac{11}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{25}$ = 1.534 Dig. Dec.
 Maxima AB. media nocte 27. W N W 1. Fulgura 12. nocte. Tonitru 26.

Altitud. maxim. 22. 29. Malacia. } media 29. $4\frac{28}{30}$
 ——— minim. 18. 28. 8. S b VV 3. }
 Dies frigid. 21. 36. VV 2. } media Therm. Altit. $28\frac{26}{30}$
 — calid. 27. 24. VV 1. }

Febres remittentes & intermittentes adhuc, jam sæpe cum Pustulis rubellis.

J U L I O.

Toto fere Julio Aer fuit valde ficcus & fervidus, paucæ Pluviæ, Rorationes autem maximæ, Ventus Australis rarò, Corus & Aquilo sæpè: nihilominus, Statio *Baroscopii* erat ut plurimum humilis.

Pluvia $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ Grando
 $\frac{1}{16}$ = 0.772. Dig. Dec.

Magna AB. 10. 10. p. m. N W 1. Tonitru
 16. p. m. S S E 2. — 28. p. m. N N W 1.

Altitud. maxim. 1. 29. 7. N N E 1. } media 29. $4\frac{6}{16}$
 ——— minim. 29. 29. 0. N b VV 1. }
 I 2 Dies

Dies frigid. 31. 34. N VV 1. } media Therm. Altit. $24\frac{8}{26}$
 — fervid. 5. 16. N VV 1. }

Febres intermittentes sparsim : Cholera & Diarrhœa frequens. Mulieres plurimæ immenso mensium Profluvio laborant. Omnes fere de Languoribus ob Æstum enormem undique conqueruntur.

AUGUSTO.

Perpetuus spiravit ab Occidente Ventus, ad Meridiem sæpe deflectens, crebrò etiam ad Septentrionem. Priore Mensis Parte Pluvia, Tonitru, Fulgura frequentia, eaque gravissima, Sudo tamen subinde intercurrente.

Pluvia 1. $\frac{11}{3}$. $\frac{11}{4}$. 6. $\frac{12}{7}$. $\frac{11}{10}$. — $\frac{8}{12}$. 16. $\frac{11}{17}$. 18.
 — $\frac{11}{21}$. 24. $\frac{11}{27}$. — 29. $\frac{11}{31}$. = 4. 500.
 Dig. Dec.

Fulgur & Tonitru vehemens 3. 6. 7. 10. vesperi. Procella 17. nocte. S w.

Altitud. maxim. 24. 29. 9. N N VV 1. } media 29. $4\frac{22}{30}$
 — minim. 7. 29. 0. S S VV 1. }
 Dies frigid. 24. 43. N N VV 1. } media Therm. Altit. 31.
 — calid. 5. 24. S VV 1. }

Perpauci Morbi : aliqui Diarrhœa & Cholera Morbo corripuntur.

SEPTEMBERI.

Varia fuit Tempestas Ventusque varius hoc Mense, à nono tamen ad Diem decimum octavum ab Oriente, ad Austrum declinando plerumque, Atmosphæra erat sicca, & Statio barometrica

1733) *Constitutio Aeris, &c.* 187
metrica altior ut plurimum quam elapso Augusto:
 sto: Maximæ & crebræ Rorationes.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{11}{5}$ 11. 12. $\frac{11}{13}$ 14. 21. 24.
 Dig. Dec.
 25. 26. 28. 30. = 1.978.
 Magna AB 8. 10. p. m. N N w 1. — levis
 29. H. 9. w N w 1.
 Fulgur & Tonitru 12. & 13. a. m. Fulgura
 nocte 26.

8 Altitud. maxim. 19. 30. 1. Malacia.
 ——— minim. 26. 29. 0. S VV b VV 2. } media 29. $6\frac{2}{3}$
 Dies frigid. 30. 49. N N E 1. } media Therm. Altit. $37\frac{20}{29}$
 — tepid. 5. 33. S VV 2. }

Tusses & Catarrhi valde frequentes. Ad Finem
 nem Mensis Cholerae & Diarrhaeæ sæviunt.

O C T O B R I.

Eurus & Aquilo hoc Mense sæpe affiantes
Barometrum extulerunt multum, Temperiemque
 Aeris siccam & frigidam reddidere, etsi haud
 raro intervenit nebula. Per Initia Mensis Ros
 plurimus.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{111}{11}$ 23. — 25. 27. — 29. = 2.026.
 Dig. Dec.
 Magna AB. 27. 9. w N w 1. Per magnæ
 Pruinæ 15. 16. N N E 1. Glacies 31. N N E 1.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 2. E 1. } media 29. $7\frac{1}{3}$
 ——— minim. 25. 28. S VV 3. }
 Dies frigid. 31. 60. N N E 1. } media Therm. Altitud. $46\frac{24}{39}$
 — tepid. 3. 37. S S VV 1. }

1 3 Cholera

Cholera & Diarrhœa adhuc. Eruptio pustulosa *Scorbutica* frequens sine Febre. Apoplexiæ passim: sævæ aliquæ Febres peripneumonicae, *Rubeolæ* & Morbi colici plurimi.

N O V E M B R I.

Ex Occasu plerumque Ventus spiravit Novembri, at sæpe ad Septentrionem deflexit, quamvis Aer erat solito magis tepidus; sub Finem valde crassus & humidus.

Pluvia 7. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{12}$. 14. 15. 17. 20.
Dig. Dec.
21. $\frac{1}{26}$. 28. — 30. = 1.882.

Magna AB. 27. H. 2. matutina. N w. 1. —
29. 10. N w 1. Procella 20. nocte. S 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. N N VV 1. } media 29. $7\frac{25}{28}$
—— minim. 11. 29. 1. S VV 3. }
Dies frigid. 5. 58. Glacies } media Therm. Altit. $48\frac{22}{28}$
— tepid. 15. 44. S 2. }

Rubeolæ adhuc frequentes: Febres aliquæ pulmonariæ, Morbus colicus passim.

D E C E M B R I.

Hic Mensis fuit nimbosus maximè, continua fere Procella eaque sæpe gravissima, a Die nono vicesimum tertium adusque perduravit, Africo furente, dum Pluviæ corruerunt plurimæ, & horrida nonnumquam Fulmina. Incunte quidem Decembri apricitas aliqua effulsit cum tenui Glacie, Aer autem erat valde crassus; quintus utique Dies fuit valde nebulosus & caliginosus maximè:

1733.) *Constitutio Aeris*, &c. 89
 maximè: Immensa forte Vaporis Copia *Barometrum* sustinuit partim, quod perpetuæ Procellæ aliter multo magis depresserint.

Pluvia 1. ^I 2. ^{II} 9. ^I 11. ^{III} 12. ^{III} 13. — 15. — 16. ^I 17. ^{II}
 Dig. Dec.
^I 20. — 22. ^{II} 23. — 25. ^I 26. — 29. ^{II} 30. ^I 31. = 4. 688.

Graves Procellæ 11. 12. 14. 16. 22. 23. 26.
 Maximi Maris Æstus à 12. ad 14.

Fulgur & Tonitrua gravissima cum vehemente Grandine 12.

———— diu durantia 16. S VV b VV 4.

Altitud. maxim. 6. 30. 1. N N VV 1. } media 29. $5\frac{26}{31}$
 ——— minim. 14. 29. 1. S VV b VV 45. }
 Dies frigid. 7. 62. E 1. } media Therm. Altitud. $40\frac{22}{31}$
 — tepid. 14. 43. }

Incipiente Mense Morbi colici, & Peripneumonix nothæ cum Affectibus nervosis passim: Tusses & Gravedines frequentes valde sub Finem Mensis: Paroxyismi quoque multi *hypochondriaci* & *hysterici*.

Dig. Dec.

Tota Quantitas Pluvix hoc Anno = 29. 884.



CONSTITUTIO

AERIS, &c.

Anno MDCCXXXIV.

JANUARIO.

POST nubila Phœbus ! novo quippe cum Anno multo lætior surgit Cœli Facies; Bo- reas nempe paulo post Initium Januarii oriens Vapores disperfit & Nubes, rigido accedente Ge- lu Cœloque sereno: Aeris autem Temperies lon- gè magis tepida fiebat exeunte Mense.

Pluvia 1. ¹¹2. 8. 16. ¹¹22. Nix & Grando
Dig. Dec.

4. 5. = 1.480.

Procella 2. w S w. Fulgur & Tonitru cum
multa Grandine 22. mane.

☿ Altitud. maxim. 29. 30. 4. Eb N 1. } media 29. $9\frac{16}{29}$
— minim. 3. 29. 4. VV 2. }
Dies frigid. 14. 71. E N E 1. } media Therm. Altit. $60\frac{4}{29}$
— tepid. 26. 54. N VV 1. }

Gravedines , Tussesque frequentes : Morbi
colici plurimi : Peripneumonix passim.

FEBRUAS

F E B R U A R I O.

In alta perstitit Statione *Baroscopium* Diem ad-
usque undecimum Februarii, flante Cauro; à de-
cimo quinto ad decimum octavum Procella per-
petua, imò sæpe violenta maximè: ab Occi-
dente Ventus turbineus iterum vicesimo quarto
& quinto, immensa quoque Vis Pluviae tunc de-
cidit, maximèque subsedit *Mercurius*. Nisi ipso
Mensis Initio vix ulla Glacies.

Pluvia 2. 3. 4. $\frac{111}{12}$ 13. — $\frac{111}{15}$ $\frac{111}{16}$ $\frac{11}{17}$ $\frac{11}{18}$.
Dig. Dec.
 $\frac{111}{19}$ 22. $\frac{1}{23}$ $\frac{1111}{24}$ $\frac{1111}{25}$ 26. 27. = 5. 554.
Fulgura cum Grandine 17. nocte. w N w. 2.

Altitud. maxim. 1. 30. 4. NE 1. } media 29. $6\frac{16}{26}$
minim. 24. 28. 5. S b E 4. }
Dies frigid. 1. 62. Gelu. } media Therm. Altitud. $53\frac{18}{26}$
— tepid. 12. 50. S VV 2. }

Incipiente mense Morbi *peripneumonici*; proce-
dente Anginae, Coryzae, Tusses plurimae.

M A R T I O.

Ventus quoque occidentalis toto duravit Mar-
tio, majore ex Parte vergens ad Austrum, unde
frequens Pluvia & Aer crassus & humidus; sub
Finem ad Septentrionem deflexit paululum.

Pluvia 1. — $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ 6. 9. $\frac{11}{10}$ $\frac{11}{12}$ — 14. 16. —
Dig. Dec.
 $\frac{1}{18}$ $\frac{11}{19}$ $\frac{1}{20}$ 22. $\frac{1}{23}$ $\frac{11}{25}$ — 28. = 2. 812.
Procella 19. nocte. S 4^x.

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 31. 30. 0. VV N VV 1. } media 29. 5.
 ——— minim. 13. 29. 0 S VV b S 2.
 Dies frigid. 15. 16. VV N VV 1. } media Therm. Altit. 48 $\frac{2}{3}$
 — tepid. 23. 45. VV b S 1.

Tussis, Faucium Tumores, Lippitudines hoc
 Mense frequentes: multi Rheumatismo correpti,
 aliqui Peripneumonia, & Paraphrenitide; plures
 sub Finem Apoplexia.

A P R I L I.

Ne. vel Guttula Pluviae Diem, adusque deci-
 mum octavum; à primo ad duodecimum Corus,
 inde ad vicefimum tertium Subsolanus, post Libs;
 medio Mense Aer erat siccus & tenuis.

Pluvia 18. $\frac{1}{1}$ 19. $\frac{111}{1}$ 20. $\frac{1}{1}$ 22. $\frac{11}{1}$ 23. $\frac{11}{1}$ 25. $\frac{11}{1}$ 26. $\frac{11}{1}$ 27.
 Dig. Dec.
 29. 30. = 2. 126.

8 Altitud. maxim. 12. 30. 0. N N VV 1. } media 29. 6 $\frac{6}{18}$
 ——— minim. 23. 29. 4. E S E 2.
 Dies frigid. 13. 50. E N E 1. } media Therm. Altit. 43 $\frac{23}{18}$
 — tepid. 28. 37. VV S VV 2.

Tussis & Tumor Faucium frequens adhuc:
 Febres intermittentes, nec non Apoplexiæ, haud
 paucae: Ophthalmia passim.

Hoc Mense grassari cepit Febris quædam (si
 ita dicam) anginosa, furens indies magis magis-
 que. — Quos corripuit, primò Algor invasit,
 mox incertus Ardor & Cephalalgia, Vomitus pro-
 tinùs aut Diarrhæa, pauloque post Dolor Fau-
 cium acutus & Tumor: hinc Febris haud levis,
 Languor, Anxietas, ac pectoris Oppressio, ac-
 cedente

cedente sæpe Delirio, aut soporoso Affectu, quorum haud dubia fuere prænuncia Urinæ vel tennes, vel quales Jumentorum turbidæ. —

Felix ille tunc Ægrotus, cui Sudores eruperunt affatim, aut Pustulæ rubræ; si ne hæc quidem, Erysipelatis aliquid: ubi nihil horum, brevi instabat Fatum; nisi opportuna *Diarrhœa*, aut tempestiva Diruptio Apostematis Faucium, aut enitens Parotis, faustè sublevarent.

Morbus hic haud rarò vel intra sex Dies discussus fuit; sæpe verò diutiùs inhærentem, septimo, octavo, aut nono, Die, erumpentes Pustulæ crySTALLINÆ (miliares dicunt) plurimæ expellebant prorsùs: modo nimirum haud præmaturè recessisset, quod certo sanè fuit Ægrotis Exitio. Idem omninò dicendum est de Papulis rubris, quæ sæpe etiam Statu Morbi apparebant.

Pueros & Juvenes potissimum invasit Febris, qui Vermes crebrò dejiciebant: Seniores rarò decubuerunt. Urina erat rufa plerumque, subrubrum, vel ab ipso Initio, deponens Sedimentum: Lingua verò plurimo muco subflavo foedata.

Desideravit Febris hæc *epidemica*, quàm primum quis ea correptus erat, Missionem Sanguinis eamque sæpe repetitam; haud rarò, utique vehementer urgente Morbo, ad tertiam usque Vicem; etsi Cruor emissus non erat viscidus admodum, interdum floridus satis: Vomitu dein lenem Stomachi Purgationem, continuò *Epispastica* Auribus, Cervicibus, Humeris. Sorbitio tepida, *antiphlogistica*, permulta, erat necessaria prorsùs, levi sæpe interposito *Cardiaco*, nempe ex Lapid. Contrayerv. Croco, Theriac. Andromach. Confect. Fracastorii, Confect. Raleigh. &c. idque

idque præcipuè dum appropinquabat Morbi Status, maximè profectò cum *Exanthemata* evaserint sublivida; quod quidem pessimi Ominis! Gargarismata emollientia, subacida, detergentia, ulceroso Gutturi conducebant maximè, sensim insuper sæpeque deglutita *Mucilagine* ex Semin. Cydoniorum & Psyllii, Syrup. Moror. aut de Rub. Idæis edulcorat. vel Linctu aliquo *anodyno*, Tussi urgente præsertim, quæ fuit sæpissimè permolesta. Ut primùm aspera & squamosa quasi apparuit Cuticula, Purgantia lenia ex Rhabarbaro, &c. cum *Mercurialibus* profuere maximè, perfectamque Sanitatem brevi restituebant.

M A I O:

Ventus ab Occasu, flectens maximè ad Septentrionem, toto fere Mense spiravit, intercurrente nonnunquam Vulturno. *Atmosphære* Temperies fuit multo frigidior solito; Statio *Mercurii* utplurimùm demissa.

Pluvia ²1. 7. 11. 12. 15. — 18. 21. ¹¹¹¹25. 26.
Dig. Dec.

28. — 30. Nix 13. Grando 14. = 1. 764.

Leves AB. 14. 15. N W b N 2. Fulgur & Tonitru 28. p. m.

Altitud. maxim. 10. 29. 9. N 1. } media 29. 4¹⁰/₃₁
— — — minim. 29. 29 0. S E 2. }
Dies frigid. 14. 52. N N V V 2. insolitum Frigus! } med. Ther.
— tepid. 25. 37. Malacia — — — — — } Altit. 42.

Tussis *convulsiva* inter Pueros frequens; Febres intermittentes passim. — Nunc Febris *anginosa* *epide.*

1734) *Constitutio Aeris, &c.* 95
epidemia sævit maximè : Angina graviùs urget;
 cui jam frequenter accedunt Aphthæ molestif-
 simæ, & cum fera Tussi Strangulatio fermè, ni
 frequens subveniat tepida Sorbitio & perpetua
 fere Gargarizatio.

J U N I O.

Eurus assiduè flavit à sexto fere ad vigesimum;
 Initio & Fine Corus : Atmosphæra magis te-
 pida fuit, ac humida, quàm Mense priore; am-
 bo utique plus satis nubili.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{11}{6}$. $\frac{1}{8}$. 10. $\frac{1}{11}$. $\frac{11}{14}$. $\frac{11}{15}$. 20. $\frac{1}{21}$.
 Dig. Dec.
 $\frac{11}{23}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{29}$. = 3. 208.

8 Altitud. maxim. 4. 29. 7. N V V b V V 1. } med. 29. $4\frac{12}{25}$
 ——— minim. 24. 29. 1. V V N V V 1.
 Dies frigid. 10. 40. S E b E 1. } media Therm. Altit. $31\frac{16}{29}$
 — calid. 22. 26. Malacia. }

Febres intermittentes adhuc; *Ophthalmia* pas-
 sim. Morbo jam *epidemico* accedunt Pustulæ
 fere omnigenæ, atque haud rarò Eruptiones
erysipelatosæ: minùs verò premuntur Fauces;
 Febris quippe jam magis ad exteriora tendit:
 Die sexto, aut septimo, Cuticula aspera fit &
 rupta, velut aspersa crassiore Farina; idque quo
 magis eo melius; tandem tota penè desquamæ-
 tur: ex Pedibus sæpe tantis Portionibus ut So-
 leam quasi detractam referant hæ Morbi Exu-
 viæ. Hic equidem lætissimus est Morbi Exitus:
 ubi verò *Exanthemata* tardè admodùm & parciùs
 erumpunt, erupta verò livescunt, maximæ An-
 xietates, Languores, Deliquia sequuntur; paulo-
 que

que sæpe pòst Vomitus, aut *Diarrhœa*, enormis, quæ Ægros non rarò celeriter rapit.

Hæc Febris, ut omnes fere quas Pustulæ comitantur, contagiosa est; plures namque ea correpti in eadem sæpe Domo decumbunt.

Quod verò jam Cutim magis petat quàm superiore Mense, ob majorem Aeris Calorem esse arbitror, Humores elicientem extrà: medio enim Maio cùm *Atmosphæra*, pro Anni Tempore, erat maximè frigida, Dolor ac Faucium Tumor urgebant gravissimè.

Eadem omninò medendi Methodus juvat usque; nunc porrò *Mercurialia*, sine stimulis salinis præparata, aptissimè adjecta sunt: quippe quæ in aliis cutaneis Eruptionibus inveniuntur efficacia maximè, quidni & in his utilia sint? Ista utique vel in ipsis *Variolis* prospero sæpissimè Eventu exhibui. Humores enim lentos nimium attenuant, glutinosa Vascularum Repagula expediunt, Saliumque Cohæsiones diffringunt, Succos demum morbosos fluxos reddunt, tandemque abigunt prorsus; dumque Pondere solùm & Subtilitate Partium agunt, Sanguinem incendunt minimè.

J U L I O.

Prior Julii Pars fuit aprica satis, at subfrigida; Ventus plerumque à Septentrione; medio Mense Libs intervenit, Pluvia ruente; tunc iterum Septentrio; à xxv. ad xxviii. pluvius Vulturnus. Trigesimo primo; Vento omni momento variante, immensa Quantitas Pluviæ decidit, Cataractæ ad instar; inter Horam octavam matutinam & Meridiem ad Digitum saltem integrum, licèt

1734) *Constitutio Aeris, &c.* 97
 licet Milliaribus quindecim ad Orientem vix ulla.
 Aer fuit hoc Mense valde humidus & Barome-
 trum humile.

Pluvia $\frac{1}{12}$. $\frac{111}{13}$. $\frac{1}{14}$. 16. $\frac{1}{17}$. $\frac{11}{26}$. — $\frac{1}{29}$. — $\frac{111}{31}$.
 Dig. Dec.
 = 2.982.

8 Altitud. maxim. 5. 29. 8. N. 1. } media 29. $4\frac{29}{31}$
 ——— minim. 26. 28. 9. S E 3. }
 Dies frigid. 3. 38. N 1. } media Therm. Altitud. $30\frac{2}{31}$
 — calid. 24. 24. Malacia. }

Febres intermittentes adhuc: Tusses frequentes
 inter Adultos, *convulsivæ* inter Pueros. Magnæ
 undique de Spirituum Languoribus Querelæ.
 ——— Quamplurimæ Aviculæ, dum Plumas
 exuunt, moriuntur.

Furit etiamnum Febris *epidemica* inexplicabili
 quodam Angore quosdam, vel intra sex sæpe
 Dies, perimens. Hos leve primò corripuit Deli-
 rium, quod utique peioris fuit ominis, quàm
 si, more Bacchantium, aperto exarserant Furo-
 re. Nil perinde tunc profuit ac Sanguinis De-
 tractio Cucurbitulis scarificatis, Humeris Cervi-
 cibusque admotis: post *Clysmata* laxantia, aut
 mitiora *Cathartica*; frequentia porrò *Vesicatoria*,
 Cruribus præcipuè.

AUGUSTO.

Suda Tempestas Initio, medio autem Augusto
 permulta Pluvia, eoque quidem exeunte nimia.
 Libanotus frequens, isque ad Finem maximè
 furens; *Barometrum* valde depresso, Aeremque
 reddidit humidissimum; maximæ fuerunt Rora-
 tiones

tiones Mensis Principio, Aquilone spirante
Auster turbineus Nocte inter ix. & x. Diem *Mercurium*
curium præcipitavit plurimum gravissima in quæ
Pluviam; Maris autem Æstus extulit maxi-
ximè.

Pluvia $\frac{1111}{9.}$ $\frac{1}{10.}$ $\frac{11}{12.}$ $\frac{11}{13.}$ $\frac{11}{14.}$ $\frac{11}{16.}$ $\frac{1}{17.}$ $\frac{1}{19.}$ $\frac{1}{23.}$
Dig. Dec.
25. 26. $\frac{11}{28.}$ $\frac{1}{29.}$ $\frac{11}{30.}$ 31. = 4. 022.

Procella 9. Nocte. S S E 4. — 28. Nocte. S w
4^r. — 29. Nocte. S w 4^r. — 30. w S w 4^r. cum
Fulgure & Tonitru.

8 Altitud. maxim. 3. 29. 8. N b } media 29. $3\frac{27}{31}$
—— minim. 10. 28. 7. S S VV 3x. }
Dies frigid. 31. 42. S VV 3^o. } media Therm. Altit. $30\frac{26}{31}$
— calid. 7. 24. N b VV 1. }

Febris *epidemica* plures adhuc premit, ingenti
sæpe cum Vomitu & *Diarrhæa*: *Ophthalmiæ* pas-
sim: Scabies valde frequens. *Variolæ* jam grassari
incipiunt, ac Febres lentæ *nervosæ*.

Plurimæ Aviculæ canentes pereunt: perrarò
auditur stridula Cicada. — Æstas fuit magis
nubila, magis frigida, magis denique pluviosa
solito: Omnia nunc Loca Aqua & Limo plena
sunt.

SEPTEMBRI.

Toto fere Septembri Ventus ex Occidente spi-
ravit, ad Septentrionem verò majori ex Parte
deflectens, qui *Barometri Mercurium* exaltavit:
manet usque tamen *Atmosphæra* madida & pau-
lo frigidior.

Pluvia

1734)

Constitutio Aeris, &c.

99

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{1}{3}$ 8. 17. 20. $\frac{11}{21}$ 22. — 24
 Dig. Dec.

27. 28. 30. = 1. 752.

Parva AB. 9. H. 10. NNW. 1. Procella 21.
 p. m. SW — 24. nocte. WSW 4^x.

Vehemens Grando 22. WNW 2. Magna
 Pruina 26. NNE 1.

Altitud. maxim. 17. 30. 0. Malacia. } media 29. $6\frac{31}{27}$
 ——— minim. 1. 29. 0. VV 2. }
 Dies frigid. 26. 54. NNE 1. } media Therm. Altit. $41\frac{10}{27}$
 — repid. 1. 36. ——— }

Jam evanescit fere Febris epidemica, nec mul-
 tum augetur Variolarum Numerus. Cholerae, Fe-
 bres nervosae, miliares, intermittentes, passim.

OCTOBRIS.

Initio Africus nimbosus multam demisit Plu-
 viam; quarto Die saeviit Vulturnus; à decimo
 quinto ad vicesimum tertium perflavit Aquilo,
 & Mercurium erexit plurimum; sub Finem Co-
 rus: Aer frigidus est ac humidus.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{111}{2}$ $\frac{11}{3}$ $\frac{11}{4}$ 5. 7. — 10. $\frac{111}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{1}{13}$
 Dig. Dec.

15. 19. 21. 23. 26. 28. 29. = 3. 154.

Fulgur & Tonitru cum Grandine 2. p. m.
 Grando 7. 8. Fulgur & Tonitru 12. p. m. per-
 magni Maris Aestus à 1. ad 4. Diem.

Altitud. maxim. 22. 30. 3. ENNE 1. } media 29. $5\frac{26}{30}$
 ——— minim. 4. 28. 8. SEbE 3^x. }
 Dies frigid. 19. 64. NNE 2. } media Therm. Altitud. 51 $\frac{1}{2}$
 — repid. 1. 43. SVV 4^x. }

K

Vario-

Variolæ jam factæ sunt *epidemicæ*. Morbi colici à *Pomaceo* novello frequentissimi. *Catarrhi* & *Faucium* Tumores haud rari; imò quædam adhuc Reliquiæ *Febris epidemicæ* sparsim notantur. *Febris nervosa* & *miliaris* passim.

N O V E M B R I.

A primo Novembris, Diem ad usque vicesimum, Ventus inter Orientem & Septentrionem constitit, qui & paulo sicciolem reddidit *Atmosphæram*, multoque magis frigidam, *Baroscopium* verò extulit maximè: inter Diem autem xxi. & xxiv. fremente Africo, permulta Pluvia decidit, corruente admodum *Mercurio*; at brevi Aquilo redux restituit Rem.

Pluvia 1. $\frac{0}{4}$ $\frac{11}{7}$ 10. 21. $\frac{1111}{22}$ $\frac{111}{23}$ $\frac{0}{24}$ 29.
Dig. Dec.
= 2,068.

Gelu, idque subinde rigidum, hoc Mense frequens.

∞ Altitud. maxim. 27. 30. 4. N N E 1. } media 29. $8\frac{34}{29}$
— minim. 23. 28. 8. S V V 3. }
Dies frigid. 27. 68. N N E 1. } media Therm. Altit. $58\frac{12}{29}$
— tepid. 2. 52. Malacia }

Variolæ & Morbi colici valde *epidemicæ*: *Apo-*
plexiæ plures: Colica biliosa passim.

D E C E M B R I.

Pluvia, procellosa, horrida, Tempestas hunc finivit Annum. Vix unus & alter Dies sine Pluvia toto Decembri; Libs vehemens perfurebat sæpissi-

1734) *Constitutio Aeris, &c.* 101
 sæpissimè, gravi subinde cum Pluvia: inde *Barometrum* erat frequenter * mirè depressum. Jam magnæ sunt Inundationes undique. Aer fuit maximè humidus, Gelu rarissimum, etsi *Atmosphæra* fuit valde frigida sæpe.

Pluvia $\overline{\text{III}}$ 1. — $\overline{\text{II}}$ 4. — $\overline{\text{II}}$ 6. 7. $\overline{\text{II}}$ 9. $\overline{\text{II}}$ 10. — $\overline{\text{I}}$ 12. — $\overline{\text{III}}$ 14. $\overline{\text{I}}$ 15. —
 $\overline{\text{II}}$ 17. 18. $\overline{\text{I}}$ 20. — $\overline{\text{II}}$ 23. $\overline{\text{II}}$ 24. $\overline{\text{II}}$ 26. — $\overline{\text{II}}$ 28. $\overline{\text{III}}$ 29. $\overline{\text{I}}$ 31. — 6. 192.
 Dig. Dec.

Procella 1. S w — 10. p. m. S w b S 4. — 14. à primo mane S w 4^r. — 26. w N w. — 27. w 4^r. — 29. w S w 4.

8 Altitud. maxim. 25. 30. 0. N VV b VV 1. } med. 29. 3^r₁
 ——— minim. 14. * 28. 2. S VV 4^r.
 Dies frigid. 22. 64. N N E 1. Gelu. } med. Ther. Altit. 58⁴₃₁
 — tepid. 1. 52. VV S VV 2.

Variolæ valde epidemica & sæpe mortifera: Colice jam non adeò frequens. *Rheumatismi* multi; Febres putridæ & petechiales passim.

Maxima fuit Pluviae Quantitas hoc Anno:
 Dig. Dec.
 nempe = 37. 114.

GND GND

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXV.

JANUARIO.

QUAMVIS *Baroscopium* fuerat sublime valde de Initio Januarii, Ventusque arctus; id tamen procellosa Tempestas, à sexto ad decimum quartum fere perpetua, ac subinde gravissima, ad ultimum penè Gradum deturbavit: quod autem postea, à Die scilicet vicesimo ad Finem usque, ad summum fermè crexit Aquilo. *Atmosphæra* fuit rigida & sæpe humida valde: sub Mensis finem rigidum Gelu.

Pluvia 2. 5. ^{II}6. ^{II}7. 8. ^{III}10. ^I11. — ^{II}13. ^I14. ^{II}18.
Dig. Dec.

19. 22. Nix 9. 11. — 2. 526.

Procella 6. nocte. S w 4^r. — gravissima 8. S w 4^r. circa Meridiem *Mercurium* depressit ad 28. 3. — vehemens 10. nocte S S E 4^r. 8 28. 4. violenta duravit Procella ad Horam octavam matutinam Diei undecimi; *Barometer* verò subsedit ad 28. 1. rarò *Mercurium Baroscopicum* infra hunc gradum notavi!

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 4. 30. 5. N b VV 1. } media 29. $6\frac{24}{30}$
 ——— minim. 11. 28. 1. S 48.
 Dies frigid. 25. 70. N 1. } media Therm. Altitud. $59\frac{29}{30}$
 — tepid. 6. 54. S VV 3. }

Variolæ sunt maximè *epidemicæ*, quædam valde malignæ; utpote quibus non rarò accedunt *Hæmorrhagiæ* ex omnibus fere Corporis meatibus, & (A) *Petechiæ* lividæ & nigræ. Vix unum vidi his correptum Affectibus servatum; nam in tanta Pestilentia Sanguinis *Crasis* dissolvitur penitus, & maximè putrescunt Humores: imò Cruor emissus, putris instar Saniei, diffluit; nec, ut solito, in Frigore coagulatur.

Colicus Morbus cum Doloribus sævis *rheumaticis*, & *Paresi* nonnunquam Brachiorum Manuumque, à *Pomaceo* novello, frequens adhuc. Multæ Tussés sub Finem Mensis: *Ophthalmiæ*, *Febres miliares* & *erysipelatosæ* passim.

F E B R U A R I O.

Sublimem retinuit Stationem *Mercurius* ad Diem usque decimum sextum, Septentrione afflante, aut Vulturno: sub Finem madidus Notus *Baroscopium* demisit. Sudum haud rarò eluxit hoc Mense: Gelu affuit rariùs.

Pluvia 8. 14. $\overline{11}$ 17. 18. 22. $\overline{11}$ 23. — $\overline{11}$ 26. 27.
 Dig. Dec.
 = 1. 978.
 Procella 26. nocte. S S w 4¹.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 5. N N E 1. } media 29. $7\frac{10}{25}$
 ——— minim. 27. 29. 0. S S VV 3x. }

Dies frigid. 21. 66. E N E 1. rigidum Gelu. } media Therm.
 — tepid. 9. 52. Malacia. ————— } Altit. $57\frac{18}{25}$

Pleuritides & Peripneumoniæ frequentes, at Rure maximè: *Variolæ epidemicæ* adhuc, sed non ita pestiferæ.

Jam in Popellum ingruit Febris quædam contagiosa, Pustulis sæpe & *Petechiis* comitata: Merx admodum infelix! Classe, ut credere par est, advecta; quippe quæ diu antè inter Nautas apud *Portum-magnum* commorantes sævierat, multosque dederat Letho: de hac plura Mense sequente.

M A R T I O.

Varia fuit Tempestas Mense Martio, varia quoque *Barometri* Statio, nunc alta nempe, nunc valde depressa. Libs Initio, à sexto ad decimum septimum Vultur, tunc Aquilo, post Caurus: *Atmosfera* erat frigida satis, at paulo humidior.

Pluvia 1. 2. $\frac{11}{4}$. $\frac{1}{5}$. 14. $\frac{11}{15}$. $\frac{11}{16}$. $\frac{1}{23}$. — $\frac{1}{25}$.
 — Dig. Dic.
 28. 30. 31. = 2. 234.

Maximus Maris Æstus 15. mane S b E 3^x.
 Gelu à xx. ad xxiii.

⌘ Altitud. maxim. 21. 30. 0. NE 2. } media 29. $3\frac{2}{30}$
 ——— minim. 16. 28. 7. S S E 3. }
 Dies frigid. 20. 64. N b E 2. } media Therm. Altit. $54\frac{4}{30}$
 — tepid. 15. 50. S b E 3. }

Variolæ hætenus epidemicæ: Pleuritis & Peripneumonia passim; Apoplexiæ quædam.

Nunc

Nunc maximè dispergitur Contagium *epidemicum* in Plebeculam maximè. — Quibus Febris hæc contigit, primò levi quasi Horrore, ac universa penè Lassitudine, correpti sunt; mox Nausea & vertiginoso Capitis Dolore: haud vehementer tamen insecuta Febris est, nec immodica Sitis, quamvis media Lingua scabra fuit & fusca, imò sæpe arida valde, utroque verò à Latere Mucò oblita subflavo. Interim de Dolore Gutturis, haud rarò strangulante fere, & de teneris Oculis, Lumina refugientibus, multæ Quærelæ. Urinæ plerumque *χρυσώδεις* erant, aut tennes, paucæ, luridæ, vapidæ instar *Cerevisiæ*: quæ quidem omnibus in Febris sunt pessimæ Notæ!

Hæc ferme per Quatriduum, quo aut vigiles omninò decubuere, aut ne sentientibus quidem brevissimus & maximè interruptus obrepfit Somnus. Jam Surditas, Desipientia, Suspirium frequens, immanis Præcordiorum Oppressio, Manuum Tendinumque Tremor & Subsultus accedebant: attamen de Valetudine rogati vix querebantur quicquam, adeò invaluerat Torpor.

Diem circiter sextum, nunc citiùs, nunc tardiùs, *Petechiæ* rubræ, purpureæ, lividæ, nigræ, imò Vibices quasi, sæpe apparuerunt. Mali admodum Ominis hæc *Exanthemata*! eoque pejoris, quo magis ad Nigritiem spectabant. Frequenter porrò videbantur innumeræ Maculæ minutissimæ fusci Coloris, Cutis Lenticulas aut Pulicum Morsus adumbrantes, sed paulo magis atræ: quas utique haud minùs esse lethales observavi quàm ipsas nigerrimas. — In hoc Rerum Statu, aut Sopor perpetuus urgebat, aut

Furore cœcus; imò sæpe haud erat assidentibus, etiamsi robustis, facile Ægros continere, ne è Lectulis exilirent, tanquam aliò abituri: quod quidem Symptomate vix aliud magis tunc functum memini.

Tristia dum hæc agebantur, Sudor profusus, viscidus, olidus, aut scetidissima, livida, *Diarrhœa* miseros colliquabat Ægrotos. Lingua porro nigra, aridissima, Vox Faucibus hærens, Singultus, *Spasmi*, Pulsus formicans, aut coacervatus, Livor Manuum, ac sæpe ipsorum etiam Cubitorum, atræ Mortis certissima instabant Præ-nuncia: Die undecimo, aut decimo quarto plerumque, multo citiùs nonnunquam. Tanta fuit, tamque cita, Putrefactio Cadaverum, ut ea sepelire fuerit necesse prorsùs aliquando vel intra Horas viginti quatuor.

Dira quidem hæc & acerba maximè! erant autem plurimi, quibus Sors melior, Die scilicet quarto, aut quinto, benignum dedit morbi exitum; Eruptione nempe Pustularum rubrarum, *miliarium*, atque blandi per totum Corpus Sudoris. — Multi diu morbo conflictati, innumeras tandem habuere Pustulas *miliares*, limpidas, sæpe salutiferas: pluribus autem erat periculosa plenum opus *Alex*.

A P R I L I

A Die secundo Aprilis ad decimum spiravit Eurus; post varius Ventus variaque admodum Tempestas, at pro Anni Tempore frigida & humida.

Pluvia

1733)

Constitutio Aeris, &c.

107

Pluvia 1. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. 10. $\frac{1}{14}$. — 16. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. 22.

$\frac{11}{24}$. $\frac{111}{27}$. $\frac{111}{29}$. — 2. 252.

Ventus vehemens 22. prima Luce. W N W
Nox procellosa 26. S 4.

8 Altitud. maxim. 16. 29. 9. E S E 2. } media 29. $5\frac{16}{29}$
—— minim. 10. 28. 8. S E 2.

Dies frigid. 7. 54. E b S 2. } media Therm. Altit. $46\frac{20}{29}$
—— tepid. 25. 42. VV N VV 1. }

Auctus jam Variolarum Numerus est: atque
modò Febris *anginosa miliaris*, quæ verno Tem-
pore elapsi Anni fuit hic *epidemica*, vicinam in-
festat Regionem. — Febris contagiosa, ma-
ligna, sævit jam magis quàm antehàc unquam.
Rarò nunc adest strangulans Faucium Dolor,
paucæque nunc erumpunt Pustulæ; at Loco
earum *Petechiæ* fuscæ, purpureæ, nigræ, ac ni-
mis frequenter lividæ Vibices, atro semper Car-
bone notandæ! — plurimi moriuntur.

M A I O:

Boreas afflavit, aut Corus, à primo ad vicesi-
mum quartum Maii, pòst Vulturnus; Tempestas
fuit valdè frigida ac nubila. Maximæ Pruinæ à
duodecimo ad decimum quartum.

Pluvia 1. 11. 12. $\frac{11}{15}$. 17. 20. 22. $\frac{111}{23}$.

$\frac{1}{24}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{30}$. $\frac{1}{31}$. — 1. 646.

Grando vehemens 23. Fulgur & Tonitru 30.

8 Altitud. maxim. 19. 30. 1. N VV 1. } media 29. $6\frac{12}{31}$
—— minim. 16. 29. 1. S E 2. }

Dies

Dies frigid. 14. 14. N VV 1. } media Ther. Altit. 43. $\frac{6}{31}$
 — tepid. 31. 36. SS E 1.

Multi Apoplexia corripuntur: *Variola* adhuc Febris contagiosa plurimos perdidit; optima sæpe sprevit Consilia: sequens tamen Methodus permultos servavit.

Ipsa quidem Morbi Initio Venæ Sectio profuit, raro post unquam: imò temeraria suscepta Manu sæpe obfuit maximè. Si tamen post Sanguinis Missionem *Cephalalgia* & *Vertigo* urgebant usque fuit utile admodum Cucurbitulis scarificatis, Humeris Cervicibusque admotis, Sanguinem detrahère: quod quoque Vomitionem, post excitandam, reddidit tutiorem. Cruorem vix unquam notavi valde glutinosum, Serum plerumque verò viride erat, haud raro rubellum; quod infaustum semper! quibus enim id contigit, *Petechias* nigerrimas, aut *Vibices* habuere certo certius cum *Phrenitide* perpetua, aut gravi *Comate*.

Continua fere Nausea, ac frequens, biliosus, Vomitus lenes semper poscebant *Emeticum*, quo & Ventriculi Colluvies ejiceretur & præcautum foret contra pestiferam *Diarrhœam*, quæ aliter Morbi statu, aut paulò post, semper evenit, nam ubi Ventriculi Saburra, diutiùs morando, acrior, fit assiduè; tandem per Intestina descendens, ista utique torquet maximè.

Nulla non Tempore Morbi *Epispastica*, alia scilicet aliis succedentia, necessaria fuerunt omninò; lenia porrò desiderabant *Cardiaca*, eaque repetita frequenter, Languor continuus & collabentes assiduè Vires: quæ & Sudores etiam maturos, criticosque sæpe, movebant, aut Pustulas expelle-

expellebant. Ad hæc promovenda Confect.
Raleigh. Theriac. Andromach. Lap. Contrayerv.
Rad. Serpent. Virg. aliquando Sal. C. C. &, quibus
non fuit ingrata admodum, non uno solum
Nomine laudanda, Camphora (quæ nempe Opio
feliciter arcessebat Somnum, ac Delirium com-
pescebat magis) aptissima fuere Remedia. —
Imò, quod multò minore Pompa paratur, Vinum
rubrum *ustulatum* (quod dicitur) Cinnamomo &
Maci incoctis cum Aquæ pauxillo, haud minus
efficax ad Vires sustinendas inveni, quàm cele-
berrima *Alexipharmaca*; non in hoc tantum
Morbo, sed & in omni Febre lenta & nervosa,
potissimum cum coliquante Sudore, vel immo-
dico Alvi Fluxu declinante. Didici hinc tan-
dem, quod astringentia Aromatica mitiora *Crasin*
Sanguinis firmando, Fibrasque Vasculorum cor-
roborando, vera fuere hujus exeuntis saltem,
Morbi *Alexiteria*; fortasse & Antidota fuissent.
— Ipsi etiam Veteres Antidotis & *Alexiphar-*
macis immiscebant semper astringentia quædam
Medicamenta, ut passim apud eos videre est.

Ad eum adeò Finem, optato demùm cum
Successu, post summum Morbi Incrementum,
exhibui aliquam ex Cortice Peruviano Medi-
cinam cum *Alexipharmacis* idoneis & Elixire Vitri-
oli Mynsichti acidulatam; nec otiosè intereà ex-
pectans Sedimentum Urinæ laudabile, & (quod
dicitur) lateritium; modò scilicet vel minimam
Morbi Remissionem observassem. — Si in singu-
lari Gangræna valeat Quinquina, quidni in uni-
versa Humorū Corruptione? *Exanthemata* ni-
gra, Vibices & citissima Cadaverum Putrefactio,
gangrenosam utique Sanguinis *Diathesin* significa-
bant.

In longis equidem Febribus nihil magis necesse est, quàm Solida inter & Fluida Æquilibrium conservare debitum. Nihil ad id sanè facit efficacius, quàm, diluente Liquore, Sanguinem fervere assiduè, ac Vim Fibrarum confirmare Medicamentis apposis; donec Natura, his Auxiliis Morbi Vitrix, læta Crisi cum expellere possit: nam ut Febris ardens Fræna semper poscit, lenta sæpiissimè indiget Calcaribus. — Profectò nunquam non Arte molienda Crisis est, cùm nil ultrà assequi valeat Natura. — Febribus ideo tardè admodum decreascentibus, lenia *Cathartica* sæpe ex Usu sunt maximè, *Cardiacis* interim assumptis: In hac sanè, de qua agitur suprà, cum vix alia profecerint, Rhabarbarum exhibitum quotidie valuit plurimùm; Vinum ustulatum interim affatim sorbendo: hoc Modo enim putris expurgata fuit Colluvies, & Viribus interea consultum est optimè.

J U N I O.

Caurus hoc Mense spiravit sæpiissimè, hiscebat etiam subinde Libs: Vulturnus à decimo nono ad vigesimum secundum. Aer erat plerumque valde frigidus, crassus & humidus.

[Pluvia 1. 3. 4. ^{III} 11. 15. 16. — 18. ^{II} 19. 20.
Dig. Dec.
— 22. 25. 26. 28. = 1. 936.

8 Altitud. maxim. 5. 29. 9. N VV 1. } media 29. 5 ⁷/₂₉
— minim. 18. 29. 1. S VV 3. }
Dies frigid. 2. 44. N VV 1. } media Therm. Altit. 36 ⁶/₂₉
— tepid. 14. 34. Malacia. }

Variola,

Variolæ, & Febres intermittentes, haud infrequentes. Febris *miliaris* rubra cum enormi Vomitu & Alvi Fluxu Rure grassatur usque. Morbus contagiosus modò sub Finem Mensis mitescit paululum.

J U L I O.

Aer fuit humidus maximè & frigidus toto Julio, Ventus ab Occidente plerumque & Plagis australibus, Eurus aliquando: Tempestas utique fuit nubila, pluvia, infausta admodum, Hyemi magis quàm Æstati similis. Omnes Fructus *aperti* acerbi sunt & immaturi. Vix audis Cicadam, rari volitant Papiliones: Plurimæ Aviculæ canentes inter Plumas exuendas intereunt.

Pluvia 1. — ^{III}3. ^{II}6. 7. 10. ^{II}11. 12. ^{III}14. ^{II}15.
^I16. 19. 21. 22. ^{III}25. — 27. 30. — 3. 5 36.
 Dig. Dec.

Procella 11. nocte w b S. Tonitru 30. p. m.
 Coruscationes nocte.

Altitud. maxim. 28. 29. 7. S E 1. } media 29. $4\frac{4}{30}$
 ——— minim. 16. 28. 9. S VV 3x. }
 Dies frigid. 19. 42. SS VV 2. } media Therm. Altit. $34\frac{38}{30}$
 — tepid. 30. 30. VV 1. }

Febris *epidemica* contagiosa hic imminuta est valde, at sævit adhuc in Vicinia: Multi *Variolis* usque laborant; (B) Pfora frequens.

AUGUSTO.

A Die secundo Augusti decimum tertium adusque Ventus perpetuus ab Oriente spiravit, pulchra interea calidaque Tempestas eluxit, postea misera, procellosa & horrida secuta est; nunquam memini *Atmosphæram* ita humidam fuisse hoc Anni Tempore: Omnia fere Loca Aqua exundant & Limo. — Plures Aviculæ canentes moriuntur: Apes exanimatæ parum mellificant. Folia Arborum æquè sunt decidua jam ac si exiisset Autumnus.

Pluvia ⁱⁱⁱⁱ 1. 2. ⁱⁱ 14. ⁱⁱⁱ 18. ⁱⁱ 19. ⁱⁱⁱ 21. ⁱⁱ 22. ⁱⁱ 23. 25.
Dig. Dec.

— 29. 31. = 2. 906.

Maximæ Rorationes, durante Apricitate, Mensis Initio.

Magna AB. 20. N w i. Procella 22. p. m. S w — vehemens 23. Nocte. S S w.

Altitud. maxim. 12. 29. 9. E i. } media 29. 6.
— minim. 22. 29. 2. S VV 4x. }
Dies frigid. 27. 42. VV N VV i. } med. Ther. Alt. 32 ⁶/₂₉
— calid. 13. 26. E i. — } }

Fatales etiamnum Reliquiæ passim Febris malignæ: *Variolæ* adhuc: Scabies & Psora frequens, Cholerae ac *Diarrhææ* plurimæ. Permulti, gravi quasi Tempestate perculsi, inerte quadam Socordia torpent. — Plures Canes rabidi, discurrunt.

S E P T E M B R I.

Nubilus fuit, madidus & frigidus, hic Mensis; Caurus afflavit sæpe, Libs aliquando, Eurus frequenter, sub Finem præcipuè: Boreas viii. ix. x.

Pluvia $\overset{2}{1}$. $\overset{1}{3}$. $\overset{2}{6}$. $\overset{1}{7}$. $\overset{2}{11}$. $\overset{1}{12}$. — $\overset{2}{14}$ — $\overset{III}{16}$. $\overset{I}{17}$.
Dig. Dec.
18. 20. 22. 24. $\overset{1}{26}$. 28. 29. = 1.918.

Altitud. maxim. 23. 29. 9. E 1. } media 29. $6\frac{7}{3}$.
— minim. 11. 29. 2. VV NVV 1. }
Dies frigid. 28. 46. S E 1. } media Therm. Altit. $36\frac{14}{3}$.
— tepid. 3. 30. N VV 1. }

Febres petechiales sparsæ adhuc: Variolæ frequentes: Diarrhæa & Cholera multos infestant: Tusses plurimæ & ad Finem Mensis.

O C T O B R I.

Venit ab Oriente Ventus fere constans per totum Octobrem, Initio & Fine ad Septentrionem inclinans; unde Aer tenuis factus est, at paulo frigidior: medio autem ad Austrum.

Pluvia $\overset{II}{7}$. $\overset{II}{8}$. — $\overset{II}{10}$. 12. $\overset{II}{14}$. $\overset{III}{26}$. $\overset{III}{27}$. = 2.756.
Levis AB. 3. Malacia — 4. E. 1. — 12. N. 1.
Gelu & maxima Pruina 30. E N E 1.

Altitud. maxim. 30. 30. 1. E N E 1. } media 29. $6\frac{17}{30}$.
— minim. 9. 29. 1. VV NVV 1. }
Dies frigid. 30. 64. } media Therm. Altit. $47\frac{22}{30}$.
— tepid. 16. 40. S S E 2. }

Multæ

Multæ Febres lentæ, ac intermittentes, passim. Aliqui hoc Mense, subito quasi Asthmate correpti, in Tumores Pedum & Abdominis, hydropicos velut, inciderunt, ex quibus nonnulli brevi sunt mortui. — Multi Canes Rabie perciti.

N O V E M B R I.

Sequitur November pluvius admodum & procellosus, sub Finem præcipuè: turbidus Auster prævaluit maximè, crassamque fecit *Atmospheram* ac humidam valde. — Exeunte Mense permagnæ Inundationes undique.

Pluvia 4. 5. — 7. 9. 10. 13. 14. 15. — 17. —
 19. 21. — 23. — 25. 26. 27. — 29. — 4. 9 22. Dig. Dec.

Procella 9. ab Hora x. a. m. ad 2. p. m. S w 4^x. — 23. tota Die S w. — 26. Nocte S 4^x. — 27. S 4^x. — Maximi Maris Æstus 27. quamvis Luna jam erat in *Quadratura*; altiores etiam quàm si Interlunium fuisset, aut Plenilunium. Tonitru vehemens 24. Noctu.

8 Altitud. maxim. 11. 30. 0. N V V 1. } media 29. 4¹⁴/₃₀
 ——— minim. 27. 28. 4. S }
 Dies frigid. 1. 58. Malacia. } 4^x.
 — tepid. 19. 44. S S V V 2. } media Therm. Altit. 49¹⁶/₃₀

Cephalalgia, Vertigines, Insultus epileptici; Tumores Faucium & Parotidum, frequentes: dyspnoica Pectoris Gravitas haud paucos premit. * Febres lentæ nervosæ plurimæ. — Multi Canes rabiosi circumcursant.

D E C E M -

¶ Vide Dissertationem de Febre lenta nervosa, infra, p. 147.

D E C E M B R I.

Vix unquam *Atmosphæram* memini ita humi-
dam fuisse, ac erat toto Decembri; etsi Subso-
lanus perflabat sæpissimè: fateor equidem quòd
madidus Notus intervenit frequenter, ac Pluviæ
haud parum demisit.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 4. $\frac{1}{5}$. $\frac{11}{6}$. 7. 9. 17. 19. $\frac{11}{24}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{28}$.

''' Dig. Dec.

30. 31. = 2. 364.

Gelu rigidum 12. 66. E b N 1. — 13. 64. E 1.
— 16. E 1. — 23. 64. E 1.

Procella 24. Nocte. S b E — 27. S w b w 4.
Maximi Maris Æstus 21. 22. E S E 2. — per-
magni 24. 25. 26. Austro furente.

8 Altitud. maxim. 21. 30. 0. E b S 2.
— — minim. 28. 29. 0. S V V b V V. 3x. } media 29. 6 $\frac{6}{27}$
Dies frigid. 12. 66. E b N 1. }
— tepid. 1. 46. V V b S 2. } media Therm. Altit. 54 $\frac{8}{27}$

Tusses, Colli Fauciumque Tumores, Rauce-
dines, levi sæpe cum Febricula, sunt valde fre-
quentes, Febres putridæ *nervosæ* passim.

Dig. Dec.

Summa Pluviæ hoc (C) Anno est = 30. 974.

Notationes quedam.

(A) Hæ Maculæ oriri videntur ab infractis,
aut dissolutis, Sanguinis Globulis, *Arteriolas se-
rosas* intransibibus; dumque ibi hærent, *Petechias*
L for-

formant, aut Vibices; velut in Contusionibus Sanguis ruber in Vasa iniqua urgetur, & Cutim reddit discolorem. — Pestiferæ semper sunt, quòd Cruorem putridum esse, aut maximè solutum, denotant: imò adeò sæpe dissolvitur Sanguis, ut profusæ subsequantur *Hæmorrhagiæ*. Quòd quidem *Scorbuticis* quoque accidit crebrò, cum ne vel minima Febris Signa adsint, etsi totus fere Corporis Habitus innumeris violaceis Maculis inficitur; qui tamen mox, ac ne quidem tale quid somniantes, funesto sæpe Sanguinis Fluxu corripuntur: iste tamen Cruor nunquam, more solito, concrevit. — Hos certe *Scorbuticos* austeræ acida, opportunè data, adjuvant maximè, ut haud rarò notavi. — In talibus ideò *Variolis*, & aliis maculosis Febribus, valeant plurimum. — Missio Sanguinis utique obesse magis, quàm prodesse, videtur.

(B) Estne peculiaris aliqua *Atmosphæræ* Constitutio ad Eruptiones cuticulares gignendas apta? utique per idem fere Tempus, quo *Variolæ*, aut pustulosæ Febres, grassantur, *Exanthemata* quoque omnigena, ut *Papulæ*, *Scabies*, *Erysipelas*, &c. infestare solent, ut observatur sæpissimè: imò dudum, & vulgò noverint vel *Mulierculæ*, quod *Morbilli*, aut *Rubeolæ*, *Variolas* plerumque præcurrunt. Nonne adeò desumendum sit hinc Monitum *prophylacticum*? — Forte lenia *Mercurialia*, quæ in aliis Cutis Morbis tantum valent, tempestivè assumpta, aut *Variolis* sint Antidota, aut morbum saltem faciant leviolem: idque potissimùm cum & Vermiculos eracent, qui junioribus præcipuè adeò infesti sunt, & tam diras sæpe (unà sævientibus *Variolis*) movent Tragædias. — Hæreo tamen ne fortè Sanguinem quo-

quorundam dissolvant nimum, & ad *Hæmorrhagias* disponant fatales: hoc autem ex facili præcaveri potest Corticem Peruvianum, aut tale quid, exhibendo simul.

(C) Annis maximè pluviosis hic debet annumerari, ob Frequentiam saltem, si non ob Pluviæ Quantitatem: nam continua fere decedit, quanquam rarè admodum gravis. Imbres utique vehementes Aerem faciunt ficiorem, quatenus Vapores per *Atmosphæram* congestos deturbant; hinc post eos plerumque Aer purus valde & liquidus apparet, & multo majorem ejus siccitatem *Hygrosopia* indicant: densa autem, & nebulosa quasi Pluvia, omnia humectat maximè. — Vix unquam sanè memini *Atmosphæram* magis fuisse humidam & crassam, quàm hoc & elapso Anno: Hyems fuit tepida nimis, Æstas perfrigida; utraque infesta semper & Pluviæ ferax; ac nunquam non Morbis abundans; — Ex quo sanè tam udas habuimus Tempestates, Febres putridæ, lentæ, *nervosæ*, ac intermittentes omnigenæ, per has Regiones grassatæ sunt maximè; etiam in hoc Oppido & per Viciniam, cum tamen Annis abhinc viginti veras intermittentes rarissimè viderim. Imò bene memini Milites plurimos, emeritos, ad Arcem nostram olim transvectos ab Oris Icenis & Portu magno, pertinaci admodum Quartana tantum non confectos penitus; qui tamen hic, à sola Benignitate Cœli, convaluere protinùs.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXVI

JANUARIO.

TRISTI sub Aspectu Annus exoritur :
dum enim *madidis Notus involat Alis*,
perpetuæ fere ruunt Pluviæ. Paucissimi sanè
fuere Dies aprici toto Januario: *Atmosfera* ve-
rò quàm maximè humida & crassa; exeunte
Mense algida. Gelu rarò admodùm, Diluvia
sæpe.

Pluvia	¹¹ 1.	¹ 2.	¹¹ 3.	4.	6.	8.—	¹ 10.	¹¹ 11.	¹¹ 12.—
	¹¹ 14.—	¹¹ 16.—	¹¹ 18.	¹ 19.	21.—	¹¹ 23.	¹¹ 24.	¹¹ 25.—	¹¹ 28.
									¹¹ 30.

Dig. Dec.

31. = 5. 070.

Grando 2. 13. 20. 26. Fulgur & Tonitru cum
Pluvia gravissima 16. Vesperi.

Gelu 16. N N w 1.—22. N N w 1. Procella
25. Vespere. S S w.

Altitud. maxim.	6.	29.	8.	VV	NN	VV	2.	} media 29. 2 ²⁷ / ₃₀
minim.	25.	28.	7.	SS	VV	4.		

Dies

1736)

Constitutio Aeris, &c.

119

Dies frigid. 22. 66. N N VV 1.
— tepid. 4. 50. S b VV 2.} media Ther. Altit. $56\frac{16}{32}$

Multi Tussi vexantur, Fauciumque & Parotidum Tumore. Apoplexia & Paraplegia passim: Prurigo & Pustulæ frequentes.

FEBRUARIO.

Quamvis Initio Februarii Tempestas fuit nimbo-
bosa valde, mox tamen successit Apricitas aliqua,
ac Frigus acre, flante plerumque Vento aquilo-
nali, qui Aerem siccabat plurimum, & omnia
sæpe rigido constrixit Gelu. Principio Mensis
Inundationes permagnæ; post etiam satis Terris
Nivis atque Grandinis misit Pater.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{11}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{11}{7}$ $\frac{11}{8}$ 9. 14. 26.

Nix 16. 17. N N w 1. — 19. S S E 1.

$\frac{1}{20}$. E 3. — 23. N N w 3. — 24. N N
w 2.

Grando 2. w N w 2. — 19. 21. 24.

$\frac{1}{26}$. E S E 2. — 28. N N w 1.

Leves AB. 7. E S E 1. — 19. E b S 1. — magna
AB. 6. H. 8. p. m. N. 1. Radii coruscantes vi-
santur vel ab ipso Austro, Corona lucida ma-
gis vergit ad Orientem quàm vidissem antehac
inquam.

Magnus erat hic Maris Æstus Die 16. N N
w 3. at minimè inundans ut apud Londinenses,
Cenones, Cantianos atque Belgarum Oras, ubi
quàm maximus fuit.

8 Altitud. maxim. 29. 30. 0. N b E 2. } media 29. $3\frac{16}{26}$
 ——— minim. 22. 2. 5. VV S VV 2x. }
 Dies frigid. 13. 72. N N E 1. } media Therm. Altit. $60\frac{6}{26}$
 — tepid. 2. 56. VV N VV 1. }

Tusses & Catarrhi levi sæpe cum Febricula permulti; Anginæ, Pleuritides & Peripneumoniæ haud raræ: Juniores quamplurimos Perniones vexant maximè.

M A R T I O.

Frigida Tempestas ad Diem usque decimum Martii, post autem multo tepidior evasit: Spiravit Eurus hoc Mense sæpissimè, & pulchra non rarò affulsit Apricitas cum Aëre puro siccoque.

Pluvia 1. 6.—8. ^{II} 11. ^{III} 19. 21. 23. 27. ^{II} 29.
 Dig. Dec.
 Nix 3. E 3.—8. N w 1.—2. 138.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 0. Eb N 2. } media 29. $4\frac{11}{31}$
 ——— minim. 22. 28. 8. S S E 2. }
 Dies frigid. 7. 66. N VV. 1. rigid. Gelu & maxima Pruina. }
 — tepid. 27. 45. S S E 2. media Therm. Altit. $51\frac{8}{31}$ }

Perniones ulcerosi molestissimi frequenter. Peripneumoniæ passim, præcipuè verò nothæ.

A P R I L I.

Eurus afflavit sæpe, Boreas nonnunquam; Caurus frequenter, hoc Mense; quod Barometrum, diu depressum, resurgere fecit, Nubesque

1736)

Constitutio Aeris, &c.

121

que abegit: à decimo quinto tamen ad vicesimum quintum Pluvia frequens.

Pluvia 1. $\frac{1}{15}$. — $\frac{11}{18}$. — $\frac{1}{21}$. 22. $\frac{11}{25}$. Grando 15.
Dig. Dec.

= 1. 340.

Pruina maxima 11. 12. Maximæ Rorationes
ad Finem.

8 Altitud. maxim. 3. 30. 1. E 1.
— minim. 25. 29. 3. VV S VV 1. } media 29. $7\frac{1}{2}$
Dies frigid. 11. 58. N 1.
— tepid. 29. 32. Malacia. } media Ther. Altit. $43\frac{25}{50}$

Pleuritides & Peripneumoniæ frequentes: Anginæ & Ophthalmiæ passim.

M A I O.

Perflavit Eurus. plerumque durante Maio, isque sæpe velox, ac deprimens *Mercurium baroscopicum*, Aquilone tamen, aut Coro, nonnunquam intercurrente. Ineunte Mense Frigora pro Anni Tempore haud exigua, post verò Aer tepidus sæpe & tenuis.

Pluvia $\frac{11}{2}$. 4. 5. $\frac{11}{9}$. 11. $\frac{11}{12}$. 15. 16. $\frac{11}{22}$. 23.
Dig. Dec.

27. = 2. 536.

Ventus vehemens 21. p. m. E S E. Magnus Halo circa Lunam 9. H. 10. p. m. E 2. — per magnus igneus Halo 11. H. 10. p. m. S E 3.

8 Altitud. maxim. 19. 29. 8. E S E 2. } media 29. 5.
— minim. 12. 29. 1. S E 3.
Dies frigid. 3. 52. NN VV 1. Frigus insolitum! } med. Ther.
— tepid. 31. 27. N N VV 1. ————— } Altit. $39\frac{10}{31}$

L 4

Pleu:

Pleuritides & Peripneumonix sparsim: Eruptio Pustularum rubrarum urentium plures molestat. Tempestas infesta tabidis.

J U N I O.

Per Initia Junii Aer valde crassus fuit & humidus; tenuis post, ac fervidus sæpe, Finem adusque, fere Mensis, maximo decidente Rore: dum incerto admodum Cursu spiravit Ventus; Eurus sæpe, Boreas haud raro, Caurus quoque interfuit frequenter, Libs Initio.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 4. 6. $\frac{1}{13}$. 14. 23. $\frac{6}{27}$. $\frac{1}{29}$.
 Dig. Dec.
 30. = 1.614.

Fulgur & Tonitru 29. Nocte. S E 2. — è longinquo 23. — 28. p. m.

8 Altitud. maxim. 18. 29. 9. N N E 1. } med. Bar. Alt. 29. $6\frac{2}{3}$.
 — — — — — minim. 27. 29. 3. E S E 2. }
 Dies frigid. 6. 38. V V N V V 1. } media Therm. Altit. 26 $\frac{6}{30}$.
 — — — — — fervid. 11. 20. N N E 1x. }

Febres tertianæ, semitertianæ, & quotidianæ, passim: *Ophthalmiæ* frequentes: Phthisici colliguntur maximè. Alique Pleuritides & Peripneumonix incipiente Mense: *psorica* Eruptiones plurimæ. — Innumeri Afili Armenta molestissimè infestant.

J U L I O.

Varius fuit hoc Mense Ventus, & Malacia frequens, Caurus verò sub Finem plerumque, sudo existente Cælo, ac fervido, cum Rore maximo.

736) *Constitutio Aeris, &c.* 123
 imo. Immenſa Viſ Pluviae decedit Die ſecundo
 & octavo, flante Vulturno; decimo autem, eo-
 dem perflante Vento, quantum vix unquam per
 dem Temporis Spatium; ab Hora enim iſtius
 Diei tertia pomeridiana ad quintam matutinam
 Dig. Dec.
 undecimi Pluvia fuit 1. 686.

Pluvia 1. $\frac{1111}{2}$ 3. $\frac{1111}{8}$ $\frac{1111}{10}$ — $\frac{11}{12}$ — 14. $\frac{11}{19}$ 25.
 Dig. Dec.
 8. = 4. 870.
 Procella 2. Nocte. S E. Fulgura Nocte 13.

Altitud. maxim. 16. 29. 9. Malacia. } media 29. $5\frac{2}{31}$
 ——— minim. 11. 29. 1. SS E 2x. }
 dies frigid. 4. 40. N 2. } media Therm. Altit. $27\frac{10}{31}$
 — fervid. 29. 18. VV N VV 1. }

Febres intermittentes & *miliares* aliquæ mali
 modum moris, Ruri præcipuè: *Variolæ* hîc
oradicæ: Cholerae, *Diarrhaeæ*, ac *Dysenteria*
 iam, undique valde frequentes ſunt.

AUGUSTO.

Ineunte Auguſto Aer fuit craſſus & valde
 lidus, medio Menſe multo frigidior, flante
 auro; cæterum Ventus erat inconfans maxi-
 è: ſub Finem Ros plurimus decedit, ac redie-
 Calores.

Pluvia $\frac{11}{1}$ 4. 6. 7. 8. $\frac{1}{12}$ — $\frac{11}{14}$ $\frac{11}{15}$ 17. $\frac{1}{26}$.
 Dig. Dec.
 31. = 1. 834.
 Nox procelloſa valde 13. S w b w 4. Ful-
 ra 20. Noctu. Magni Maris Aëſtus 26. 27.
 S E 2x.

Die

Die 25. W 1. inter Horam nonam vespertinam & undecimam Zona quædam angusta, at lucida valde, ab imo Occidente ad summum Orientem usque extensa, magnæ Iridis instar effulsit, stupente Populo. AB. 29. N 1.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 18. 29. 8. N V V b N 1.} \\ \text{— — — — — minim. 26. 29. 1. S S V V 2.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 18. 29. 8. N V V b N 1.} \\ \text{— — — — — minim. 26. 29. 1. S S V V 2.} \end{array}} \right\} \text{media 29. } 4\frac{17}{30}$
 Dies frigid. 16. 42. V V N V V 1. } media Therm. Altit. 27 $\frac{7}{30}$
 — feivid. 3. 19. V V S V V 1. }

Febres *miliares*, malignæ, frequentes, in Cornubia præsertim. Cholerae, *Diarrhææ*, *Dysenteria* exque aliquando cruentæ, frequentissimæ.

Mellificant Apes optimè; plurimæ Cicadæ & Vespæ. Optimum undique Frumentum.

S E P T E M B R I.

Flavit plerumque Corus Mense Septembri, Initio & sub Finem Pluvia: altam fere tenuit Stationem *Barometer*: Aer majore ex Parte crassus.

Pluvia 1. 3. 4. 6. 8. 10. 13. 15. 22. — 24.
 Dig. Dec.

26. — 29. = 1. 5 12.

Leves AB. 26. 27. H. 9. N w 1. Maximus Halo circa Lunam 12. H. 11.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 21. 30. 0. N N E 1.} \\ \text{— — — — — minim. 30. 29. 3. S V V b S 3.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 21. 30. 0. N N E 1.} \\ \text{— — — — — minim. 30. 29. 3. S V V b S 3.} \end{array}} \right\} \text{media 29. 7.}$
 Dies frigid. 18. 50. maxima Pruina N N V V 1. } media Ther.
 — calid. 7. 29. S V V 1. — — — — — } Altit. 36 $\frac{20}{29}$

Cholerae, *Diarrhææ*, *Dysenteria*, adhuc valde frequentes, Febre nonnunquam comitante.

Pluri-

Plurimæ Febres *miliares*, *scarlatina*, pustulosa; aliquæ porro lentæ, *nervosa*: sæpe cum Glandularum Parotidum Fauciumque Tumore, ac profusis semper Sudoribus: Australibus in Oris Devonix & Cornubiæ præsertim.

O C T O B R I.

Ineunte & exeunte Octobri immensa Pluvix Copia decidit, dum Libs sæpe fremuit vehementer; à duodecimo autem ad vigesimum primum minima Pluvia, Euro flante, aut Aquilone: ad Finem Mensis Aer erat valde crassus & humidus.

Pluvia $\frac{1111}{1.} \frac{1}{3.} \frac{11}{6.} \frac{11}{7.} \frac{11}{9.} \frac{11}{10.} \frac{11}{11.} \frac{11}{22.} \frac{11}{23.}$
 $\frac{11}{26.} \frac{11}{27.} \frac{11}{29.} \frac{11}{30.} \frac{11}{31.} = 6.534.$
 Dig. Dec.

Procella 1. multo Mane. S b w — 7. S w — 9. Mane. S w b w 4^x. ab Hora autem prima ejus Diei pomeridiana ad tertiam usque Corus vehementissimus, quasi Circius Gallicus omnia deturbans, perfremuit, velocissimè cadente *Mercurio*. — Maximus Halo subluteus circa Lunam 6. H. 8. w 1. AB. 27. H. 8. w N w 3. media autem Nocte Grando gravis & Fulgura.

Altitud. maxim. 21. 30. 1. N N E 1. } media 29. $4\frac{1}{3}$
 ——— minim. 9. 18. 4. N V V 4^x. }
 Dies frigid. 21. 54. N N E 1. } media Therm. Altit. $42\frac{12}{35}$
 ——— 16. 36. E S E 1. }

Febres lentæ, *nervosa*, *miliares*, haud pauca, cum Sudoribus profusis: Cholerae ac *Dysenteriae* adhuc passim; præcipuè Mensis Initio: Sub Finem Tusles *ferina* inter Pueros.

Morbus

Morbus pestilens Boves consumit plures & Porcos in Australi Devoniam.

N O V E M B R I.

Altum plerumque tenuit Gradum *Barometer* hoc Mense: Ventus ab Oriente sæpe spiravit, sæpe & à Septentrione. Aer fuit non rarò valde humidus & gelidus sæpe: Initio Glacies, ad Finem Gelu maximæque Pruinæ.

Pluvia 1. 6. 7. 9. 11. 12. 16. 18. 21. 24. ^{III}
Dig. Dec. ^I
25. 28. = 1. 150.

Procella Vesperi. 24. S w b w, & tota fere Nocte Grando multa 7.

A. B. levis, 7. N E 1. — major 8. H. 10. N N E 1, magna variegata 13. H. 7. N w 1.

8 Altitud. maxim. 5. 30. 3. E N E 1. } media 29. 8 ²/₃,
— — — — — minim. 25. 28 8. V V 2. }
Dies frigid. 27. 65. E N E 1. } media Therm. Altir. 58 ²⁵/₃,
— tepid. 22. 44. V V N V V 1. }

Dysenteria adhuc: *Tussis convulsiva* passim. Innumeri fere Tussi, Coryza, Tumoribus Colli ac Faciei, corripuntur; haud pauci Angina. Plurimi Morbo *rheumatico* vexantur.

D E C E M B R I.

Perstat usque *Mercurius* altam tenere Stationem, etsi medio Mense Libs furens istum deturbavit, plurimamque demisit Pluviam, *Atmosphæram* verò fecit humidissimam. Sanè ab Exitu Octobris, ad hoc usque Tempus, Aer immensa Vaporum

1736) *Constitutio Aeris, &c.* 127
 porum Cópia abundavit, quæ, partim saltem,
Mercurium sustinuit. Septentrio Gelu nonnun-
 quam produxit, idque sub Finem Mensis ri-
 gidum.

Pluvia $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ 10. — 13. $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$
 Dig. Dec.
 8. — 20. 22. 25. 27. 28. 31. = 5.026.
 Fulgur & Tonitru cum vehemente Grandine
 primo Mane. w N w 4^z.
 Procella 17. Nocte. w S w — 20. bene Mane.
 w b w

Altitud. maxim 24. 30. 4. N 1^z
 ——— minim. 20. 29. 1. S VV b VV 4. } media 29. 7¹⁸/₂₉
 Dies frigid. 25. 70. N 1.
 — tepid. 14. 48. S VV 3. } med. Therm. Altit. 55²⁰/₂₉

Diarrhææ & Dysenteriæ adhuc; *Rheumatismus*
 sequens & *Icterus*: maximæ Querelæ de lan-
 guido Virium Statu undique. — Tumores Fau-
 cum, Glandularum, Parotidum, ac Maxilla-
 rum; Tusse, Destillationes, Coryzæ, Rauce-
 nes, levi non rarò comitante Febricula, per
 omnes undique. Plures vel in iisdem Ædibus
 simul & semel corripuntur; evanescere vero hæc
 omnia facillimè, modò se in lectulo paululùm
 continerent, & multa tepida Potione Sudores
 elicerent.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXXXVI.
 Dig. Dec.
 = 36. 706.

CONSTI-

quamplurimi Equi eodem penè Morbo affici videntur, quorum certè pereunt plures. Haud parè quoque grassantur Pleuritides ac Peripneumonix, nothæ præcipuè: nec infrequens est cæterus.

F E B R U A R I O.

Ventus occidentalis hoc Mense prævaluit, ad septentrionem sæpe, ad Austrum verò hæctens sæpiùs; Aquilo nonnunquam, aliquando Vulturnus, interfuit: humidus permanfit Aer, at subsedit *Barometer*.

	^{III}	^{II}	^{III}		^{II}		^I	^{III}	
Pluvia	1.	3.	6.	8.	11.	13.	14.	15.	16.
									17.
									Dig. Dec.
	^{II}	^{II}	^I						
	8.	19.	21.	24.	Grando	25.	26.	= 3.	488.

Maxima Pruina & Gelu 5. 6. 8. 9. Procella, algur & Tonitru 17. Nocte. w b N. Maximus Halo circa Lunam 27. 28.

Altitud. maxim.	9.	30.	2.	N b E 1.	} media 29. 7 ₂₇
minim.	16.	29.	2.	S VV 3x.	
ies frigid.	2.	66.	N 1.	} media Therm. Altit. 55 ₂₇	
tepid.	23.	49.	S VV b VV 2.		

Multi Rheumatismo & Angina laborant, plurimi adhuc Morbo catarrhali pulmonario. Va-
riolæ hic sporadicæ, multis in Locis epidemicæ.
Cussis anginosa durat usque inter Equos.

M A R T I O.

Principio & Fine Martii Eurus afflavit, aut Boreas, medio autem plerumque Corus: Aer evasit tenuis magis & siccus ad Finem præcipuè; delapsis scilicet jam Vaporibus.

Pluvia $\frac{111}{7.}$ $\frac{1}{8.}$ $\frac{1}{10.}$ 11. $\frac{11}{13.}$ $\frac{11}{14.}$ 15. $\frac{1}{16.}$ $\frac{11}{18.}$
 Dig. Dec.
 $\frac{111}{19.}$ $\frac{1}{20.}$ $\frac{11}{21.}$ $\frac{11}{22.}$ $\frac{111}{30.}$ 31. = 4. 328.
 Levis AB. 7. w N w 1. — 18. N w b w 3.
 Procella 18. a. m. S 4^x.

8 Altitud. maxim. 6. 30. 1. N N E 1. } media 29. 5¹²₃₀
 ——— minim. 14. 28. 8. VV b N 3^x. }
 Dies frigid. 6. 64. rigidum Gelu. } media Ther. Altit. 52²₃
 — tepid. 31. 46. S E 1. ——— }

Pleuritides, ac Peripneumonix, & veræ & nothæ, haud raræ: Rheumatismus, Ischias diu admodum vexans, & sævæ Arthritides, multos cruciant. ——— Tusses plurimæ cum Gutturis Dolore ad Finem Mensis.

A P R I L I.

Ab Initio Mensis ad Diem decimum octavum Ventus ex Oriente perflavit, à vicesimo Libs, aut Argestes: ineunte Aprili Aer fuit valde frigidus, medio siccus admodum, & exinde tepidior.

Pluvia $\frac{1111}{1.}$ $\frac{11}{2.}$ 4. $\frac{1}{8.}$ 9. $\frac{1}{19.}$ $\frac{111}{21.}$ $\frac{11}{22.}$ $\frac{11}{23.}$
 Dig. Dec.
 $\frac{1}{26.}$ 28. gravis Grando 24. = 3. 058.
 Procella

1737)

Constitutio Aeris, &c.

131

Procella 2. E S E 4. — 13. tota Die. E 4^x.

8 Altitud. maxim. 12. 30. 0. N. E 18. } media 29. 6⁴/₂₈
 ——— minim. 13. 29. 0. S. E 3. }
 Dies frigid. 6. 5. E 1. } media Therm. Altit. 43¹¹/₂₈
 — tepid. 30. 32. E 2. }

Multi Apoplexia, Paralyfi & Vertigine correpti sunt; aliqui Pleuritide & Peripneumonia. *variola* passim: Asthma valde frequens, medio Mense praesertim. ——— Tusces, Coryzae, Tumores Colli ac Faciei undique. — Crebrae Tusces *convulsivae* inter Pueros in australibus Damnoniae Oris.

M A I O.

Recurrrens jam ad Orientem Ventus per totum fere Mensem spiravit, ad Austrum flectens saepe, ad Septentrionem verò saepius magisque. Tempestas fuit per Initia (si Diem unum, alterumve, excipias) tepida satis: post verò fervidissima successit. Rorationes maximè Agros Hortosque fovebant assidue durante Tempore fervido, alioquin omnia fere fuissent adusta.

Dig. Dec.

Pluvia 8. 9. 13. 15. 27. = 0. 332.

Fulgur & Tonitru hic 27. p. m. S w b w 2.
 Fulgur & Tonitru ad Septentrionem, prope Alpes Damnonienses, & in occidentali Parte Cornubiae, cum gravissima Pluvia 24. 25. 26. nulla hic.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 0. N E r. } media 29. 5¹⁵/₃₀
 ——— minim. 22. 29. 2. E S E 2. }
 Dies frigid. 10. 52. N 2. insolitum Frigus! } media Therm.
 — fervid. 25. 15. Malacia. ——— } Altit. 29¹⁶/₃₀

M

Febres

Febres *miliares* compositæ (commistæ nempe cum Pustulis limpidis Papulæ rubræ) hic passim, valde frequentes in occidua Cornubia. Initio Mensis plures Morbis Capitis correpti, ac Pettoris. Multi *Hæmorrhagiis* immodicis laborant; quarum Causa haud dubia fuit enormis admodum Aeris Mutatio: medio enim Mense penè horruimus Frigore, sub Finem arsimus Aestu.

J U N I O.

Priorem Junii Partem Aquilo frequens siccam quidem reddidit, ac frigidam valde; calida verò posterior evasit, Cauro plerumque spirante. Aer per totum fere Mensem fuit tenuis admodum, plurimæ verò & maximæ cecidere Rorationes. — Terra, Solis Ardore percalefacta, quamplurimos emittit Vapores, qui, nocturno condensati Frigore, Herbas Graminaque grato fovant Humore: nisi totos fere, dum exhalantur, Ventus rapidus secum verrat per Auras. Ideò cum aut nullus sit Ventus, aut lenis admodum, Ros plurimus videtur, dum fortis adsit dissipatur protinùs; æquè tamen exhalante Terra Vapores.

Dig. Dec.

Pluvia $\frac{1}{4}$. $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{6}{17}$. $\frac{11}{18}$. 23. 25. = 1. 066.
Tonitru a. m. 25. N W 1.

8 Altitud. maxim. 7. 30. 0. N 1. } media 29. $6\frac{12}{30}$
— — — minim. 5. 29. 2. E N E 1. }
Dies frigid. 15. 42. N N VV 1. } med. Ther. Altit. $27\frac{26}{30}$
— fervid. 22. 19. Malacia. }

Procedente Mense Febres *rheumatica* & *Coryzæ* plurimæ: *Diarrhœa* frequens admodum.
Tusses

1737) *Constitutio Aeris, &c.* 133
 Tussis *convulsivæ* inter Pueros passim. *Variolæ*
 in Vicinia, jam verò hic nullæ.

J U L I O.

Æstuosus subsequitur Julius; crassum tamen
 congerit Aerem creber ex Austro & Occidente
 Ventus, sub Finem præcipuè. Immensa Vis
 Roris decidit Initio. Muscæ innumeræ molestant
 undique, & Erucæ plurima vorant.

Pluvia 8. 13. 14. 18. 19. 20. 22. 23. 25.
 Dig. Dec.
 28. — 31. = 1. 320.
 Tonitru è longinquo 7. 11. Procella 22. S
 w b S 4x.

8 Altitud. maxim. 4. 29 7. S E 1. }
 ——— minim. 22. 29. 0. S V V b S 4x. } media 29. 4.
 Dies frigid. 31. 36. N V V b V V 1x. }
 — fervid. 7. 17. V V S V V 1. } med. Ther. Alt. 25 $\frac{18}{30}$

Febres *miliares*, rubræ præcipuè: Peripneu-
 moniæ & Morbi colici passim. Tussis *convul-*
sivæ in Australi Devoniam quamplurimos infestant
 Pueros. *Ophthalmiæ*, & *Choleræ* haud raræ.

A U G U S T O.

Ineunte & exeunte Augusto Ventus fuit ut-
 plurimum Septentrionem inter & Occidentem,
 Libs autem medio interfuit frequenter: *Atmos-*
phæra facta est crassa valde & humida, ac mul-
 to frigidior.

Pluvia ⁱⁱⁱⁱ 1. ⁱⁱⁱ 2. ⁱⁱ 3. 5. 6. 7. 10. 13. 15. ⁱⁱ 19.
ⁱⁱ 20. ⁱ 21. ⁱⁱ 23. ⁱⁱ 25. 26. = 3. 848.
 Dig. Dec.

Gravis Procella 20. primo Mane. S w b S
 4^r. AB. 9. H. 10. N w b w 1. maxima AB.
 10. H. 9. N w 1. Hujus Radii variis erant,
 atque maximè vividis, distincti Coloribus: Co-
 rona pulcherrimè rutilans à Zenith nostro ad O-
 rientem duodecim circiter Gradibus, ad Meridiem
 quoque declinabat paululùm. Permagna rursùs
 AB. 11. 10. p. m. N w b N 1. Corona erat
 eodem ipso Loco, quo hesternæ Noctæ Coloris
 Ferri igniti. Levis AB. 12. H. 9. w N w 1.

8 Altitud. maxim. 9. 29. 9. N VV 1. } media 29. 50
 ——— minim. 10. 28. 8. S VV b S 4^r. }
 Dies frigid. 4. 44. N N VV 1. } media Therm. Altit. 33²⁷
 — calid. 17. 27. S S VV 2. }

Tusses, Diarrhææ & Cholerae, valde fre-
 quentes. Febres lentæ, nervosæ & miliares pas-
 sim: Variolæ sporadicæ.

S E P T E M B E R I I.

Toto hoc Mense humilem tenuit Stationem
 Barometer, Vulturno plerumque flante, aut
 Africo. Aer interim redditus est humidus val-
 de, & frigidus: nam Septentrio quoque aliquan-
 do intercurrebat.

Pluvia ⁱⁱⁱ 2. ⁱ 11. — 15. 18. ⁱⁱ 19. ⁱⁱ 20. — 22. — 24. ⁱⁱⁱ 26.
ⁱ 27. ⁱ 28. — 30. = 2. 826.
 Dig. Dec.

Procella

1737) *Constitutio Aeris, &c.* 135

Procella 11. S E b S 4^r. — 22. S w 4. Fulgur & Tonitru a. m. 20.

Maximus Halo circa Lunam 27. S b w 1^r.

8 Altitud. maxim. 10. 29. 9. N N E 1. } media 29. $3\frac{13}{27}$
—— minim. 22. 28. 5. S V V 4. }
Dies frigid. 30. 46. N N V V 1. } media Therm. Altit. $36\frac{8}{27}$
— calid. 6. 28. E S E 1. }

Diarrhœa plurimi laborant, aliqui *Febribus* intermittentibus, *anomalis*; multi *Morbo colico* & *Cholera*. — Tumores *Faucium*, *Parotides*, *Coryzæ* cum *Tussi* valde frequentes: *Variolæ* sparsæ. Nec infrequens est *Icterus*, nec *Rheumatismus*.

O C T O B R I.

Frequens ab Oriente Ventus, Mense Octobri, *Baroscopium* subinde erexit; qui porrò, ad Septentrionem deflectens sæpe, Tempestatem, fecit paulo frigidior, non raro tamen intercurrente pulchra tepidaque Die: Aer autem plerumque humidus fuit & crassus.

Pluvia $\frac{11}{1}$. 5. $\frac{1}{8}$. 9. $\frac{11}{11}$. $\frac{11}{15}$. $\frac{1}{18}$. 24. 30.
Dig. Dec.

= 1. 556.

Procella 15. Nocte. S w 4^r. Glacies & maxima Pruina 14. 15. N N E 1.

Die 20. H. 7. p. m. vividam Iridem lunarem observavi, densissima, ac tenuissima, decidente Pluviola.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 1. N N E 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$
—— minim. 16. 29. 0. V V b S 2. }

M 3

Dies

Dies frigid. 22. 61. N E 2x. } media Therm. Altit. $50\frac{25}{30}$
 — tepid. 3. 43. N b E 1.

(A) Icterus frequens; Variolæ passim. Dentium Dolores, Tumoresque Faucium ac Faciei, cum Cruciatibus rheumaticis sæpe, præcipuè Lumborum, plurimos vexant.

N O V E M B R I.

Nunc Boreas, nunc Corus, Mercurium Barometri sustinent usque, maximè per Initia Novembris, Aerem tamen neutiquam desiccabant: medio quidem Mense haud parum sæpe intervenit humidus Auster.

Pluvia $\frac{11}{12}$. — $\frac{1}{14}$. — $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{19}$. 23. — 25. 26. 28.
 Dig. Dec.
 = 1. 334.

AB. 1. 10. p. m. E N E 1. — 7. N w b. N 1.
 Vehemens Ventus 27. p. m. N w b. w.

8 Altitud. maxim. 4. 30. 4. E N E 1. } media 29. $8\frac{14}{25}$
 — — — minim. 16. 29. 1. VV 1.
 Dies frigid. 30. 65. N E 1x. } media Therm. Altit. $53\frac{6}{25}$
 — tepid. 12. 48. S b VV 2.

Per omnia undique Loca incessit hoc Mense Morbus, medio tamen hoc in Oppido potissimum: omnes fere, cujuscunque fuerint Habitus, aut Ætatis, corripienti; Modo quidem haud ab simili, quo Febricula catarrhalis epidemica Anni MDCCXXXIII. at sæviore multo.

Magna adfuit Gravedo & Capitis Dolor, Nausea frequens, Sternutamenta perpetua, Destillationes maximæ, ac Tussis sæpissimè importuna

tuna valde. — Per Initia discruciauit multos acerbus Dorsi atque Lumborum Dolor, quod malè plerumque significabat; nam & magna simul accessit Præcordiorum Oppressio & haud modica Febris, sæpe planè *peripneumonica*: perliquida verò expuerunt, rarò coctum aliquid. De his actum esset prorsus, si Phrenitis quoque interfuisset. — Tanta sæpe fuit in Fauces Destillatio, ut Anginam haud levem faceret: sæpiùs verò Faciei Tumor, Parotidum, Maxillarum, sequutus est, ac immensa Pituitæ acris ex Ore Naribusque Fluxio. — Plurimos acutissimus Dentium Dolor torfit, etiam quibus antè fuerant sanissimi: idque persæpe uno solùm à Latere, desinens accuratissimè inter Dentes *incisores*. Doluit & sæpe dimidium tantùm Caput, quasi in *Hemicrania* exquisita.

Longe plurimi sola laborabant Febricula cum Gravedine infesta, *Catarrho* & molestissimis Dentium Doloribus, accedente ut plurimùm Tumore Faucium & Aspredine: Juniores autem, crescente Morbo, delirabant sæpe. — Per multos cruciavit Dolor *rheumaticus* vagus, quosdam *ischiadicus* vehemens, non rarò durans diu: haud paucos errantia Tormina corripuerunt, *Diarrhæa* sæpe insequente *critica*. Lingua fuit alba plerumque, rarò arida, nec multùm sitiebant Ægri; Urina turbida fere & subrubra. Cruor, sæpè Pleuriticorum similis.

Febris hæc *catarrhalis* plures jam per Hyemes plus, minusve, grassata est: varias autem induit Formas, pro Ratione variarum Hominum Constitutionum. Plures levis solùm Febricula tenuit, modico protinùs discussa Sudore; haud paucos autem Peripneumonia gravis: in Genere

tamen multo vehementius hoc Anno sæviit, & largiorem Sanguinis Missionem postulavit.

Omnino mihi pendere videtur à crasso, udo, gelidoque Aere, Spiracula Cutis occludente, & acrem intra Corpus Colluviem congerente: nam & præcedit hunc Morbum semper, ac comitatur, crassa admodum humidaque *Atmosphæra* Tempores: nec grassatur unquam, nisi Mensibus hybernis, & ejusdem prope Indolis esse videtur cum Hyemali Febre *Sydenhamii*.

DECEMBRI.

Varia fuit admodum hoc Mense Aeris Temperies, nunc frigida valde, fiante Aquilone, nunc longè tepidior, irruente Africo sæpe, nec infrequenter Vulturno: immensa Vis Vaporum, per *Atmosphæram* diffusa, *Barometrum* mirè sustinuit; etsi haud paucæ corruerunt Pluviæ.

Pluvia ^{II} 2. ^{II} 4. — ^{III} 6. ^{II} 8. ^{II} 12. 14. — 16. 18. — 20. Dig. Dec.
^I 22. ^{II} 23. ^{III} 24. 26. 30. Grando 31. = 2. 620.

Procella 18. S S E 4. — 30. S S W 4^x. Maximæ sæpe Pruinæ.

⌘ Altitud. maxim. 4. 30. 3. N N E 1. } media 29. $8\frac{15}{31}$
 — minim. 8. 29. 3. S V V 3^x. }
 Dies frigid. 29. 73. N E 1. } media Therm. Altitud. $57\frac{2}{31}$
 — tepid. 24. 49. S V V 2. }

Prima Vespera Diei hujus Mensis quinti Cœlum totum, Nube quasi tenui obductum, rutilabat maximè, Lumine velut Ignis triumphalis reflexo: haud minorem utique spargebat Lucem, quàm vel ipsa plena Luna, Nubibus operta. Per-
 dura-

duravit verò mirum hoc *Phanomenon* ad mediam fere Noctem; at longè clarissimè effulsit inter Horam quintam & septimam vespertinam: levem sanè Vulgum haud leviter perterruit; hic tristitia Incendia timens, ille Cœlum deprecans perinde quasi sanguineum. — Aer toto fere Die nebulosus fuerat, ac tepidus, irrorante sæpe Pluviola, præcipuè post Meridiem; vix ullus Ventus: Vesperì verò Nebula ingratum mittebat Odorem; imò per Dumeta fortè tunc perequians, Pluviolæ Guttulis aspersus, insuavem admodum percepi Gustum, ceu ab ingrato Dulcore. — Longè, latèque, insolitum hœc Lumen Septentrionales Europæ Partes illustravit; apud Kilkenniam verò, in Hibernia, Globus quasi igneus, in Aere suspensus, videbatur, eodem Vesperì, per Horam fere, tunc terribili Fragore displosus, Flammas dispergebat undique.

Ad extremum fere Mensis duravit passim *Morbus epidemicus*, jam verò evanescit; plurimi tamen inde conqueruntur de maximo Virium Languore: Aliqui in Icterus, plures in Phthisin incidunt; permulti in Arthritidem & *Rheumatismum* pertinacem.

Quod ad hujus *Epidemici* Curationem attinet, parum certè discessimus à Methodo, quàm Anno MDCCXXXIII. suprà descripsimus: atqui in hoc sanè magis fuit necessaria Sanguinis Detractio, imò & nonnunquam repetita juvit, præsertim urgente Febre, ac sæviente Dorsi, aut Pectoris, Dolore. — At magno certè implicatur Errore quisquis in Morbis hujusmodi ab acri nempe Pituita productis, æquè liberalem Venæ Sectionem imperat, ac in vera Pleuritide, aut Peripneumonia; quod quidem candidissimè,

didissimus notavit dudum Sydenhamius, aliàs utique haud parcus Sanguinis detractor, *Section v. Capit. v.* quem velim ut consulat Lector.

Post Sanguinis Missionem frequentia *Epispastica* admoveri jussi: ex Ulcusculis acerrimi Serii Quantitas planè stupenda defluxit.

Nihil magis in hoc Morbo profuit, quàm blandus, tepidus, per omnia Membra æqualiter diffusus Sudor. Nihil eum ciebat tutius, quàm Serum Lactis vinosum dilutius, tenue Decoctum Eryngii, aut tale quid, epotum tepidè: optimo quoque Successu subinde dedi Misturam ex Sale Cornu Cervi, Succo Limonum saturato, Aqua Menthae, aut Hyssopi adjecta. Hæc percommodè movebat Sudores; si minùs id quidem, saltem Urinam; porro mollem semper præstabat Alvum: omni utique Modo Colluviem expellit pituitosam, ac Spiritum reddit expeditiorem, admisto præcipuè Oximelite scillitico. — Elixir asthmaticum le Mortii Tussis Vehementiam lenibat optimè, & promovebat etiam Sudores. — Alvus non solum per totum Morbi Impetum tenera servanda erat, sed & sub Finem purganda; ne graviora crearent Mala morbidæ Reliquiæ.

Post Febrem penitus abactam, obstinatissimi sæpe permanebant Dolores *rheumatici*, quos quidem expugnabant benè *Cathartica Mercurialia*. Nihil tamen inveni præstantius quàm sequentem Antimonii Præparationem; quæ profectò totam istius Mineralis Potentiam continet: eam ideo (sit Venia Verbo) Antimonii *Essentiam* nomino.

Omnes olim intendi Nervos ut ex Stibio Medicamentum aliquod utile expromerem; omnes fere Chemicarum & Alchemistarum Processus non exploravi solum, sed & in Ægrotis etiam variis sæpe probavi; plures sanè mirabilis agnosco Virtutis: hoc tamen affirmo sanctissimè, nihil inde melius, nihil tutius, nihil efficacius,prehendi unquam, quàm tritum illum, ac simplicem Vitri *antimonialis* Infusum ex Vino albo generoso, Aromate aliquo *Stomachico* adjecto. Possidet enim, experto crede, possidet, totas Antimonii Vires; quippe qui epotus largiter maximas movet Vomitiones, in minuta tantùm Quantitate, ad Guttas puta viginti, aut triginta, adhibitus Sudores elicit benignos; paulo tamen majore Alvum solvit leniter: quid potest aliud majus ulla alia Stibii Præparatio? Quamvis utem tantæ sit Virtutis Vinum hoc *Antimonialium*, minutissimis tamen Stibii Particulis, prope laxerim *Effluviis* solum imbuitur: quæ, cum sunt inter minima fere Naturæ, angustissima Corporis Vascula permeant facillimè; tantæ verùm efficacix, ut vel magnum Canalem alimentarium stimulent potenter, multo magis ideò exiles Corporis Canaliculos: ob summam autem Tenuitatem eos minimè lædant.

Hic ideò Tibi fisto, Lector bone! Medicamentum, paratu quidem facillimum, at Viribus maximum: in omnibus enim Vasculorum Obstructionibus percommode exhiberi potest, seu rimas expurgare Vias; seu intima Corporis penetralia detergere velis. Nihil utique ad sudores excitandos datur aptius, nihil tutius; nam parum admodum excalescit: unde in ipsis febribus, lentis præcipuè & intermittentibus, adhibe-

adhibetur optimè ; nec non in quamplurimis Morbis chronicis , in *Rheumatismo* rebeli potissimum. — Id utique spondeo, nullas huic deesse Vires , quas ulla habet Stibii Præparatio, Strophis utcunque pomposis venditata, aut improbo confecta Labore.

Tota Pluviae Quantitas, Anno MDCCXXXVII.
Dig. Dec.

= 27. 364.

Brevis Commentatio de Morbis Ictericis.

(A) In Ictero sæviore non rarò *Hæmorrhagias* vidi ex omnibus fere Corporis Meatibus , vix ullis cedentes Remediis ; imò haud citiùs uno Loco Fluxum cohibueris quàm eruperit alio. Id in piissima olim Matrona, tristi admodum Exemplo , notavi , quæ ictica , ac febriculosa , Sanguinem profudit vehementer ex Naribus , Viis urinariis, Utero, Intestinis, tandemque cum Sanguine Animam ! Et si *Hæmorrhagiam* , per breve saltem Tempus , restinximus sæpe ; pro Ratione verò qua Fluxus substitit infrà, eo violentiùs è Naribus profluxit.

Multis abhinc Annis Generosus quidam robustus , Poculis meracioribus Spirituique Vini ardenti nimium deditus, in gravem incidit Ictericum ; ex quo tamen sanus satis evaserit , si medicis Præceptis obtemperaverit probè . At ille contrà , quòd Gingivæ sæpè funderent Sanguinem, & Dentes essent *Scorbuto* scedati, Medica-
stro

Atro cuidam (si Diis placet) ad Dentes se commisit, qui Dentifriciis & Scalpris validè perfricans Dentes atque Gingivas, tantam excitavit *Hæmorrhagiam*, ut eam cohibere, vel valentissimis Strypticis, nequirent Chirurgi in Arte bene versati: sed innumeris profiliens Rivulis Sanguis, scētis quasi Arteriolis, per omnem undique Gingivam, sedecim Horarum Spatio Hominem, penè exsanguem, confecit.

Certè nunquam non aliquid subest Periculi, ubi Morbo arquato vexatis accidit profusio Sanguinis; denotat enim acerrimum & maximè solutum Statum Cruoris: quo quidem in Casu, Attenuantia, *Aloetica*, *Volatilia* atque *Chalybeata* exhibere, perinde est ac Hominem jugulare, & contrà Acida, diluentia, demulcentia, Aquæ acidulæ & id Genus alia, juvant maximè. Prodest sæpe plurimùm Semen Cannabis ex Lacte decoctum, aut Emulsio ex Seminibus Papaveris albi & Amygdalarum dulcium, post levem Sanguinis Missionem (si Febricula urgeat & ferat pulsus) & Alvi Solutionem debitam. — Sanè laud scio, annon modica Venæ Sectio æquè necessaria sit in *Hepatitis*, ac consequenter in Obstructione Hepatis cum febriculosa Sanguinis *Diathefi*, atque in *Pleuritide*, aut *Peripneumonia*: præcavet enim graviora Mala, Inflammationes scilicet, Apostemata dira, aut Scirrhotata.

Est verò alia Icteri Species, & (ut ajunt) toto Cælo diversa, quæ, ab inerte & viscida Bile pendens, diversam omninò poscit medendi Methodum: hinc enim lentus nimis & crassus Sanguis glutinosam valdè, ac vapidam, generat Bilem; quæ tandem Vasa obstruit biliaria, adeò
ut

ut Hepatis obstructio Morbi potius Effectus sit quàm Causa. — In hoc igitur Casu Emetica primò, Cathartica dein Aloetica & Mercurialia desiderantur; Attenuantia tunc saponacea, tartarea, volatilia, tandemque Chalybeata, necessaria sunt: cave tamen sis ne Chalybeata Medicamenta præpropere adhibeas, ante scilicet quàm fluxos reddideris Humores; aliter enim, pro Remedio, immedicabilis forsan Hepatis Scirrhus eveniet.

Atqui hic non possum quin laudem maximè *Tartarum regeneratum*, seu (ut dicitur) *Terram Tartari foliatam*, ut Remedium dissolvens maximè, non solùm ad Morbum regium aptissimùm, sed ad alios etiam quammultos. — Conflatum quippe ex Acido oleoso subtilissimo Aceti, & Sale fixo Alcalino, fit Sapo quidam mirabilis & penetrans maximè; qui omnibus quibuscumque Liquoribus miscetur promptissimè, vel in ipso *Alcohole Vini* facile dissolubilis: hinc omnia gummata, resinosa, oleosa, viscosa, sive Animalia, sive Vegetabilia, solvit optimè; imò Gummi Lac, Succinum, Myrrham, tenacissima certe Corpora. Unde lentos nimium & glutinosos Corporis Humores potentissimè dissolvit, & Vasorum Obstructiones reserat maximè. Quamvis autem tantas possidet Virtutes, vix ullam habet Acrimoniam: imò, quod mirabere forsan, æquè tutò Pleuriticis, ac ipsis Hydropicis, exhibetur. Eximius sanè Usus est Medicamentorum, quæ Pondere & Subtilitate crassos & lentos Humores comminuere possunt: longè tamen feliciores erunt Effectus Ope Saponis alicujus detergentis, qui glutinosum & pingue resolvat. — Honos sit Corpusculo humano! Utriculi sordidi non æquè

1737) *Constitutio Aeris, &c.* 145
æquè terfi & puri redduntur sola Aqua & Lapi-
lis, aut Globulis plumbeis, conquassatis, ac si
adhibeatur quoque smecticum aliquod Laxivium.
— Rectè quidem præcedere debet Usus Sapo-
nis alicujus Medicamentorum Exhibitionem, quæ
plurimo pollent Momento, ut glutinosos incidat
Humores eosque *suppos* reddat.

Latuit diu Sal hic, sive Sapo, nobilissimus in-
ter Strepitus Fucosque Alchemistarum, recondita
Farragine Titulorum celatus; utpote Sapo Sa-
pientium, prima Materia vegetabilis, Sulphur Na-
turæ vegetabile, Sal harmoniacum vegetabile, Mer-
curius Naturæ & Philosophorum, ut apud Lul-
ium, Parisinum, Guidonem, &c. invenies:
recentiores verò cum aptiore Nomine, Aceto
radicato scilicet, & Terra Tartari foliata insignie-
bant; semel etiam apud Lullium in Apertorio
quo Terra foliata vocatur. — Hujus autem
Compositio apud omnes consistit in Admixtione
intima, ad Saturitatem usque, Salis Tartari fixis-
simi cum Spiritu Vini philosophico; at nisi
Aceto destillato utere, (quod quidem est mysti-
cus etiam quasi Vini Spiritus) nunquam conficies
sal fluens ad Ignem, Cerae instar, in Spiritu
Vini rectificato dissolubile, ac in Modum Talci
lensens & foliatum: qui tamen apud eos ejus
sunt Characteres.

Sed quid in Sterquilinio Gemmas quæram,
imò apud illustrem Boerhaavium in Chemia
a, Modus præparandi & Virtutes hujus Salis
pertinèssimè traduntur: subjiciam verò & ipse;
quod multo minùs volatilis est quàm vulgò æsti-
matur: imò eousque Igni resistit, donec omne
è Acidum evaporetur tandem, Sale solùm alca-
li fixo manente. — Ad lenem autem Ignem
liqua-

liquatus pulchriores & splendidiore (argenteas quasi) exhibet Laminas; diminuta tamen aliquantulum medicata Virtute; nempe inde ad igneam Alkali Naturam accedit propius, quod tamen mox corrigitur Acidi vegetabilis pauxillo affuso.

Ad omnes Viscerum Obstructiones, & lentos nimium Humores, hoc Sal mirandæ planè Virtutis esse probavi millies: nam id utique assidue per Annos fere viginti exhibui feliciter. Nec tantum ad hæc valet maximè Sal hoc nobilissimum, sed & vel ipsum Lixivium ex Sale Tartari fixo & Aceto acri confectum detergit, resolvit & aperit potenter: etiam ipsi Veteres, ut * Caius Plinius refert, "Cineres Sarmentorum ex Aceto biberunt ad Vitia Splenis." — Profectò Lixivium ex Sale Tartari & Aceto penetrantius est multo, quàm ex eodem cum Succo Limonum, ob † *Mucilaginis* Copiam, quæ Limonibus inest. — Sed ex Aceto acerrimo & Sale Cornu Cervi *volatili* conficitur Lixivium longè penetrantius, in Febre lenta, ac intermittenti rebeli, pluribus etiam in Morbis, summæ certè Virtutis. — Hic porro dicam in Transcursu, quod Acetum Sali volatili animali, propter Oleum nempe combustum foetidissimo, affusum, cumque eo digestum & destillatum dein, omnem prorsus Fœtorem delet, imò gratissimum conciliat Odorem. Hoc novit olim immensæ Eruditionis, & pro Ævo quo vixit, stupendus planè Vir, Rogerus Bacon, dum Spiritum Capillorum rancidum Aceto depurat; nec minùs fortè

Lullius

* *Vid. Libri xxiii. Proëm.*

† — *infra Tractat. de Morbo Colico, &c.*

Lullius in Præparatione Salis Harmoniac. Vegetabilis. Vid. Testament. novissimum.

Acetum utique plurimi æstimarunt Veteres :
 “ Nam quamvis refrigerandi Vim habet, habet
 “ tamen & dissipandi ; hæc Il Celsus ; ideo-
 “ quæ ꝑ Plinius dixit optimè, “ Vini Vitium
 “ (Acetum scilicet) transit in Remedia.” — Sed
 de hoc fortè plus satis.

DISSERTATIO de Febris lentis
Nervosis.

Febris lentæ. Mentio passim vel apud Celsum occurrit; Febris utique *nervosa* minùs latinè sonat: quoniam verò ea Voce, in isto Sensu, Medici recentiores utuntur sæpissimè, istam retinui; nam ut Geometræ, Musici, Grammatici etiam, more quodam loquuntur suo, quidni & Medicis liceat? Veniam certè dabit, vel maximus dicendi Magister, * Tullius. — De Verbo tamen parùm sollicitus, de Re magis laboro: nam cùm hæc Februm Species longè frequentior nuperis Annis (apud nos saltem) quàm alia quælibet grassata sit, Operæ Pretium duxi super hac pauca differere.

Lenta, adeò & *nervosa* Febris lento quodam in-
vadit Gressu, at firmo nimis : hac quippe cor-
N
repti

11 *Lib. v. cap. 27.*

† Vid. Lib. xxiii. sub Finem.
* Cicero Lib. iii. de Officiis.

* Cicer. Lib. iii. de Finibus, sub Initium.

repti de levi vagoque Horrore, incerto quodam
& errante Calore intercurrente subinde; de Las-
situdine porrò Membrisque quasi fatigatis que-
runtur quidem, dum obambulant interim, of-
citantes tamen & torpidi. Accedunt mox Præ-
cordiorum Oppressio, Nausea, Gravedo Capitis,
astricta Tempora, aut Vertigo quædam. Pulsus
equidem frequens est semper, at debilis plerum-
que, ac inordinatus, Calor autem haud insignis
excitatur unquam; at sæpe, dum Volæ Manuum
uruntur, extrema frigescunt; dum Caput ardet,
algent Pedes. Obrepit indies Malum, jamque
loqui, aut moveri, piget, ac, vel inopinantes
Lectò affixi, vix quo se habent modo exponere
valent, aut Sopore nimio detenti, aut Vigiliis
mirè anxii & fere perpetui. Nihil poscunt in-
terea prorsus, ne vel Potum aliquem. Jam
Tendinum Subsultus adest, tremunt Manus, tre-
mit Lingua, quæ, Muco subalbido obducta,
haud multum fere inarescit, nisi media solum in
Parte, ubi fusca est valdè & arida. Tandem &
aliena murmurant subinde & desipientia, furens
tamen abest Insania. Tenuem plerumque red-
dunt Urinam, vapidi instar Vini, aut Cerevisiæ
luridam, aliquando limpidam, haud rarò etiam
subnigram, subinde paulo crassiorem, inspersa
quasi Farina. Breves, inæquales & parum con-
stantes habent Sudores, sæpe frigidulos & gluti-
nosos, sæpe profusos maximè: &, paulo ante
Mortem, non rarò gelidos cum Pulsu exili ad-
modum & formicante. Stragula contrectant in-
terim, & inanes quasdam Imaginesprehendere
tentant. Jamque Vox Faucibus hærens, Ungues
Digitique lividi, Facies cadaverosa, perpetua fere

ac frigida Suspiria, certissimam instare Mortem denunciant.

En hujus Febris dira Facies! quam nervosam idè nominarunt, quòd Nervos potissimùm afficere videatur; lentam verò, quòd ad Diem vicissimum primum, & ultra sæpe, perduret.

Pestifera semper est, ubi *Aphthæ* nigræ, *Petechiæ* fuscae, lividæ, atræ, aut *Vibices* quasi, apparent; præsertim si accedit *Alvus* cita, plumbea, nigra, colliquans, aut *Sudores* oleosi. — Ubi *Pustulis*, *Papulis*, aut *Maculis*, cutim deturpantibus, Febris lenta stipatur, contagiosa est ut plurimum: cùm verò *Exanthemata* mali sunt Moris, vulgò audit maligna. *Papulæ*, rubræ, floridæ, copiosæ, aut plurimæ *Pustulæ* *miliares* turgidæ, Statu Morbi erumpentes, bona præfagiunt: præcipuè si accedunt *Sputa* liberalia continua, aut multæ crassæ subsidentes *Urinæ*. Juvat & tunc Temporis sæpe lenis *Diarrhæa*, blandus persæpe juvat, per omnia Membra diffusus, æqualis tepidusque *Sudor*: salutaris nonnunquam erumpit *Parotis*: profunt non rarò *Aphthæ* albidæ, benignæ. Convalescentes frequentissimè surdescunt, ac sæpe habent *Apostemata* in *Meatu Aurium* salutifera.

Ex Observatione Medicorum, cum Veterum, tum recentiorum, constat sanè, quòd putridæ lentæque Febres grassantur maximè, cùm humida nimis crassaque Aeris Temperies perstat diu: idque potissimùm, si concurrat etiam *Calor* insolitus. — Quam pluvia fuit, quàm squalida Tempestas, nuperis Annis nemo non norit; & totum Annum 1734. & 1735. inter perpetuas Pluvias & continua quasi Diluvia contrivimus: nec lætis nos solitisque Radiis lustravit Sol æsti.

Vus, nec purgavit Aerem hyemale Gelu; depluit Æstate tota, depluit & Hyeme, dum Aer interrim, mutata quasi prorsus Natura Rerum, fuit mirè quidem tepidus, at humidus maximè. Hinc lentæ & nervosæ Febres, ac remittentes & intermittentes, fuere frequentissimæ: hinc porrò Loca uliginosa infestant semper. Atque illi præcipuè his corripuntur, qui aut Natura, aut Casu, sunt imbecilliores aut ex Mœrore magno Vim Animi fractam habent, aut qui pravo & crudo utuntur Victu, quales in Carceribus sæpè videmus, vel qui Cucumeres & Melones ingurgitare solent. Omnes autem hæ Causæ Vim Fibrarum enervant, Lentorem inferunt Humoribus, & Perspirationem inhibent maximè.

Atqui Lentor iste longè differre videtur à Glutine Sanguinis inflammati, quod nimio Motu Humoribus & valida Fibrarum Vi producitur: hoc quippe Crassamento Sanguinis inhæret, eumque detractum quasi Coriò obtegit; iste verò Lymphæ inest maximè. — Confer Cruorem Pleuriticorum, Rheumaticorum, aut Febre ardente laborantium, cum illorum Sanguine, qui Febre lenta nervosa correpti sunt, maximum utique videbis Discrimen. — Hic dum emittitur lividus apparet, iste rutilans, hic frigescens parum Crassamenti habet, multum verò Serum obscurum & sæpe turbidum; iste Crassamentum plurimum coriaceum, Serum verò minimum.

Maximam sanè Differentiam Apoplexiam inter sanguineam & pituitosam rectissimè ponunt Medici: haud minor utique videtur inter Febrem inflammatoriam & lentam nervosam. — Prior semper habet Circuitum Sanguinis rapidum valde & fortem, magnum hinc Attritum, ac
vehe-

vehementem inde Calorem, Urinam quoque im-
pensè rubram, unde Sanguis tandem conden-
satur maximè; ab aucto namque Humorum
Motu & valida Vasculorum Oscillatione Globuli
rubri, sanguinei, (præcipuæ Partes Sanguinis
Calorem foventes) Numero ac Densitate augen-
tur, ob summum Momentum, quo compingun-
tur Laticis vitalis Principia. — Hæc quoque
accidit subitò robustissimis, & gravissimos sæpe
infligit Dolores; eos verò aut jugulat citò, aut
relinquit: porrò viget maximè in siccis & fere-
nis Tempestatibus.

In posteriore, Morbus lentè admodum inva-
dit, Vis Solidorum debilitatur maximè, Pulsus
adeft languidus, etsi frequens, nec acris unquam
oritur Calor consistens; si quis accidit, subito
subinde Frigore excipitur: tenues plerumque &
pallidæ Urinæ fractas Naturæ Vires & invalidam
Humorum Agitationem monstrant. — In hoc
adeò Statu, propter Defectum Motus idonei Flui-
dorum, ac Solidorum Inertiam, Globuli Sangu-
inis rubri dissolvuntur ex facili. — Ita non
dolent hac Febre correpti, ut torpidi quasi &
insensiles jaceant, ne vel acriora *Epispastica* sen-
tientes. — Rarò spargitur hic Morbus, nisi
per humidam atque tepidam *Atmosphæræ* Consti-
tutionem, raròque corripuntur robusti & alacres.

Sed juvat hæc agitare paulò altiùs, ut videa-
mus quid in Febribus Natura faciat, aut ferat:
idque Exemplo Febris intermittentis regularis,
cujus Causa haud Dubio Sanguinis est nimia
Visciditas; quæ ingruente Paroxysmo in Vasculis
capillaribus hæret, atque Horrorem, Rigorem,
Artuum Pallorem & Unguium Livorem produ-
cit: omnia sanè Signa haud dubia obstructi San-
guinis!

guinis! — Jam si Viribus pollet idoneis Natura, Febre ipsa utitur ad Remedium: nam si valida Vis infit Fibris, & non nimia adsit Tenacitas Humorum, accenditur protinus Febris, qua vehementer agitantur brevique comminuuntur crassi Humores, & sic apti redduntur ad permeandum minimos Vasculorum Ramusculos; ita mox omnis expeditur Obstructio, ac consequente Sudore, brevis saltem sequitur Integritas. — Atqui ubi vehemens Vasorum Impetus maximo propellit Momento viscidos admodum, & ægrè cedentes Humores, tantus oritur Attritus atque Calor, ut ardens sæpe, ac continua, excitetur Febris, aut Inflammationes graves: præcipuè ubi magna quoque adsit Acrimonia, aut præposterè exhibentur Medicamenta stimulantia, quæ Sanguinis Effervescentiam jam nimiam incitant. — E contra ubi Vis Vitæ, quacunque de Causa, justo infirmior, haud satis validè protrudit Liquida, hæret usque ad extrema Vasorum impactus Lentor, qui auctus indies Circuitum tandem Sanguinis perdit omnino: nam qui à Febre intermittente pereunt, fere semper moriuntur dum Rigores & Horrores urgent; ab Impotentia scilicet Cordis & Vasorum superandi Resistentiam morbidi Lentoris. His Sanguinem mittere perinde est ac si trucidentur, illis necessarium omnino. — Intelligitur hinc facilè, cur Febres sæpe Typum mutant, omnesque fere, diu durantes, Naturam tandem induunt Febris *nervosæ*; nimirum infirmato valde Fibrarum *Elatere*, & conspissatis nimium Humoribus.

Ponamus jam Lentorem residere solùm in *serosis* Arteriolis, quæ purissimam Seri Partem, sub Nomine Lymphæ, aut Succi *nervosi*, secer-
nere

nere debet: debilitata concurrente *Systasi* Fibra-
rum oritur Febris, dicta, lenta, nervosa. Dum
enim in plurimis minimisque his Tubalis inhæ-
rescit obstruens Lentor, plus tenuissimi Laticis
per patentes reliquos urgetur: (nam si omnes
omninò obstructi sint, Mors instaret protinùs)
inæquales hinc incertique Pulsus, Calores, Sudo-
res, sequuntur. Porro quo diutiùs in *Arteriolis*
his contortu plicatis (si mavis Glandulis) mo-
rantur lenti Humores, eo acriores fiant necesse
est, donec in Liquamen quasi saniosum abeunt:
quod dum tandem absorbet Sanguis, totam id-
demum ejus contaminat Massam. Permulta sic
nascitur Acrimonia, ob Debilitatem tamen Fi-
brarum, Nervorumque Torporem, haud rapidus
excitatur Sanguinis Cursus, aut vehemens inde
Calor, Lentor tamen exin augetur indies.

Sic se forsan Res habet; cum ex recitatis
suprà Causis Fibrae Vasque Corporis infir-
mentur, Sanguinisque retardetur Motus, nec
subiguntur bene Humores, nec probè miscentur:
unde tandem producit Lentor, præcipuè in
Vasculis minimis, ubi tenuissimi fluere debent
Liquores. Nascitur hinc Obstructio in Arteriis
Serosis, ultimisque Cerebri Arteriis, inde impe-
dita Lymphæ Secretio, ac quod pejus est, succi
nervosi Inopia: deficit hinc Officio nervosa Pro-
pago, at quæ non inde mala?

Qui secum reputat quanto sanè Molimine
Cerebrum effecit Natura, haud ibit Inficias Suc-
cum nervosum omninò esse necessarium *OEcono-*
miae Animalis; quo sine profectò Nervi Vim
perdunt prorsùs, & Musculi proinde ab his
pendentes: ut videre est potissimùm in Musculis
Motibus *involuntariis* inservientibus, ubi sive

obstruantur, five comprimantur, *Nervi parii vagi & intercostalis*, five in Cerebro horum Origines, resolvitur illicò omnis fermè Actio vitalis; ac ne vel acerrima meri Animi Contentio, seu ut dicitur *Volitio*, ad Motum hunc restituendum valet Hilum. — Requiritur ideò ad Motum muscularem corporeum hoc Medium; at seu animat, seu irrigat, Nervos, non nostri est hic dicere: id saltem apparet, quod dum ex Lege Naturæ in Nervos Motibus *involuntariis* ministrantes influat perpetim, Actio Cordis, Ventriculi, Intestinorum, &c. rectissimè peragitur, five vult; five non vult, Animus.

Quod verò in Febribus lentis *nervosis* insignis adest Obstructio Nervorum liquidò patet; quoniam omnes Corporis Sensus depravantur maximè, vix vident Oculis apertis, perditur Olfactus, perditur Auditus, vix etiam sapidissima gustant: torpent adeò Membra, ut parum admodùm sentiscant vel acerrima *Vesicatoria*, obstructo nimis Sensationis Medio. — Subluridus verò Cutis Color, frequentes Rigores, Torpores, extrema subfrigida, Ulcuscula pallida & desiccantia subito, etiamsi acerbis irritata Stimulis, maximùm Lentorem, ac impeditum Humorum Cursum, per minutissima Corporis Vascula denotant.

Præterea cùm parcior fiat Secretio Liquidi nervosi, Actio Solidorum in contenta Fluida debilitatur, adeò ut hac quoque de Causa Lentor augeatur indies, unde major fit assiduè in Vasculis *serosis*, five *lymphaticis*, Obstructio. Atqui parcius hinc refunditur Lympha diluens Cruori, qui crassior deinceps & acrior evadit, minùsque etiam aptus ad permeandum Vascula minima: Stagnat ideò in extremis *Arteriolis*, & Maculas nigras, livi-

lividas, fuscas, sæpe & Vibices, extrà; intùs verò Gangrænas producit, aut, stagnando diutius, in putrem tandem abit Saniem.

Sufficiant, ac etiam supersint forsan, quæ de *nervosæ* Febris Natura dixi; id saltem apparet, quòd ut omnis fere Febris varii possunt esse Gradus, in Ratione scilicet composita Vis Solidorum, Status Humorum, & Acrimonix Sanguinis, sic quoque & hujus, de qua agitur, maximè: fortè ne quidem in duobus Hominibus omninò similes. Nulla igitur certa & stabilita medendi Regula determinari potest, (hic enim desideratur maximè Medici Ingenium, qui Ægrotis assideat) quæ verò in Genere profit, paucis absolvam.

Si qua unquam in Febribus hujuscemodi mittendus est Sanguis, id quidem incunte solùm Morbo, & parca utique Manu, agendum est: ardente namque Febre laborantes facilius multo sedecim Sanguinis Uncias amittunt quàm his correpti Selibram. — Ægri Vires & Pulsus Modum indicant. — Tutiùs longè detrahitur Cucurbitulis scarificatis, meliùsque multo hoc Modo levatur Caput, ac vel ipsa plerumque Pectoris Oppressio; nec si repetatur officit, quod de Venæ Sectione haud semper dicendum est: imò sæpe, vel in ipso Morbi Statu, ubi aut Delirium, aut Coma, graviter urgeat, necessarium est prorsùs.

Pone Aurem utramque, effuso Cruore, *Vesicatorium* acre applicetur, præsertim urgente Capitis Dolore, aut Vertigine. — Post paucas dein Horas exhibeatur lene *Emeticum*, quo & pituitosa Ventriculi Saburra, ac biliosa Colluvies, ejiciatur: hoc quoque efficitur, ut universum Vasculorum *Systema* agitetur validè & concutiat, atque

atque inde expellatur inhærens Lentor. — Ideo autem, Horis aliquot ante Vomitus, *Vesicatoria* admoveo, ut, exteriora Capitis ac Cervices irritando, plus Sanguinis per externas Carotides eliciatur, minùsque adigatur Lentoris ad intima Cerebri Vascula Actione Vomitionis. — Quid possunt *Epispastica* pone Aures ad Cerebrum levandum videmus quotidie, præcipuè in Puerulis, Distentione Nervorum aut Comate laborantibus, ubi scilicet *Ulcuscula* desudantia pone Aures desiccantur subito; his enim *Vesicantia* applicata Humores extrahunt iterum, Morbumque discutunt protinùs.

Si Alvus post Vomitus non responderet, leni injecto *Enemate* ducenda est, idque etiam in posterum tertio quoque Die: ubi enim indurata Stercora in Intestinis hærent, *Oeconomiam* animalem mille Modis turbant; maximè si his infarciatur Rectum, imam premunt *Aortam*, & liberum Sanguinis Descensum per *Ilicas* Arterias impediunt, unde plus justo ad Cerebrum ruit. Adde quod *Enemata* è Lacte saccharato potissimùm, Tepore emolliente ima Viscera foveant, & plus Sanguinis alliciunt eodem, unde Urinam quoque optimè movent.

Nunquam quidem non juvant *Epispastica*, per totum Morbi Decursum, ita ut desiccantibus priùs applicatis admoveantur alia: his enim Vasculorum Oscillatio incitatur, subtilissimo etiam Sale lentos incidant Humores, eosque tandem exprimunt. Vellem semper ut ingruente Febre, præsertim ubi Caput graviter petit, applicetur derafo Occipiti *Vesicatorium*: nam eodem fere Modo, quo pone Aures agit, nec tamen ita asperos excitat Dolores, dum ad Delirium præcaven-

cavendum interim facit maximè. — Sanè ita non cruciant in hoc Morbo *Epispastica*, ut, gravem ob Stuporem, vix sentiantur: imò quo magis inflammantur, ac dolent, eo plerumque major Spes Salutis effulget.

Quod ab extrà Vesicantibus molitum est, id intùs quoque Medicamentis idoneis tentandum est. Profunt maximè Attenuantia dicta, & quæ blandè torpidos excitant Nervorum Ramusculos; laudo potissimùm Cinnabar & lenia *Alexipharmaca*, *Cephalica*, qualia sunt Lap. Contrayerv. Confect. Raleigh. Sal. Succin. — C. C. Sp. Lavend. C. Spir. volat. oleos. & Camphora præcipuè, quæ & ipsa quasi Sal quoddam *volatile* oleosum est: ex Salibus enim penetrantissimis, subtilissimo Sulphure involutis, constans minutissima Corporis Vascula permeat crassamque digerit Lympham, ac lentos dissolvit Humores: salutiferos hoc Modo excitat Sudores, ac (Galieno, aut Silphio. adjecto) Somnum sæpe vel Opio feliciùs conciliat, eoque potentiùs Deliria fugat.

Nihil sanè utilius est, in hac Febre, quàm venas movere Sudores per totum Corpus; hoc Modo enim brevi discutitur Morbus, aut paulo pòst in remittentem, aut intermittentem, mutatur. Debet autem per omnia Membra æqualiter diffundi tepidus Sudor; sive enim brevis est admodùm, aut frigidus, aut circa Caput tantùm & Cervices, mali Morbi Signum est: per Sudores autem mox inhorrescere pestiferum est, blandus autem & æqualis Sudor Spiritus recreat.

Sed ubi *Epispastica*, ac Attenuantia, adhibentur,

tur, diluendum est affatim Potione tenuissima, miti, at detergente leniter; Sero Lactis nempe Canariensi, aut Xeresano, dilutiore, Decocto Lusitanic. — Eryngii, Infusione Salviæ, &c. ut crassiores nimirum eluantur Sales, ac debitus subministratur Sanguini Latex, qui aliter, perpetua liquidissimi Exhalatione, in merum penè Gluten brevi abiret. — At rarò admodum convenit Aqua pura, frigida, quam tantoperè suadent nonnulli: haud multò facilius namque cum Sanguine miscetur, quàm cum Aqua Oleum, nisi mediante *Saccharo*, aut Sale aliquo *essentiali* Plantarum. Vidi aliquoties & Febre ardente, imò & *nervosa* etiam Febre, laborantes, meram Aquam perpotantes frigidam, qui mox per Urinas eam reddidere limpidam omninò, & nullo fere Modo mutatam — nã magno suo cum Damno.

Septimo, nono, vel undécimo, Febris Die, nonnunquam & decimo quarto, Papulæ rubræ, aut Pustulæ *miliares*, aliave *Exanthemata*, erumpunt sæpe, morbumque levant apprimè; præcipue si florida hæc sunt, ac illæ vividæ & turgidæ. — Quam maximè tunc cavendum est à Frigore, & lenia subinde porrigenda sunt *Cardiaca*, quæ Naturam adjuvent ad lentos acresque Humores exterminandos, qui, in ultimis *Arteriis* cutaneis hærentes, Pustulas has formant. *Exanthemata* fusca, livida, nigra, pestiferum Morbum indicant, Sanguinemque corruptum maximè, ac in Saniem fere conversum: in hoc Statu profectò Sanguis ita dissolvitur, ut Alvi Dejectiones sanguinolentæ sint, ac saniosæ, sæpissimè; imò Cruor è Venis emissus vix, ac
ne

ne vix quidem, in Coagulum abit, notante doctissimo *Listero*.

In Casu tam deplorando mox confugiendum est ad *Alexipharmaca* astringentia, acida, qualia sint *China Chinæ* cum Radice *Serpentariæ Virginianæ*, Elixir vitrioli *Mynsichti*, Tinctura *Rosarum*, Vinum rubrum ustulatum (ut dicitur) &c. hæc enim ad conservandam Vim Fibrarum & *Crasin* Sanguinis apta sunt maximè. — Valet plurimum ad *Gangrænas* sistendas Cortex *Peruvianus*, ut nuperis inventum est Experimentis, eumque ad Humorum Putredinem arcendam cum *Alexipharmacis* & Acidis conjunctum utilissimum esse certò comperi. — Vix fortè in tali Casu nobile magis datur *Αλεξητήριον*, quàm Vinum austereum cum Aromaticis coctum: tutiùs enim & efficacius Vires erigit, quàm Spiritus Vini ardentes, quantumvis *Pharmacis* aromaticis imbuti, & Nominine *Aquarum cardiacarum* nobilitati.

Jusculis interim tenuioribus, *Panatellis*, *Gelatinis* de Sago, Cornu Cervi, &c. nutriendus est Æger, sæpe quidem, at paulatim, in tanto nimirum Periculo vix ulla alia Spes est, quàm ut, Impetum Morbi trahendo, aliquis effugiet, porrigaturque in id Tempus, quod Curationi Locum præstet.

In Statu Morbi porrò, aut paulo pòst, *Aphthæ* non rarò imas Fauces & Os totum occupant; pessimæ utique si nigræ, neque Periculo vacant si supra Modum albidæ! Modò ex imo Guttore ascendere videntur, modò per totum Canalem alimentarium descendunt, ac Singultum, *Diarrhæam*, aut *Dysenteriam*, excitant: quicquid est difficillimam sane *Crisin* plerumque denunciant, potissimùm si *Dysenteria* & Singultus accidunt.

Melius

Melius est longè cùm *Salivatio* copiosa oritur ; sæpe profectò hoc modo solvitur Febris, Lentore morboſo nempe per Glandulas Salivofas exantlato. — Ubi *Aphthæ* oriuntur, creberrimè gargarizandum est emollientibus & detergentibus, ex Ficu, Mulſo, Decocto Raparum, &c. dandum verò interdum est Rhabarbarum, maximè ſi Alvus cita & torminoſa urget, adjecto astringente aliquo aromatico cum abſorbentibus. Poſt omnem autem Gargarizationem in Ore contineat paululùm, & mox deglutiat lentè, tenuem è Seminibus Pſyllii & Cydoniorum *Mucilaginem*, Syrupo Mororum aut Rubi Idæi admixto : fovet hæc optimè, ac ſanat Ulcuſcula.

Haud rarò Pituita tenax admodùm totas adeò opplet Fauces, ut Strangulationem penè minitetur : hic utique nihil magis opportunum eſt, quàm levi *Emetico* Vomitus ſolicitare leniter, idque ſanè quocunque Tempore Morbi. Mirum eſt quantum Levamen hoc affert Aegrotis, quàm immenſa Viſ glutinoſæ Colluviei, Albumen Ovorum referentis, ac sæpe vel eo multo craſſioris, ejicitur : imò mox sæpe *Aphthæ*, *Coma*, *Nauſea*, *Singultus*, Linguae terrifica *Nigrities*, faceſſunt, ut obſervavit olim diligentiffimus *Sydenhamius*; quod quoque Ego vidi multoties.

Nec minus utilis eſt lenis Alvi Purgatio ſub Morbi Finem, interpoſitis ſubinde *Cardiacis* & *Paregoricis*; hæc enim evacuat putridam Morbidamque Colluviem, per Arterias *meſeraicas* in Intestina depoſitam, *Criſinque* Naturæ, utcunque imperfectam, promovet : imò facit sæpe, ut Febris, quæ huc uſque nullum certum ſervabat Ordinem, remittentis planè, aut intermittentis,

Typum

Typum induat, Locumque præbeat Medicamentis idoneis. — Atqui ita non *Diarrhœam*, aut *Dysenteriam*, quas tantoperè timent nonnulli, inducit, ut hoc Modo præcaveantur optimè. Fœda namque Eluvies, diutiùs in Visceribus restitendo, magis fit acris, magisque, assidue, & eorum Tunicas extimulat maximè; imò eas corrodit tandem; ac vel funestam parit *Diarrhœam*, vel *Dysenteriam*, horrendam: partim insuper per Venas Lacteas resorpta diarras iterum Turbas in Sanguine movet. Ut his ergò occurram Malis, Mihi in Usu est frequentem, ac modicam, Rhabarbari Dosis exhibere, alternis saltem Diebus: nimium intereà Alvi Motum (si Opus est) astringentibus Aromaticis, atque *Anodynis*, rapprimere solco.

OPUSCULUM
DE
MORBO COLICO

DAMNOSIORUM,

eoque maximè Epidemico,

Anno MDCCXXIV.

O

PRÆ.

OF THE

MORRIS COLLEGE

LIBRARY

NEW YORK

1885

PRÆSTANTISSIMO VIRO,
JACOBO JURIN, M. D.

Collegii Medicorum LONDINENSIS

ET

REGIÆ SOCIETATIS
Socio,

JOANNES HUXHAM, M. D.
S. P. D.

TUO potissimum Hortatu, Vir clarissime!
Opus suscepi meteorologicum; quod jam
perfeci: Tibi adeò debetur, si quid inde sit
Utilitatis Publico. — Officia certè in Me plura
contulisti olim, quorum Ego semper memor,
hoc Tibi Opusculum, grati Animi Monimen-
tum, dedico.

Valeas diu multumque

Id. NOVEMB.
MDCCXXXVIII.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 FIFTH AVENUE
NEW YORK

D E

MORBO COLICO

DAMNONIORUM, &c.

INEUNTE Autumno, Anno MDCCXXIV.
Damnonios undique afflixit Morbus maximè
Epidemicus, inter Popellum præcipuè læviens,
& in Hos, quibus minùs lauta fuerat Ratio vi-
vendi. Hujus & Historiam & Medicinam per-
scribere haud erit forsan prorsùs inutile; quoniam
etsi non ita vehementer & multo minùs popula-
tim, tamen omni fere Autumno hanc Regionem
plùs, minùsve, infestat.

Exorsus est hic Morbus ab Angore Ventriculi
summo cum Dolore in *Epigastrio* vehemente,
Pulsu debili & inæquali, Sudore frigidiusculo:
Lingua interim Muco erat obducta subviridi,
aut fusco, Halitus autem fœtidissimus. Subse-
cutus est Vomitus enormis, ut plurimùm Bilis
viridissimæ, nonnunquam atræ, magna semper
Pituitæ, quam maximè acidæ ac valde tenacis,
comitante Copia: imò Colluvies, rejecta Vomitu,
sæpe adeò acris erat, ut, Gulam Faucesque ex-
coriando, foret inde sanguinolenta, ac Dolorem
inter deglutendum excitaret. Hisce per Diem
unam, alteramve, persistentibus, accessit Alvus
adstricta admodùm, nec Catharticis, *Spasmodicis*,
nec

nec acerrimis Clysteribus respondens: his quippe sine Flatu aut Stercore rejectis, illis Vomitu.

Imminuta tunc paululum Vomitione descendebat Dolor, at Umbilici Regionem atrocissimè torquebat, Lumbos Spinamque Dorsi crudeliter; ita ut Paroxysmo *nephritico* Ægrum laborare crederes, eoque magis cum & jam etiam urgeret Urinæ suppressio, at perpetua mingendi Cupiditas imò vexabat sæpiissimè molesti cujusdam Ponderis in *Perinao* Sensus, velut incumbentis Calculi. ——— Talem in Colicis Urinæ difficultatem jamdudum notavit Aretæus Cappadox, Capit. de Colicis: Νεφροὶ καὶ Κύστις συμπαθεῖα Πόνω καὶ Ισχυρίῃ τετέλει ἄλλα αὐτ' ἄλλων. Sic Hippocrates Περί ῥροισι σραγυτρωδεις, & νεφρικοι, ἄλλα τετέλεισιν αὐτ' ἄλλων ἄλλα, Epidemic. Lib. I. Sect. II.

Urina verò erat Lixiviæ instar, quæ mucosa, rubra, non rarò subviridia, deponebat permagna Quantitate. Abdomen plerumque durissimum & maximè tensum Ægrotos, ne rumperetur scilicet, anxios sollicitavit: erant è contra quibus, *Spasmo* maximè contractus, vix ullam Sui Formam reliquisset Venter: hoc autem rarius. Sæpe Dolor fixus, vehemens, urens in dextro *Hypochondrio*, ubi etiam & Tumor & Durities. In *Epigastrii* Regione magna sæpe & molesta Pulsatio. Quandounque Alvus vel proprio irritata Onere (quod rarò admodum) vel Medicamento fuit, durissima *Σκυβαλα* ex viridi nigra, globosa, parva Ovium Stercora referentia, reddidit; post duas dein, tresve, Dejectiones, virida, vel nigra, nonnunquam Cruore mista, Tenesmum excitantia permolestum: at Alvus substitit protinùs, quæ post Horas aliquot Arte iterùm irritata tales

tales rursùm Globulos, læves, durissimos, de-
jiciebat.

Hæc fuit prima Morbi Facies; at nec dum
desæviit Tragœdia, nec hic Finis Malorum:
quamvis enim cessaverint paululùm dira Ventris
Tormenta, relicta verò Cutis Teneritudine sum-
ma, Tactus fere impatientis, jam tamen auge-
tur Dolor per totam Spinam, summos Humeros
adusque immaniter excrucians, inter Omoplatas
potissimùm; brevique inde Brachia invadens
Juncturis præcipuè defixus hærebat, Motumque
destruebat Manuum prorsus. — Nec Femo-
ribus, nec Cruribus, contigit Sors multo melior;
utpote quæ torqueret Cruciatus acerrimus, me-
diis quasi Ossibus inhærens, Lue veluti venerea
affectis: rarissimè autem Artuum vel Rubor, vel
Tumor, ullus.

Dum ab Intestinis ad Membra Exitum sibi
pararet morbida Materia, Pulsus vibrabat for-
tior, atque febricitabant leviter Ægroti. Non-
nulli etiam, hoc Morbi Statu, delirabant, cujus
constans fere Indicium fuit Urina aliquanto lim-
pida; & (quod notatu dignum) si per totum
Morbi Decursum Urinam pallidam sine Sedi-
mento reddidissent, hos subitò corripuit vel
Distentio Nervorum, vel Delirium, aut Ma-
nuum Paralysis: nunc cum, nunc sine, Dolor.

Cum jam Morbus occupaverat Artus, Sudor
multus foetidus, acidum spirans, Dolores leni-
vit; &, si quis Dolor Ventris etiamnum perman-
serit, eo diffuente evanuit. Aliqui Sudore lon-
go, maximo, digesti Motum Usunque Manuum
amifere penitus; Tactu solùm manente: Dolo-
ris miserum solamen Paralysis! vix ullum autem
memini, hoc Morbo laborantem, Pedibus paral-

Ictice captum. — Aliquando cum Sudore benigno plurimæ eruperunt Pustulæ rubræ, prurientes, ac sæpe molestissimè urentes, eæque per totum fere Corpus; quo nihil auspiciatius: nam his erumpentibus & Dolor *rheumaticus* & colicus se mox subduxere. — Hic fuit equidem optimus Morbi Exitus; at frequentius longè colicum Dolorem excipiens *Rheumatismus*, *Rheumatismum* Viscerum Tormenta, alterna Vice, miseros diu mactabant, Morbo nunc ad Artus, nunc in Intestina transiæto.

Interdum Cruciatus per Dies aliquot cessantes æquè vehementer recrudescebant; præsertim ex levissimo Frigore suscepto, vel *Cerevisia*, vel Vino Pomorum hausto. Icterus nonnunquam erumpens Colicem hanc pro Tempore solvit, quo recedente mox redibant Dolores. — In uno & altero Casu verus permanens Icterus hunc Morbum absolvit prorsus, manente tantùm quadam Artuum Molestia.

Tametsi Dolores colici *rheumaticos* sæpius præcederent: frequenter autem Artus primùm adoriæbatur Morbus, dein, *Metastasi* facta, Stomachum & Intestina, more descripto. Cauponem quendam novi robustum miro planè Modo correptum, cujus Brachia Manusque resoluta vix ullum Motum, ne vel levissimum Pondus movendi Potentiam, retinebant; nullo tamen præcedente Morbi Symptomate, nec per Diem unum, alterumve, insequente ullo, nisi quod solito fuerat languidior: paulò post autem Vomitus Ventrisque Dolor consequebantur, tandem etiam Membra paralytica Angor *rheumaticus* torfit.

Aliqui,

Aliqui, at perpauca, diu multumque hoc Morbo afflicti, Insultibus demum epilepticis correpti, Fato succubuerunt: sed, ut vera dicam, seu Morbi Frequentiam, seu Durationem, seu Vehementiam denique, respicio, miror valde tam paucas Hosti huic diro occubuisse Victimam.

Crudelissime saevit hic Morbus fremente Aquilone, quod & de Variolis, tunc Temporis, grassantibus observavi.

Quibus fusiolem dederat Alvum Natura longe minus ab hoc *Epidemico* passi sunt, quam quibus astrictam: hinc forte Ratio petenda est cur Pueros (quos cita plerumque Alvus exercet) haud aequè violenter ac Adultos excruciat.

Perduravit Colica hæc *epidemica* ab Autumno ad Ver sequens; Vere autem vigente sensim abiit.

En hujus brevem, sed accuratam, Morbi Historiam: qui usque adeo inter Vulgum grassatus est, ut Anno MDCCXXIV. omnes fere Plebeculae Familias invaserit. Quid quod in una eademque Domo quinque vel sex ex hoc Morbo decumbentes numeravi saepissime; atque merculè vix credo Colicum Morbum tam *epidemicum* extitisse antehac unquam: nisi forte quem Paulus Aegineta Lib. iii. Cap. 43. sub Finem memorat: qui & nostro, quod ad quædam saltem Symptomata, haud fuit longè absimilis.—Hic ideo istius Descriptionem ex Paulo proponam: “ Ἀρξάμεναι μὲν τοῦ Πάθους ἀπὸ τῶν κατὰ
“ τὴν Ἰταλίαν Χωρίων καὶ ἐν ἄλλοις δὲ πολλοῖς τῆς τῶν
“ Ῥωμαίων Πολιτείας, &c. i. e. quum Morbus
“ quidem ille coepisset (Colica scilicet ab acris
“ & vellicantibus Humoribus) à finitimis Italiæ
“ Regio-

“ Regionibus, & alia pleraque Loca Romani
 “ Imperii, instar pestiferæ cujusdam Contagio-
 “ nis peragrasset; unde non paucis quidem in
 “ Morbum Comitiale, aliis verò in Membro-
 “ rum Resolutionem, superstitite tamen & incolu-
 “ mi Sensu; nonnullis autem in utrumque delap-
 “ sis: magna Pars eorum, qui ex hac Ægrimonia
 “ in Epilepsiam conciderant, Vitam cum Morte
 “ commutabant; quorum verò Morbus in Pa-
 “ ralyfin transierat plerique evaserunt, proinde
 “ atque in Crisi, Translatione Causæ. “

An fortè Morbus hic *epidemicus* à peculiari
 quadam Aeris *Diathefi* Ortum aliqua ex Parte
 duxerit haud scio; quandoquidem Cœlo sicco,
 vel humido, flantibus Austris, Boreave flante,
 æquè frequens sævierit. — Tempestate quidem
 sicca & rigida, furente Cæcia, vel Aquilone,
 Tormina fuisse atrociora notavi: hoc verò ac-
 cidebat forsan propter diminutam *Perspirationem*,
 & Alvum redditam magis compressam; ad
 divini Senis Effatum, αἰ καὶ Ἡμέρη κατὰ μέρος
 ῥόποι τὰς κοιλίας ἐνθαίνον. Aphorism. xvii. Sect.
 iii. Edit. Hollerii. — Quomodocumque autem
 hoc sit, vix credo ullum esse, qui hunc Morbum
 inter contagiosos recensabit: nisi & idem ille
 omnem Morbum vulgarem dixerit esse contagio-
 sum; quod neque Vis Vocis fert, neque Nor-
 ma loquendi. — Nascuntur sanè Morbi *epide-
 mici* à communi aliqua Causa, *Atmosphæræ* pu-
 tà, Corruptione, Cibo, vel Potu noxio: sæpe
 tamen minimè ab ullo *Miasmate* Morbum ab
 Ægro hoc illi Sano inferente.

Fuit equidem, ni fallor longè, Causa hujus
 Morbi manifesta maximè; tanta scilicet, tam-
 que incredibilis Pomorum Copia isto Anno abun-
 dans, |

dans, quanta vix unquam visa post Hominum
Memoriam, nostræ saltem ubique Regionis.
Pomi nimum onustæ Ramos propendentes,
Fructu fere ad Fracturam usque gravatos, car-
penti, Pondusque auferenti, quasi porrexere.
Pretio vel vilissimo tot emisses Poma, quorum
Succo expresso etiam implevisses Culeum, Sac-
cosque refertos vel ipso colligendi Labore ha-
buisset aliquis. Coloni plures, impiè ingrati, be-
nignissimo NUMINI, quasi prodigo, obmur-
murantes Vim Pomorum immensam Porcis ob-
jecerunt. — Sed & hoc etiam Porcorum Ge-
nus malè tulit Pomorum Ingluviem: contabue-
runt enim omnes & periere plures. — Ali-
qui magis fortè pii, etiam si haud satis sobrii,
Vini pomosi totas exhausserunt Amphoras; imò
quosdam, vel Mercede conductos, ad bibendum
invitarunt, ne perirent nempe Dei Dona, & no-
vo iterum, iterumque novo, replebant Cados.
Grata forsan temulento Baccho Libamina, at
summo Deo Hominum Patri minimè proban-
da! — Certum est tunc Temporis undique
comparata Vasa, & ex omnigeno fabricata Li-
gno, vix, ac ne vix quidem suffecisse ad enor-
mem *Pomacei* Quantitatem continendam.

Cum ergò Horti tantum ubique Pomis exu-
beraverint, Victum fere omnem Popello sup-
peditaverunt. Poma variis Modis cocta & præ-
parata omni fuere Cibo, ex his Vinum (Mustum
utique rectius dicerem) omni Potui: hoc enim
Cerevisia, etiam tenui, vilius, vel ipsa Aqua non
multo carius, utraque longe gratius, læta Plebs
hausit affatim futuri nescia Periculi.

Diuturnum & continuum Cibi Potusque pomosi. Usum dicam, an Abusum? Causam fuisse hujus Morbi nullus dubito; quia Neminem vidi eo correptum, qui se his abstinuerat: nec de meliore Nota Homines, opiparè viventes, attigit; utpote qui viliora (uti mos est) contemnentes rarò hæc degustabant; vel, si id quidem fecerant, plurima Carne & Aromate vefcentes, & Vina generosa potantes assiduè, crudis noxiisque Pomorum Qualitatibus occurrebant brevi.

Longa certè fuit Observatione notatum, quòd abundantibus Pomis Morbi torminosi plurimos infestant: adeò ut his in Oris sint quasi & *endemici & epidemici* omni fere Autumno; &, ut olim cecinit Horatius, sentiunt. — *pomifero grave Tempus Anno*, Lib. iii. Od. xxiii. Bene memini Anno MDCCXXII. eo etiam maximè pomifero, Morbum Colicum & *Rheumatismum* plurimum sæviisse, at huic, modò descripto, sive Vehementiam reputo, sive Numerum, illo laborantem, minimè comparandum. Hoc idem ipsum Annis MDCCXXVIII. & MDCCXXX. Pomorum etiam maximè feracibus, observavi: fuit autem notatu dignum, *Diarrhæam* tunc longè magis increbuisse, quàm Anno MDCCXXIV. quæ Colicem ac *Rheumatismum* levavit plurimum; acri nempe acidoque Pomorum Succo nec diu in Intestinis, nec in Sanguine, restitante, sed per Alvum protinùs ejecto. Anno autem MDCCXXXIV. Pomis quoque uberrimo, rarior fuit *Diarrhæa*, at Colica sævior longè, cui frequens successit Brachiorum Paralyfis.

Illud interrogari me posse ab aliquo, scio, unde fit, cur Succus Pomorum, uno Anno, adstrictam cum atroce Dolore, alio autem, vix aliquo

aliquo insigni Tormine comitante, Alvum valdè solutam creat. Cui certè vix habeo quod respondeam; at ille mihi explicet velim, cur hoc citiùs longè, quam illo Anno, Poma vel Generis ejusdem, &, quod ad omnia, quantum Sensu saltem dignoscere potest, similia putrescunt: quod tamen sæpius observatur. — Hoc tantùm, quod omnibus forsan satis notum est, monebo; Poma quo mitiora, eo certiùs Alvum solvere, ideoque quo magis humida fuerit & calida Tempestas, eò Poma & omnes Fructus Autumni esse mitiora, & ad Putrefactionem, & ad Alvum solvendam, magis apta: quod Observatio Tempestatum confirmat abundè.

Jam verò sequitur, ut Multi pomosi Naturam paucis exponam. — Humor ex Pomis (vel & Uvis) recens expressus Sale *essentiali* acido, & valde crasso, sive *Tartaro*, abundat, plurimis porrò terrestribus Particulis, multo, sed impuro, Sulphure. — Quanto acerbior Fructus, tanto crassior & copiosior Sal *essentialis*, ut in Vino Mosellanico & *Pomatium* nostro manifestum est; hoc ad Fundum demittente *Tartarum*, mucosa Fæce gravatum maximè, illo ad Dolii Latera Salis ejusdem *tartarei*, sive *essentialis*, plurimum seponente. Nec certè longè differt Vinum Rhenanum à *Pomatium* generoso, nisi quòd hoc multo plus *Mucilaginis* habeat; quippe quorum Salia nativa videntur maximè congenera, etiam *Microscopio* conspecta ejusdem sunt planè Figuræ; atque utriusque Salia nonnisi post longum Tempus comminuuntur ita, ac subiguntur, ut Liquor pomosus ad Potum aptus reddatur, aut salutaris. — Imo *Pomatium* ex Pomis agrestibus & acerbis expressum, vix nisi secundo, vel & tertio demùm

demum Anno, aut Potioni gratum, aut salubre tandem evadit.

Utravis horum mustea si bibis affatim, Doloribus colicis & rheumaticis certo certius vexabere; nec Arthritidi obnoxii hæcce hauriunt impune, quippe quos protinus corripit Paroxysmus. Nec graviores Pœnas luunt bibaces Germani, ad Ripas Rheni & Mosæ Incolæ, Se Vino tartareo ingurgitantes, quàm Nostrates Pomaceum avidè perpotantes: ibi enim & hic Arthritidis Morbus est *endemicus* & maximè communis; neque tot uspiam, etiam inter Plebeculam, Podagra laborant, quot in Damnonia Provincia, ob Pomaceum notissima. Ac credere fas est, Morbi hujus Frequentiæ Causam fuisse multum & continuum Vinorum Usus, Tartaro maximè abundantium, qualia sunt Vina Mosellanica, Gallica, & Pomacea nostra: ex quo enim horum invaluit Usus, longè magis quàm antè increbuit Arthritidis. Vinum Burdegalense, præsentis Ævi Delicias! haud magni fecit Ætas elapsa; & decuplo Plus Pomacei nunc factum & epotum est, quàm Annis abhinc triginta.

Si quis verò dubitat fortè, an Musto pomaceo tanta Vis insit Tartari, experiatur ipse, Modo ab Angelo Sala optimè descripto (*Mucilaginem* nempe à Succo abstrahendo) quanta Copia Salis *essentialis* ab eo colligi potest: inveniet utique permultum. Pomaceum, more Vini Rhenani, Tartarum ad Latera Cadorem haud equidem seponit; hoc autem ejus Defectus minimè Argumentum est, cùm nec vel ipsum Vinum Rhenanum, nisi postquam mucosam & terrestrem Fæcem Fundo demiserit, ad Vasis Latera Tartarum rejicere possit. — Pari Ratione Vina Hispa-

Hispanica nullum Cadis *Tartarum* dant, ob nimiam scilicet oleosam & tenacem Colluviem, qua irretitur. Nec ulla Arte separari potest Sal Citrii, five Limonis, ab Humore suo expresso, Sale tamen acido, si quis alius Succus vegetabilis, maximè scatente; utpote qui permulta *Mucilaginis* Quantitate implicatus: quod & laudatus Sala in *Tartarologia* sua dudùm annotavit, & ipse experiundo verissimum esse didici. —

At *Pomaceo* novello plurimum inesse *Mucilaginis*, Argumento est Lentor iste, quem contrahit, Olei instar, si vel nec debitè fermentatur, nec saturatur satis Sale actuosio; *Mucilaginem* sulphuream attenuante: hujus etenim Defectu, *Pomaceum* ex mitioribus Pomis, intra Anni Spatium in Liquorem viscidum & pendulum quasi certissimè convertitur. Porro fere semper observamus, quod, dum Mustum pomosum in Cupis ad despumandum asservatur, Pelliculæ tenaces formantur, quas Coria putrefacta esse crederes: similes etiam Doliorum Lateribus adhærescunt.

Videamus jam breviter, quid Mali nostris infert Corporibus Succi Pomorum crudi, nec fermentati probè, nec defæcati, Ingurgitatio: De Musto differentem audiamus Hippocratem, Lib. ii. de Vict. Ration. Γλεῦκος φουσᾶ, καὶ ὑπάγει, καὶ ἐκταράσσει Ζέον ἐν τῇ Κοιλίῃ, καὶ διαχωρεῖ φουσᾶ μὲν, ὅτι θερμαίνει, ὑπάγει δὲ ἐκ τοῦ Σώματος ὅτι καθαίρει, ταρασσει δὲ Ζέον ἐν τῇ Κοιλίῃ καὶ διαχωρεῖ. —
Succus Fructuum ὠραίων citò fermentat, inter fermentandum Aer Musto permixtus dilatatur maximè, ut vix Doliis firmissimis coerceri possit. Si quis ergo Vinum musteum hauserit avidius, in Ventriculo & Intestinis fermentet vehementer
necesse

ter necesse est; hæc dein Flatu distendat valde, torqueat, excruciet; Ope Caloris namque Fermentatio & Aeris Rarefactio augetur maximè: at Mustum fermentans vix continent roburnea Vasa, quid non inde Malorum Intestina hocce referta passura esse credamus? Nec mirum utique hæc consideraati, si Historia medica funestissimos Eventus, Intestina nimirum ab indomabili Gas, sive Flatu, disrupta denarrat.

Nec Ventriculo & Intestinis solùm nocet fermentans Mustum, quatenus Aere furibundo turgidum; habet insuper stimulandi & abstergendi Vim summam: nam vix aliquid Musto magis smeeticum datur, fere Cuticulam ejus abradit, quò Musto Manus abluit. Cuique Anatomia vel leviter imbuto notissimum est, Intestina Muco quodam blandissimo oblita esse, quem (non hìc solùm, sed alibi) ad fallendam Ingestorum Acrimoniam providens secrevit Natura: hunc autem abstergit penitus nimius Succi saponacei Usus, qualem maximè præstant Fructus *επαίου*. Hinc Vomitus. Cholera, *Diarrhœa*, *Dysenteria*, ex horum Ingluvie: deterso enim Viscerum Muco, Munimine quasi Tunica nervosæ, ea quidem minimæ Acrimonix impatiens, nedum Salium crassiorum, quibus abundant tales Fructus, & horum Aculeis lancinata undique, cruciatur admodum. Atroci adeò Dolore percita Intestina, Motu eorum *peristaltico* plurimùm adaucto, Hostem infensum valdè expellere omni evituntur Ope. Sequitur dehinc Vomitus enormis & Alvus citissima; at fausto utplurimùm Omne Inimico aufugienti patent Portæ: incarcerato autem fermentante Humore, Interanea tam validè distendit, ut nec se contrahere, nec Motu *peristaltico*

acres & furibundos Humores depellere queant: Vesicæ urinariæ ad Modum, nimia distentæ Urina, quæ se exonerandi omnem Vim perdidit. Horrendus hinc oritur Dolor, deinde Intestinorum Inflammationes, quas citò vel Gangræna, vel Disruptio, excipit, ni promptum adhibeatur Remedium.

Cum autem, vel à Facultate Pomorum astringente (utimur namque ad conficiendum optimum *Pomacei* Genus maximè acerbis & austeris, ideoque in Regione nostra Horti talibus potissimùm abundant) vel à Stomachi, ac Intestinorum, Robore nativo eorum, qui *Pomaceum* perpotant novellum, acciderit, ut nec concitetur Vomitus, nec perturbetur Alvus, Mala tamen persæpe sequuntur atrociora. Hujus enim longa & frequente Potatione tanta Vis *Tartari* indomiti ingeritur Sanguini, ut non solum Sanguis ipse inde reddatur acris valdè, sed & ab impuro Fonte omnes ab eo secreti Humores. Hinc Loco perdulcis & lubricantis Muci, per Glandulas *Haversianas* percolati, mordax quasi Coagulum: Dolor hinc Artuum oritur pungens, ac Motus Impotentia. ——— Loco blandissimi Liquoris, Nervos irrigantis, Latex corrodens: hinc Nervorum Distentiones, hinc Insultus epileptici. Sanguine porrò tanta Salium Copia saturato, Corpuscula salina in mutuos Amplexus ruunt, & majores formant Massulas, quàm quæ per Arterias *lymphaticas*, vix utique per sanguineas *Capillares*, perfluere possunt: hinc nascuntur Obstructiones variæ, atque Propaginis nervosæ Vellicatio summa.

P

Tandem

Tandem etiam & vel ipsa Bilis, Balsamum istud πολύχρυσον Corporis, corrumpitur, & ab Acido pomoso superabundante domatur, quæ vel ipsa debet esse Acidi Domitrix: pluribus siquidem constat Experimentis, quòd Bilis, si nimio cum Acido, vel vegetabili, vel minerali, commiscetur, Viribus spoliatur, iners reddatur prorsus, & in Coagulum fere abeat. — Fe-
 rax hæc Causa Malorum! stagnante enim in Acinis Ductibusque Jecinoris inspissata Bile, Tu-
 mor, vel Induratio, Hepatis subsequitur, unde Circulatio & Secretio per magnum hoc Viscus impeditur maxime. Quanta dehinc oritura sint Mala perspiciet facile, qui Arteriarum Mesentericarum & Coeliacæ Distributionem, atque, ex harum Ramusculis, Venæ Portæ Cursum etiam, perpendit probè: at cum hæc describere longum esset, missa faciam, breviterque tantum considerabo Bilem, quatenus Acido contaminatam, & in Poris biliaris & Vesica fellea nimium diu stagnantem.

Jam itaque in Hepate subsistente Bile, nulla fit ejus in Duodenum Excretio, unde nec Chyli Lentor, nec Aciditas attenuatur satis, vel subigitur probè. Chylus autem glutinosus per Vasa Lactea Sanguinem intrans Lentorem ejus adauget, jampridem, ab acido & austero Pomorum Succo, nimis crassi: hinc Secretiones omnes, quæ Lege Naturæ, fluidiores esse debuerunt, factæ sunt justo crassiores; multa etiam hinc Mala! Cæterum Intestina; proprio Bilis Stimulo privata, Fæces tardissime deponunt, unde Alvus fit astricta admodum. — Certè tum squalidus ille luridusque Color omnium ex hoc Morbo laborantium, tum crassa eorum & crocea Urina, Indicia erant

erant manifesta satis, Bilem nec debito Modo secretam fuisse, nec in Intestina excretam.

Quamquam Bilis ab Acido coacta in Cysti fellea, ac in Ductibus hepaticis, iners velut & torpida per Spatium aliquod hæreat, latet tamen Anguis in Herba. Si quis enim Corporis Humor, vel blandissimus, extra Aream *Circulationis* effusus, Calori Corporis humani exponatur diu, & Motu Partium vicinarum agitetur; tenuior indies & acrior factus in acerrimam & Vasa omnia corrodentem Saniem mutabitur tandem. Nonne pulchram sæpe Mammam ex stagnante solo dulcissimo Lacte depascitur Ulcus horrendum? Si hæc Humori suavissimo, annon eadem, imo & vel graviora longè eventura sunt Bili, etiam in Statu naturali omnium acerrimo? cui & jam insuper plurimum Salis acidi adjicitur; qui, quamquam fortè Bilis *alcalinam* Putredinem temperet paululùm, Vi tamen Corporis vitali exagitatus assiduè, Acrimoniam demùm exauget maximè.

Bilis nisi ab effuso Acido haud viridescit, & quo fortiora admiscentur Acida, eo intensior oritur Viriditas, prope ad Nigritiem accedens, ac Coagulatio fortior, ut Colore & Consistentia propius absit Mistura à Fuligine affuso Atramento: fit hoc clarius si cum Felle humano, quod magis forsàn *alcalinum* est, quàm de alio quovis Animale Bilis, instituatur Experimentum. — Hoc certè mihi videtur esse Bilis atræ & æruginosæ Origo longè frequentissima: falluntur utique, qui has Bilis Species in primis solùm Viis formatas esse credunt, cum qui in Extispiciis humanis versantur, in Vesica fellea, & ipsis Poris

biliariis, tum atram, tum porraceam, offendant sæpiùs.

Huic Ratiocinationi adstipulatur Experientia, qua sine vana omnis *Theoria*, bella sit utcunque. Obstupui sæpe videns Bilem æruginosam, ac, vel ipsa acriorem longè, atram, Vomitione rejectam, Metalla ipsa corrodentem, & in Pavimentum, haud aliter quam effuso Spiritu vitrioli, bullientem: quinimò tam acerbè acidam, ut Dentibus cum Horrore summo Stuporem incusserit, Faucesque ipsas excoriaverit. Nonne hæc maximæ Aciditatis Argumenta? vix herclè majora facit ipse Vitrioli Spiritus. Apud Galenum idcò, aliosque, Bilis atræ Characteres (qui & porraceæ itidem conveniunt) sunt τὸ δερ. μὸ, τὸ οἷδες καὶ τὸ διαβρωτικόν. Curavi olim Nauclerum quendam honestum, à Virginia reducem, qui torminosa Alvo primùm, gravissimis dein Nervorum Distentionibus & Delirio correptus, plurimum Bilis viridissimæ, subinde aterrimæ, ac quam maximè acidæ, evomuit. Huic inter Convulsiones, dum Cochleare argenteum in Ore, ne Linguam scilicet demorderet, intruderent astantes, Momento quasi Temporis Colore planè atro infectum retraherent, ac si in Spiritu Nitri intinctum fuisset.—— Hic autem Homo, ut hoc obiter notem, Succo Limonum acerbissimo captus valdè, cum in omni fere Potu hauserat abundè: nec possum sanè quin addam, Me sæpiusimè Hos Bile atra, aut porracea, afflictos esse notavisse, qui frequenter prius ex Ventriculo, ob corrodens & valde pungens Acidum, laboraverant.—— Jamque in Memoriam redit, quòd Annis abhinc quindecim, à generoso quodam Juvene, Acetariis atque Pomaceo impensè dedito,

redito, & id propter colicis & *rheumaticis* Doloribus frequentissimè vexato, Sanguinem detractum attonitus viderim, cujus Serum, Succus instar è Porris expressi, erat viridissimum: vide porrò Observationem nostram secundam Act. Philosophic. No. 382.

Haud equidem ignoro, optimum *Sydenhamium*, Bilem porraceam ex Sola Spirituum *'Αραξία* Ortum ducere affirmasse: quod si verum erat, tunc in omni graviore Animi *Pathemate*, vel Spirituum à quocunque Causa vehemente Agitatione, Bilis porraceæ Generatio sequeretur, quod tamen plerumque falsum est. Animi *Pathemata* profectò Bilem movent & exprimunt (idcirco Phrasi aptissima dicitur, Bilem illi commotam esse, qui Ira incensus est) ac si Bilis, enormi Spirituum Motu expressa, acido alicui Humori in Visceribus occurrit, fit illicò viridis; quæ persæpe in magnis Animi Perturbationibus evomitur. Nonne autem hunc Hominem, jam, ex vehemente Animi Motu, viridem evomentem Bilem vidimus, qui paulo post fortè, à graviore Commotione flavam omninò vomebat? Nonne Ille, in perturbato Mari navigans, hodie Bilem viridissimam rejicit, qui postridie tamen croceam prorsus ejectionis est; & è contrà? Bilis utique extra Corpus, ab Agitatione vel fortissima, haud viridescit, nec nisi admisto Acido, vix intra itaque. — Quod sentio dicam; Spirituum Agitatio vehemens, sive graviora Animi *Pathemata*, Concoctionem lædunt maximè, atque sic *Chylus* in Stomacho acescit, cui profluens admista Bilis vadit viridis; dumque Stomachus est infirmus, quicquid intus assumitur haud probè digeritur;

unde diu in Intestinis & Ventriculo Pituita acida dominari potest.

Bilis igitur, seu viridis, seu atra, in Vesicula fellea & in Ductibus hepaticis congesta diu, & Corporis Calore fota, tandemque liquefscens, vel ab extremis Venæ Cavæ Ramusculis absorpta in Massam rapitur sanguineam, vel per Ductum *Choledochum* in Intestina effunditur. At cum utraque jam facta sit summè acris, Sanguine confusa, mira excitat mala: nempe Genus omne nervosum irritando Dolores, Anxietates, Spasmos, infert. Vascula pariter rodit teneriora, &, in Cerebrum transfata, illi est perquàm infensa. — Intestinis verò aliena maximè enormes concitat Vomitus, atque horrenda Tormina.

Bilis autem atra, acida, acris sit utcunque, nequaquam tam funesta est humanæ Fabricæ, quàm Bilis atra *alcalina*: Acidum enim fortissimum haud æquè potenter Vasa, Partesque Corporis erodit, ac Lixivium fortissimum *Alcalinum*, quod dicto citius Substantias animales dissolvit penitus. Imò verò Bilis putrescens, ni ab Acido mitigetur Virus, in Saniem acerrimam, omnia corrodentem, mox abit. De hac adeò tantùm Bile intelligendus est Hippocrates, Sensu absoluto, in Aphorism. 22. 23. 24. Sect. iv. & Coac. Prænotion. 74. Lib. i. Edit. Duret. itemque ab Hippocrate Celsus, Lib. ii. cap. viii. “Tormina ab atra Bile orsa mortifera.” Est enim *gangranosa* Sanies Icterus, vel *Hepatitis*, male judicatam consequens. Diros hujus interdum notavi Effectus, quondam præcipuè in Matrona quadam, Spiritibus vinosis addicta maximè, quæ & inde in icterum nigrum inciderat: illa namque paulo ante Mortem vomuit multa,

multa, atra, foetidissima, brevique post multo cum Sanguine, αἷμα καὶ κατὰ rejecto, (exesis nempe Vasculis sanguineis) reddidit Animam. — Atque meherclè ob Acrimoniam putrefactæ Bilis, quæ omnia Vasa destruit confestim, accidit, quod *Hæmorrhagia* Ictericis Symptoma fere semper funestum est.

Est & alia Bilis atræ (dictæ) Species, priore longè, longèque mitior, quæ Recrementum quasi sanguineum est: de hac posteriore ita Galenus, in Commentar. ad Aphorism. Hippocratis 53. Lib. vi. Μεννῆσαι γὰρ καὶ τῶν περὶ τῆς μελαίνης χολῆς, &c. i. e. “Meminisse enim oportet eorum, quæ in aliis Scriptis nostris de atra Bile definita sunt; nempe quod quædam ex flava Bile superassata fiat, quæ omnino est maximè perniciosa; alia vero, ut ita dicam, ex Cæno & Fæce Sanguinis, quæ quidem crassiore quam illa est Substantia, sed multum à Qualitatis Malignitate recedit.” — Idem vero rectiùs hanc vocat *Χυμὸν μελαγχολικόν*.

Has idcirco Bilis atræ Differentias protuli, ne quis, ejus Species malè confundens, me de Bile mitiore, seu potius Succo *melancholico*, ea denarrasse existimaret, quæ de Bile atra, acida, solummodò vera sunt.

Tanta, tamque gravia, Hominibus accidunt mala, ex immodico & perlongo Fructuum *ῥαίων* Usu, eorumque Succo, nec fermentato probè, nec bene defæcato; Pomorumque præsertim, quæ non solum Succum habent acidum valde, sed & austerum insuper. — Hunc autem longa, ac debita, Fermentatio Potum reddit jucundum sanè & salutarem. Perpetuo enim & intestino Fermentationis Motu Sales *tartarei*

crassiores comminuuntur maximè, & subtilissimi tandem facti, ad permeanda vel minima Corporis Vascula apti redduntur. — Cum verò Particulæ alicujus Momentum, in aliud impingentis, à Quantitate & Velocitate conjunctim oriatur, minima Corpuscula levissimo Impetu feruntur, ni moveantur ocissimè: Sales ergo, valde subtiles facti, leviter tantum irritant Nervos, eosque titillant potius quàm lacerant. — Præter hæc crudum musti Oleum attenuatur maximè, Salibusque *tartareis* intimè conjunctum, iis Vaginulas quasi sulphureas præbet: ita tandem Pomorum *Tartarum* fit veluti Sal quoddam *volatile* oleosum, & Liquor pomosus gratus valde Potus & satis salubris.

Vix utique datur ad *alcalinam* Acrimoniam præstantius Remedium: Nihil magis, aut efficax, aut jucundum, Nautis *scorbuticis*; nam fœdis eorum Ulceribus brevi medetur, ac Putredinem Gingivarum fœtidissimam delet prorsus: plurimos certè vidi, à Navigatione longa teterimis obsitos Ulcusculis, & Lue *scorbutica* tantum non confectos, solo Usu Pomorum, mox restitutos. — Ac nullus dubito, quin generosum *Pomaceum* foret saluberrimus Potus ad Indias navigantibus: imò plures jam satis experti sunt salutare hujus Effectus. — Hoc habeo etiam addendum, quod, ex quo, apud omnes fere Nostrates, tanto fuit in Usu, evanuit pene & tetra Scabies & horrida Lepra, quæ Oras has maritimas olim infestaverunt maximè, Cornubiam potissimum.

Res nunc & Ordo postulant medendi Methodum;
Quod

Quod ad Sanguinis Missionem attinet, utcumque ea sit necessaria prorsus in Colica (uti dicitur) biliosa; ac Jure merito, apud *Sydenhamium*, aliosque, primum obtinet Locum, ubi Dolor vehemens, pulsus fortis & citatior, atque Ardor febriculosus, hanc postulabunt, (ne scilicet gravis Inflammatio Viscerum accederet:) in hoc tamen, quem jam descripsimus, Morbo, adeo nil prodest, ut etiam plerumque noceat. Debilis enim tardusque Pulsus, & Spiritus graviter oppressi, *Symptomata* in hoc Morbo perpetua, Sanguinis Dispendium vix tolerant, nedum requirunt. — Et vel ipse Sydenhamius, contra quod in Colica biliosa præceperat, ubi Morbus colicus *Fructibus horariis*, nimis avidè ingestis, Originem debuerat, non nisi post sumpsum *Emeticum* & *Anodyna* Venam secari jussit. At certè vix video, cui Bono Sanguis tunc emitendus sit, nisi nimia ejus Quantitas, Velocitas, aut Calor, Venæ Sectionem ante omnia postulaverint: quandoquidem, nisi Sanguine misso, in Corpore *plethorico*, non levi cum Periculo moveatur Vomitus.

Fateor equidem, me antequam Morbi Naturam perspexeram penitus, quibusdam Sanguinis Missionem imperasse, ad Dolorem nempe atrocissimum leniendum: at Effectus fuit Opinione longè minor; nam omnes penè in gravem Animi Delirium inciderunt. Quid quoque hoc efficere potuit in Artuum Dorsique dolore experiebar; at Successu utique haud meliore, quinimò infauisto utplurimum Eventu: quibus enim Sanguis larga manu detractus fuit, omnes fere, *paralytico* Affectu correpti, Vim prorsus Motumque Manuum perdiderunt, nec Usus earum, nisi

nisi post longum Tempus, recuperaverunt tandem;
ac quod dolendum certè, aliqui hoc Tempus ad-
usque Resolutione Manuum laborant. Ex hoc
profectò Errore, vel levissimum Accidens fuit
diu durans Tumor Pedum hydropicus. —
Paucis igitur; Si fortè Venæ Sectio, propter
Sanguinis nempe Multitudinem, est præci-
pienda, debet id fieri incipiente Morbo, &
priusquam *Narcotica* administrantur: nam non
in hoc solùm, sed & in omni fere Morbo,
perpetuum est, quod Ægri facilius longe Mis-
sionem Sanguinis ferunt ante, quàm post Opii
Usum.

Quamvis Venæ Sectio huic Morbo rarissimè
conveniebat, Medicina tamen vomitoria fuit
semper utilis, in Principio utique pernecessaria:
sive enim *Anodyna* dederis, sive *Cathartica*, aut
Vomitu rejecta protinùs, aut Pituita tenacissima
implicata, neutiquam vel Dolorem lenirent, vel
moverent Alvum, si ea præsertim in Forma soli-
da exhibuisses. — Memini, profectò me
consultum fuisse à Pharmacopola quodam Gal-
lico, pro Uxore cujusdam Pictoris, cui dede-
rat saltem (partitis autem Vicibus) Pilul. ex
Duobus ℥ij. quibus & adjecerat etiam Calomel.
℥ss, eaque omnia incluserat Portione larga In-
fusus purgantis fortioris; quid inde? Vomuit
equidem, parciùs autem, at ne vel minimè re-
spondit Alvus. Ego verò *Emeticum* propino
statim, haustaue dein, pro more, affatim In-
fusione Salviæ & Florum Chamæmeli immen-
sam planè ejecit Quantitatem Muci quam maxi-
mè viscida, cum ipsissimis Pilulis, nullo fere
modò mutatis, quamquam plures ante Horas
deglutitæ fuerant.

Hic

Hic jam obiter venit notandus Error eorum, qui *Cathartica* resinosa exhibent, nec cum Sale aliquo solvente, nec Ovi Vitello, commista; quæ faciant ut Resina sit in Visceribus dissolubilis: Si quis enim sinceram, aut Jalapii, aut Scammonei, Resinam alicui porrigit, pituitosis & aquosis Humoribus in primis Viis abundanti, haud magis Alvum movebit, quam si meras ministrabat Quisquiliis, & hujus Actionem ita non juvat (quod Vulgus tamen solet) jusculi avenacei larga Potatio, ut eam prorsus impediatur. — Plantas ideò resinosas, optimè præparatas, porrexit alma Natura Sale nempe proprio solvente divites, quem certè, dum Resinam conficit male feriatus Chemicus, perdit omninò.

Sed è Diverticulo in Viam. — Imprimis itaque, hoc Morbo laboranti, ad hunc Modum præscripsimus.

℞ Rad. Ipecacuanh. ℥i. vel ℥ss. Sal. Absynth. ℥ss. coq. ex Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. dein coletur Decoctum, cui adde Aq. Flor. Chamæ. Comp. Syrup. è Spin. Cerv. ana ℥ss. m. f. Potio emetica. — Ad Vomitus promovendum hauriat affatim Pulli gallinacei Decoctum, vel, quod magis probo, Infusum Salvix & Flor. Chamæ.

Emeticum hoc nostrum, præ omnibus, quæ probavi unquam operando videtur lenissimum, at detergendo potens satis & Effectu certissimum; citò enim Vomitus ciebit, nec longa in Intestinis Mora Tormina creabit: (quod, Ipecacuanh. in Pulvere assumpta, sæpissimè evenit) huic, dum violentius volo, Tartari emetici Grana aliquot, aut Cochleare unum, alterumve, Vini benedicti adjicio.

Vomi-

Vomitus hoc Modo provocandus est alternis Diebus, vel ad quartam nonnunquam Vicem : cum etenim maxima Copia Pituitæ tenacissimæ obruitur Stomachus, cum magna Vis corruptæ Bilis eum opprimit, quis Medicinæ Profectus expectandus est, nisi hæc expurgantur penitus? Quod rectius longè sursum, quàm deorsum, faciendum est : licet enim ponatur ea ejici posse per inferiora, nonne tamen longè commodius per vicinum Os evomenda sunt, quàm per longum Intestinorum iter deturbanda? Quinetiam, dum per Intestina depellitur putrida Ventriculi Colluvies, Pars istius tenuior ab Osculis Venarum Lactearum resorpta, Sanguinem inquinabit, dum Pars crassior, in Plicis Viscerum hærens, atrocia excitabit Tormina: atqui si omnia expurgari potuerunt, inter descendendum tamen Tunnicam Intestinorum nervosam cruciarent maximè. Constat igitur ineptum esse velle per Alvum purgare Stomachi Colluviem.

Nec solùm ad hunc Morbum proficit Vomiti-
tio, quatenus perpurgat Ventriculum, sed & inter vomendum Partes Stomacho proximiores concutiuntur & vellicantur maximè : quicquid ita Humor in Hepate, vel Pancreate, stagnaverit exprimitur, ac Vomitu proinde ejicitur. — Cum autem stagnando corrumpatur omnis Corporis Humor, atque inde Acritudinem contrahat assiduè; si per Alvum excernendus foret, tum Intestina torquendo, tum Vasa Lactea subeundo, plurima produceret Mala. Vomitione ergò optimè exantlatur Bilis, sive porracea, sive atra, utraque in hoc Morbo frequentissima. — Quinetiam sæpe certè notavi, ex peracta Vomitione, vel ipsos Artuum & Humerorum Dolores cessasse,

cessasse ; pro Tempore saltem ; ad divini Senis Effatum, Lib. ii. Prædictorum, quod sic reddit Celsus noster, Lib. ii. cap. 8. “ Humerorum
“ Dolores, qui ad Scapulas, vel Manus, ten-
“ dunt, Vomitu atræ Bilis solvuntur. “

Cum jam Vomitus conquieverit, quod exhibitis *Paregoricis* citò efficitur, danda sunt pro-
tinùs Medicamenta per Alvum purgantia ; iisque rectissimè addenda sunt *Anodyna* : siquidem ob-
stinata Alvus & Dolor Ventris gravissimus sunt in hocce Morbo *Symptomata* perpetua. — Ideò
ubi colicus Dolor sævit admodum, *Opiata* Pur-
gantibus adjici debent : nempe ut Dolor redda-
tur tolerabilis, ut Intestinorum Relaxatio deinde
sequatur, atque ut eorum Motus peristalticus fiat
constans & regularis, nec interruptus, nec per-
versus. — Dolor omnis agit ut Stimulus, vel
rectiùs Stimulus sensum Doloris excitat : Stimu-
lus autem omnis ad Contractiones concitat Fi-
bras, easque in *Spasmos*, si fit vehemens, adigit.
Cum itaque Dolor colicus atrocissimè urget, Inte-
stina in quibusdam Locis Convulsionibus affici-
untur, & Fascia quasi constringuntur, adeò ut,
nisi Tormento sopito, nec Alvus nec Flatus in-
frà transmitti possit : hac adeò de Causa, Dolor
colicus vehemens secum plerumque habet Comi-
tem Alvum valde astrictam. Rectissimè ergò in
omni Colica graviore *Anodyna* purgantibus adj-
ciuntur ; nec certè hoc novum est, experientis-
simus enim Riverius in Capit. de Dolorè co-
lico præscripsit Aloes ℥i. Scammonei gr. vi.
quibus Laudani Opiati adjunxit Grana duo : imò
in Observatione prima Centur. 2dæ iisdem ad-
miscet Grana quinque Laudani. — At cum
id se facere ex Auctoritate Hippocratis opinatur,
mea

mea quidem sententia fallitur; nam Vox *Μηκώνις* in Loco à Riverio citato, non Succum somniferum Papaveris (nisi fortè τῆς ἀφρώδεος sive spumæ mei Dioscoridis, quod vehementer satis purgat) significat, sed Πέπλον, sive Πέπλιον*, Genus scilicet Medicamenti Alvum purgans: hoc idem etiam *Μηκώνιον* significat apud Hippocratem frequentissimè (nisi quando Epithetum ὑπνωτικόν adjicitur, ut Lib. ii. de Morb. Mulierum, p. 670. Edition. Foessii) ita quoque *Μηκώνις*, sive *Μηκώνιτις*, à Galeno explicatur in Exegesi Vocum Hippocraticarum, *Μηκώνιον τῷ Πέπλον καλούμενον ὃν καὶ Μηκώνιτην ὀνομάζει.*

Sed ad Rem. — Vomitu peracto, Ego uti soleo sequentibus ℞ Phil. Coch. min. ℥i. vel ℥ss. Calomelan. ℥ss. Laudan. solid. gr. i. Ol. Caryoph. gutt. i. m. f. Pilul. vel ℞ Rad. Jalap. ℥i. vel ℥ss. Spec. Diamb. gr. viij. Calomel. ℥ss. Syrup. de Spin. Cerv. q. s. m. f. Bolus. — Pilulæ autem non ita facilè rejiciuntur — Post duas dein, tresve, Horas Senæ Infusionem, vel Mannæ Solutionem, atque id Genus Medicamenta, præcipio; quibus & interdum adjicio Oleum Amygdalinum, aut Olivarum, nisi ubi Stomacho Oleum valdè alienum est. Horum Dosis & augeo & repeto, pro Ratione *Symptomatum*: Hisce verò pacatur Dolor, relaxantur Intestina, ad Dejectiones stimulantur leniter, & oleosis lubrica redduntur. At si ne sic quidem Alvus respondet, totum Abdomen foveri jubeo Fomento emolliente, idque potissimum ubi Venterensus est admodum & durus, vel *Spasmo* maximè

* Πέμλος ἢ Πέπλιον ἐλλυτάτω μὲν τῇ Ἰδίαν ἀλλήλων τὸ καθαράι. Ruf. Ephes.

maximè contractus. Hoc blando Vapore Abdominis Integumenta penetrat, ac Intestina ipsa demulcet, rigidas hoc emollit Fibras, easque nimis tensas relaxat. Mirandum planè Successum sæpe notavi ex Applicatione Fetus hujusmodi. ℞ Rad. Althææ, Sem. Lini — Fœnugræc. ana ℥iij. Flor. Chamæmel. M. iij. Capit. Papav. alb. ℥iv. coq. ex Aq. font. & Lact. dulc. ana P. æqual. — At Effectus longe feliciores expectandi sunt, si Æger in Semicupium demittatur ex iisdem paratum. Mihi, hæc asserenti, facilem dabit Assensum quisquis felicissimos Balnei emollientis in Doloribus nephriticis Effectus observavit. — Haud rarò profectò vidi sævissimum Paroxysmum *nephriticum* solo Balnei Usu derepentè solutum, cum nec prælonga Sanguinis Missio, nec Laudani Doses, eæque haud mediocres, vel profecissent Hilum. Imò per multis didici Experimentis, nihil ad Dolorem sedandum, ad Calculum per Ureterem demittendum, æquè conducere ac Balneum tepidum & emolliens.

Accidit autem sæpissimè, quod Fæces alvinæ in hac Colices Specie, valdè indurantur, & in Valvulis Coli hærentes, Flatibus & Stercori Repagula sunt, adeò ut, dum omnia ibi sistuntur, nihil ultrà transmitti possit: hac sola de Causa sæpissimè oriuntur gravissimi Dolores, ubi præsertim Intestina Purgantibus irritantur. Quamobrem si post Horas aliquot, ab assumpto Cathartico, Alvus nihil reddit, olcosum & emollientem Clysterem injici præcipio, quo & Intestina reddantur lubrica & Stercora molliora: dein (si opus erit) Alvus acriore Clysmate duci potest.

Si

Si quis alius Morbus, hic profectò, de quo jam agitur, frequentem *Catharsin* Alvumque diu solutam requirit: Medicamenta ergò leniter purgantia per Dies aliquot continuos exhibenda sunt; inter quæ laudo potissimum *Rhabarbarum*, *Pilul. Ruffi*, *Tinctur. Sacr.* quibus subinde adjungi debent *Calomelanos Grana* aliquot. *Terebinth.* etiam *Veneta*, aut *Cypria*, *Ovi Vitello* subacta & *Aquæ* alicui *Cardiacæ* admista, Alvum purgat commodè, & plurimum facit ad *rheumaticos* Dolores, Colicen comitantes. Intereà tamen *Anodyna* quædam liberali Manu porrigenda sunt; neque enim aliter sævissimos compescere Dolores, neque iisdem occurrere potes, recursuris alioquin promptissimè, nisi repetita Dosi *Lacrymæ Papaveris* Tormenta reprimas. — Quod tamen ad *Opii* Dosin attinet, nihil certi statui potest, cùm ipsissima Dosis alterum soporet maximè, alteri det contrà dulce furere.

Longam hanc & frequentem *Catharsin*, ut ut nova videatur, necessariam esse comprobavit *Experientia*: Alvus enim aliter mox fieret astricta valde, & gravissima *Tormina* certo certius succederent, ob acres scilicet *Humores* in *Intestina* perpetuò influentes.

Non solùm ad hunc Morbum profligandum primas *Vias* perpurgare necesse est, diluenda est insuper *Sanguinis Acrimonia salina*: nam ex polluto Fonte haud puri diffluunt Rivuli. Diluentia ergò propinanda sunt abundè, inter quæ ἀρίστον μὲν ὕδωρ; neque enim aliud datur *Salium Solvens*, neque magis purum & incorruptum aliquid. — At ex omnibus *Aquis* laudo maximè *Aquam Pyrmontensem*, aut
Spada-

Spadanam : hæc siquidem , Principio prædita *Chalybeato* , non tantum Sales dissolvit optimè , sed & *Crasin* Sanguinis firmat , ac Fibrarum Totonum roborat.

Cum per hæc Sanguis fit dilutus apprimè , omni Ope evocandus est Sudor. Nil verò ad hoc idoneum magis expertus sum quàm Camphoram , ac divinum illud miserorum Solamen, Laudanum : his assumptis ad Sudores eliciendos largiter calideque hauriri debet vel *Salviæ* , vel *Rorismarini*, Infusio , aut , quod Stomacho forsitan arrideat magis , Serum Lactis vinosum.

Qui Consensum intestina inter & Cutim , qui foetidos acresque Sudores , vel Cuticulam ipsam erodentes , observaverat ; haud ita multum obstuperet , videndo tum colicos Dolores, tum *rheumaticos* , post Sudationem penitus fere sublato , pro Tempore saltem. — Istud certè fuit Naturæ Vestigia premere , cui Medicus , ejus Minister , prudenter obsecundare debet : frequenter enim Sudores , sponte erumpentes , hanc Ægritudinem allevabant admodum. — Hisce apprimè convenit Baglivi Aphorismus Capit. de Colica : “ Colica habitualis & endemicica , à Vino acido præsertim oriunda , solis sanatur Sudoriferis ; Vesperi tamen interposito anodyno Remedio . ” — Atqui miror ipsummet Baglivum , in eadem etiam Sectione , Usus Opii in Colica improbasse : sive enim Sudores moveat , sive non , in vehemente Colica pernecessarium est , ac longè longèque antefendum Pulveri Foliorum *Ficus sylvestris* , utcunque sit in Terra (quod permagni est haud dubio) non in Muro nata , & licèt cautè (quod

Q præcipit.)

præcipit) Foliis Ulmi admixta. — Sed quandoque bonus dormitat Homerus. — Sudores equidem non sunt Paralyseos Causa, sed Effectus: cum enim Materiæ morbidæ *Metastasis* in Genus nervosum facta est, vel Resolutione, vel Convulsione, afficiantur Nervi necesse est. Relaxatis ideò Nervis subcutaneis, per patula nimis & hiantia Cutis Emissaria diffuunt Humores (quod in moribundis etiam eandem ob Causam observatur:) quid quod & Sudores diu post ortam Paralyfin durant. — Mihi certè videtur Corpus reticulare Malpighii (si mavis Ruyschii) eum ob Finem effectum fuisse, ut foret quasi Sphincter universalis Ductibus Sudoriferis, per sua Foramina emissis; dumque constringitur fortiùs (quod Cute Aeri frigido exposita accidit) tota Cutis, Pustulis quasi aspera corrugatur, & Cuticulæ anserinæ instar evadit; dum verò relaxatur nimium, profluunt Sudores. Sed hæc hætenus contra Doctrinam Baglivi.

Post Sudationem Diluentia, præ cæteris autem, Aqua quædam ferruginea, si ea non est, quàm purissima, iterum præscribenda sunt, diuque epotanda; ut corruptæ nimirum nova puraque Materia admisceatur, ut debitus servetur Sanguinis Fluor, & ejus corrigatur Acrimonia. Nec verò intereà omittenda sunt, quæ & imbecillum Stomachum juvant & Viscera confirmant: sic tamen ut subinde assumi debeant Rhabarbarum & Tinctura Sacra, (quæ & ipsa Intestina corroborandi Facultatem habent, eaque expurgant commodè) ne in illis scilicet coirent acres aliqui Humores — Idcirco Pulveres (utì dicuntur) testacei ad hunc Morbum proficiunt, quod acres absorbeant Humores;

res; at nisi Salem Absynthii, aut Tartari fixum admisces iisdem, ac Rheum barbarum, vel *ἐκκοπρωτικά* quædam subinde exhibes, eorum usus non diu continuandus est: ne in Canali Intestinatorum, diu morando, in lapideam penè abirent Duritiem. Quod sanè plus semel observavi, in Puerulo præsertim Aurificis cujusdam, cui, ob *Testacea* plurima exhibita, Alvi Fæces in tantum erant induratae, ut exsiccatum Gypsum planè referrent, illasque ex Ano, ope Instrumenti, necesse esset extrahere. — Hoc de *Testaceis* exhibendis Præceptum, nisi ubi cita Alvus aliquos exercet, perpetuum esse debet. Tutiùs ideò, imò & efficacius longè, ad acidos corrigendos Humores datur Aqua Calcis vivæ tenuissima, maximè idoneis imbuta *Stomachicis*, quæ & Acidum in primis Viis, ac in Sanguine delet.

Quæ ad Dolores *rheumaticos*, expugnandos, cum Morbus Artus invaserit, utilissima probavi, fuere Cinnabarina, Gummi Guaiaci, Tinctura Antimonii, Potiones è Terebinthina, aut è Balsamo Copaybæ, quæ quoque ad paralyticas Affectiones plurimum possunt. Sed ante omnia fere, minuta Calomelanos Dosis, repetita subinde; quod, si octava, vel decima, Vice sublimetur, nobilissimum ad plures Morbos evadit Remedium: idque, ad Grana duo, triave, scilicet, præscripsit eruditissimus noster *Musgravius*, ὁ μαχαρίτης, Asclepiadeæ Familiae, dum viveret, egregium Decus & Ornamentum. — Calomelano frequenter adjicio Camphoræ paulillum, quæ, ex Particulis longè subtilissimis constans, angustissimos Corporis Canaliculos penetrando, Pennasque quasi Mercurio addendo;

Vires ejus intendit maximè. Quinetiam eadem Camphora corrodentem *Mercurialium* Præparationum Qualitatem delenit, earumque Spicula obtundit: quod probè jamdudum novit *Bateus*, eandem, in Præparatione Mercurii præcipitati grisei, Turpetho minerali addendo. Utilissimas quoque *Mercurii alkalizati* Dotes probavi nuper, addo & tutissimas.

Porro ad crudelissimos *Rheumatismi* Cruciatus, eosque diu permanentes inter Scapulas præcipuè, nihil magis prodesse novi quam *Vesicatoria* superimposita; quæ ad Paralyfin etiam præcavendam, eamque, si jam facta fuerit, profligandam, maximè faciunt. Membra autem resoluta, totaque Spina Dorsi, à summis Cervicibus Os Coccygis adusque, Galbaneto Paracelsi (quod apud Cratonem, vel Riverium vide) aut quod, me Judice, melius est, Balsamo Galbaneto Hartmanni perfricanda sunt, adjecta quoque Camphora: habet id utique Vim penetrandi & aperiendi maximam. Estque hoc insuper utile Remedium, ubi Abdomen vehementer extensum est, aut Spasmo maximè contractum: totus autem Venter eo inungi debet post Fomentationem idoneam. At notandum! melius longa & clausa Digestione, quàm Destillatione, (quod vulgò faciunt) præparatur: destillatum siquidem magis *causticum* est, & nonnunquam, si sit tenebrior præsertim, erodit Cutim. At si Umbilicus exoriatur, difficillimè utique sanatur, ac discruciat maximè: quod quoque caveri certè debet, cum Emplastra de Galbano, vel *hysterica* dicta, medio Abdomini admoveantur: Umbilicum nempe obtegendo involuto Serico.

Cum

Cum Dolores colici & rheumatici cessaverint paululum, tum demum uti Cibo pleniore oportet, sed neque inflante, neque valido, ne Viscera adhuc imbecilla lædantur. Conveniunt potissimum *Gelatina* de Sago, è Cornu Cervi raso, seu, quæ facilius paratur, de Pedibus vitulinis, Ova sorbilia, *Panatellæ*, atque id Genus alia, quæ per totum etiam Morbi Decursum, parcius assumpta, ad Vires reficiendas utilia sunt. — Potui verò nihil dari debet præterquam Aqua pura, aut *chalybeata*, Vini albi generosi pauxillo subinde adjecto; nam siue quid flatulentum, siue acidum est, id huic Morbo affectis alienum est maximè: facile enim redire consuevit ex levissimo Diætæ Errore. — Porro ad *Crasin* Sanguinis restituendam, & confirmanda Viscera, *Chalybeata* quædam *Stomachica* idonea sunt maximè: Infusione sequente utor sæpissimè. \mathcal{R} Radic. Gentian — Galang. ana \mathfrak{z} ss. — Zedoar. — Calam. aromat. Cort. extern. Aurant. Hispalens. sicc. ana \mathfrak{z} iiss. Caryoph. Indic. \mathfrak{z} ii. Chalyb. cum Tartaro ppt. \mathfrak{z} iii. hisce affunde Vini alb. Olyssiponensis \mathfrak{z} iiiss. Aq. Absint. Comp. \mathfrak{z} iss. f. Infusio clausa per Dies saltem duodecim, in Vase Vitreo, id sæpius agitando. — Ubi Viscera infirma sunt, & pituitosa Colluvies redundat, maximè conducit hocce Medicamentum, minimè tamen alienum est Stomacho. — Semina Cardui, in Tinctura amara *Chalybeata Lovverii*, ingratum admodum Lentorem fundunt; neque aliquid Gentianæ, præter Nomen, est in Aqua Gentianæ, composita, quam recipit Infusio Lovveriana.

Ultimum in hoc Morbo Auxilium Equitatio. est: neque enim ulla Res Viscera magis & Intestina confirmat. Ea siquidem, vario admodum,

ac frequentissimo Corporis Succussu, totum Abdomen concutit leniter : quicquid adeò Intestinis hæreat, Pressu & Agitatione continua depellit ; quicquid Lentoris in Vasculis sanguineis retardetur exprimit, Circuitum Sanguinis per Vasa *mesenterica* & Venæ Portæ Ramulos promovet maximè, ubi Sanguinis Cursus tardissimus est. Sanguinem itaque partim Vi Morbi, partim longa ibi Mora, concretum fere perpetua velut Conquassatione dissolvit. Obstructiones adeò Glandularum Hepatis, Pancreatis, Mesenterii, Intestinorum : expedit ; porro Actionem Splenis, Jecinori inservientis multum adjuvat. Plurimis denique constat Experimentis ; *Perspirationem* maximè augeri Equitatione ; ita noxios Humores in aliam Partem avertendo, ac per Cutim eliminando, non in hoc solùm, sed & in omni fere Morbo *chronico* prodest. Profectò quos vix operosa Medicina servavit, sola utique Equitatio restituit penitus ; cùm igitur Equo insidere valet Ægrotus, eò gaudeat quotidie, *Viresque acquirat eundo*.

Hæc quæ conscripsi modò de Ratione mendi Morbo colico Damnoniorum, haud malè fortasse accommodari possunt Colice Pictonum dictæ, Indias Occidentales infestanti sæpissimè ; quæ ex eadem fere Causa pendens, nimio næpe Usu acerbissimi Limonum Succi, Curam forsan haud absimilem poscit.

INDEX

RERUM & AUCTORUM,

*In quo numeri intra Parathesin Opusculum
de Morbo colico pomaceo respiciunt.*

A		Pag.		Pag.
A	CETI Vires	146.	Aqua Calcis ad acidos Hu-	
		147	mores	(35)
	Acoſta, Joſ.	vii	Aquæ frigidaꝝ uſus in } 158.	
	Actio Aeris. vid.		Febribus damnatur }	
	Aeris.		Arætuſ Cappadox	65. 66.
				(6)
	Aduſſio Sanguinis. vid. San-		Argeſtes Ventus.	xxvi
	guinis.		Ariſtoteſes	xxvi. xxvii
	Ægineta (Paulus)	(9)	Artuum dolores rheuma-	} 28
	Aer calidus	iv	tici Vomitu ſolvuntur }	
	— & humidus	xvii.	Aſclepiades	xxii
		40	Aſthmatiſ medela varia	26
	— ſiccus	xix	Atmoſphæræ Pondera varia	
	— frigidus	iv. vi		viii
	— & humidus	xii	— Preſſura,	} viii
	— ſiccus	xi	Antagoniſta Cordis }	
	— gravis & elatiſticus	iii. vii	— Motum	} viii
	— humidus pervadit cutim	19	Sanguinis promovet }	
	— levis	iii. vii	Auguſtus Cæſar, & Divuſ	5
	Aeris Actio in Pulmones	ii. vi	Auluſ Gelliſ, vid. Gelliſ.	
	— Effectuſ in Corpora no-		Aurelianuſ, Cæliuſ	xxii. 19
	ſtra	ii	Aurora borealiſ anomala	119
	Africuſ Ventuſ	xxvii	— inſolita	13
	Angina epidemica	56	— magna	27.
	Aphthæ	159		134

I N D E X.

Pag.

Aurora borealis maxima 126
 ———— mira 134
 ———— rubra vel sanguinea 138
 Autumnales Morbi. vid. Morbi.
 Autumnus maxime morbosus xxiii

B

B Acon (Rogerus) 146
 Baglivi (Georgius) 52, 63. (33)
 Ballonius (Gul.) 52
 Balnei emollientis in }
 Colica & Nephritide Usus } (31)
 Balneum frigidum ad intermittentes 25
 Barometri maxima depressio 102
 Bateus (Georgius) (36)
 Bilis atra & æruginosa unde (19)
 ———— quos }
 ———— maximè infestat } (20)
 ———— atræ & æruginosæ }
 Acrimonia summa } ibid.
 ———— Species variæ (22. 23)
 Boars (immensi Maris fluctus) 18
 Boerhaave (Hermanus) iv. 67. 145
 Boyle (Robertus) xviii

C

C Adaverum putrefactio citissima 106
 Cælius Aurelianus. vid. Aurelianus.

Pag.

Calomel (35)
 Camphora 157. (36)
 Carneades Academicus 24
 Cathartica cum Anodynis (29)
 ———— ad Febrem secundariam Variolarum } 37
 ———— ad finem Febris lentæ } 161
 ———— nervosæ }
 ———— frequentia ad Colicem } (22. 32)
 ———— necessaria }
 Caurus, vel Corus, ventus xxvi
 Celsus (A. Corn.) xii. xxi. xxiii. 2. 19. 20. 24. 64. 66. 147 (22. 29. 20.)
 Cheyne (Georg.) 21
 Cicero (M. Tull.) 147
 Circius, ventus 5
 Cœli mira facies. vid. Aurora. rubr.
 Colices Differentia §1. §2
 ———— epidemicæ Causa (11) Descriptio §. &c.
 Comte (Lud. le) xvi
 Condensatio sanguinis. vid. Sanguinis.
 Congelatio unde xiv
 Constitutio Aeris ad }
 Contagium aptissima } 40
 ———— ad Pustulas aptiss. 116
 Cordis Antagonista viii
 Corpus humanum $\kappa\alpha\tau\alpha\lambda\upsilon\sigma\iota\varsigma$ $\sigma\iota\sigma\tau\iota\upsilon\sigma\iota\varsigma$ xiii
 ———— reticulare Malpighii (34)
 Cortex

I N D E X:

	Pap.		Pag.
Cortex Peruvianus	21. 109	Febris anginosa	92
Corus. vid. Caurus.		—— catarrhalis	38. 80
Cucurbitulæ utiles in Pleur-		—— hyemalis catarrhalis	
tide	64		127
Cyrillus (Nic.)	40	———— epidemica un-	
		de	138. 139
D		—— intermittens	Origo
			20
Delirium in Colica (7)		—— lenta nervosa	139
Dilutio in Colica ne-			147
cessaria (32)		—— maligna contagiosa	
Dioscorides (Ped.) (30)			104
Duretus (Lud.)	52	—— putrida epidemica	32
		Formula Vomendi (27)	
E		Fotus emollientis in Colica	
		Ufus (30. 31)	
Emeticorum in Colicis		Freind (Job.)	37
Necessitas (26)		Frigoris Gradus, quo	
—— Utilitas 21		Glacies producitur	xvi
Epispastica proficua in Febri-		—— suscepti Causa	xiii
bus nervosis	156		
Equitatio laudatur (38)		G	
Essentia Antimonii	140	G ALBANET. Hartmanni	(36)
Eurus, Ventus	xxvi	—— Paracelsi	(36)
Exhalationes Terræ Gelu si-		Galenus (Claud.)	xiii. xx.
stuntur	17		(23. 30)
Excretio liberalis in		Gellius (Aul.)	xxvi, xxvii. 24
Peripneumonicis Vēæ	52	Gelu	xiv
Sectione non eget		Glacies non ab eodem	
F		constanter Frigoris	xvi
		gradu	
Fahrenheit (Dan. Gabr.)	xiv	Globuli Sanguinis rubri	22
Favorinus	xxvi. xxvii	Globus igneus in Aere di-	
Febrem inter ardentein		splosus	139
& lentam nervosam	152	H	
Differentia		H Æmorrhagia in Ictero	
Febres intermittentes	10	pestifera	142. 143
—— lentæ quando & unde		Hales (Steph.)	viii. xviii. 19
	117. 149	Harris (Gualt.)	76
Febriacula catarrhalis	9. 38	Hel-	
	136		

I N D E X:

Pag.

Helvetius (Joh. Claud. Hadrian.) iv
Hippocrates i. ii. xii. xiii.
xx. 33. 52. 63. 64. 66.
(6. 10. 15. 22. 29.)
Hoffman (Frid.) xv
Homberg (D.) xvi
Horatius, Flaccus (Q.) xxvii.
24. (12)

I

Icterorum Morborum
Diversitas 142. 143
Ictero Remedium optimum
144
Infusio amara Martiata (37)
Instrumentorum ad }
Observationes me- } xxvi
teorologicas Situs }
Iris Lunaris 135
Jurin (Jac.) xxv. 22

K

KEILL (Jac.) xiii. 19

L

LIBS, Ventus xxvi
Lucretius, Carus (T.)
xx. 3
Lullius (Raym.) 145. 147
Lumen boreale. vid. Aurora
bor.

M

Maris Æstus maximus un-
de 17
Martialis (M. Val.) xxix
Mayovv (Joh.) xiii
Mead (Ric.) 37

Pag.

Mixtus quid (30)
Mercurialia Medicamenta 21
Mercurii Depressio maxima
101. 102
Methodus Alvum purgandi
in Colica (34. 35)
Molyneux (Gul.) xxvi
Morbi autumnales xix
Musgravius (Gul.) (35)
Musti (pomosi) Natura (13)
———— plurima Muci-
lago (13. 15)
———— maxima Vis
———— Tartari (14)
———— Qualitas noxia
(15)
———— sapo-
nacea (16)

N

Newton (Isaacus) xvi
Nitrum aereum xvi
Notæ, quæ in Opere }
passim occurrunt, } xxix
explicantur }
Nubecula mira coruscans 27

O

OVidius, Naso (Publ)
xxvii

P

Paralysis in Colica poma-
cea sæpe (7)
Pecora Morbis epi- }
demicis sæpe corri- } 3. 4
piuntur priusquam }
Homines }
Peripneumonia valde epide-
mica 56
Per-

I N D E X

Pag.		pag.
Perfius, Flaccus (Aulus) xxv.	Rheumatici Dolores } pag.	
Perpiratio quibus auge- } fere séper accedunt } (7)	Colicæ pomaceæ. }	
tur, & quæ inde com- } ix	———— quibus }	
moda }	Remediis }	
Pertussis Puerorum 75	proffi- } 140. (31)	
Petechiæ unde 106	gantur }	
———— fusca 105	Riolanus (Joh.) 66	
Phthisici plures mortui 84	Riverius (Laz) (29)	
Pleuripneumonia 66	Roris Origo 132	
Pleuritis valde epidemica 56	Rufus Ephesus (30)	
Pleuritidis & Peripneumo- 65	Ruris Laus xviii	
niæ Differentia 65		
Plinius (Caius) xxvi. 146. 147	S	
Plymuthi Situs xxvii		
Poma nunc Alvum }	SAL atmosphæricus xxiii	
solvunt, nunc } (12. 13)	———— nitro-aereus xiii	
astringunt }	Sala (Angelus) (14. 15)	
Pomatii defæcatio (23. 24)	Sanctorius (Sanctorius) xxiii	
Pomatium ad Scorbutum	Sanguificatio fit in Pul- }	
optimum (24)	monibus maximè }	iii
Procella permagna & longa 88	Sanguinis Adustio quid ?	xix
Prophylactica methodus in	———— Circuitus per Pul-	
Autumno xxiii	mones viii	
———— per Tem. }	———— Condensatio in	
pestates } 22, 23	Pulmonibus v	
humidas }	———— Globuli rubri 22	
———— frigiditas vii	———— Serum viridissi-	
ueri rariùs Colica po- } (9)	imum (21)	
macea corripuntur }	Saponaceorum Medicami-	
ulv. testaceorum lon- }	num Usus 144	
gus Usus improba- } (35)	Schema Ventorum. vid. Ven-	
tur. }	torum.	
ustulæ erumpentes }	Seneca (L. An.) (xxvi. xxvii. 5	
Colicam solvunt } (8)	Societas Edinburgensis xxv	
	Spouts, immensæ Co- }	
R	lumne seu Cataractæ }	18
Respiratione (de) pauca ii	Aquarum }	
henani Vini & Pomatii	Succus nervosus Medium est	
Comparatio (14)	Sensationis 154	
	Sudores solvunt Colicen. (7.	
	33)	
	Sudo-	

I N D E X:

Sudores non faciunt Paralyfin. (34)
 Sydenham (Tho.) xxi. 33.
 75. 138. 140. 160. (21. 23)

T

Tartari maxima Vis inest
 Pomaceo (14)
 — Terra foliata 144
 Tempestas frigidissima 54
 Tournefort (Joseph.) Pitton.) xvi
 Tullius, vid. Cicero.
 Tusses frequentissima 8
 — Puerorum convulsiva 75.
 Tussis laboriosa cum }
 Febre epidemica } 30. 55

V

Variolæ epidemica 37
 — maligna 35. 36.
 103
 Varro (M. Ter.) xxvi
 Venæ Sectio non æquæ }
 {convenit in omnibus } xxii
 { Tempestatibus }
 — non conve- }
 nit plerumque } (25. 26.)
 in Colica po-
 macea

Pag.
 Venæ Sectio celebrari }
 debet ante O. } (26)
 pii Usus }
 Ventorum Nomina xxvi
 — Schema ex Plinio xxvi

Ventriculi Collu- }
 vies Vomitione } 25. (28)
 optimè purga- }
 tur }

Vibices 105
 Victus Ratio in variis Tem-
 pestatibus xxiii
 Virgilius, Maro (P.) xvii
 xxvii
 Vitruvius (M.) xxvi
 Vomendi methodus 23. (27)
 Vomitus perutilis Colicis (26)
 Vomitionis utilitas plurima 24

Vomitus viridis unde (21)
 Urinæ Difficultas à Ve- }
 teribus observata in } (6)
 Colicis }
 — pessima 105

VV

Waldschmidt (Joh. Jac.) 76

Z

ZENO 34

OBSERVATIONUM
DE AËRE
ET MORBIS EPIDEMICIS

VOLUMEN ALTERUM;

Ab Annī nimirum Initio MDCCXXXVIII.
ad Exitum usque MDCCXLVIII.

AUCTORE

JOANNE HUXHAM, M.D.R.S.S.

Δεῖ δὲ καταμανθάνειν ἅ κατὰ τὰς ἱστ. Ὁρέων ἀκριβῶς, καὶ τὰς
Νούσων ἐκείνην. Hippocr. de Dieb. judicator. Initio, item,
Lib. 3. Epidem. Sect. 3.

EDITIO PRIMA VENETA

Juxta ultimam LONDINENSEM.



VENETIIS, MDCCCLXIV.
Apud LAURENTIUM BASILIUM.

Superiorum Permissu, ac Privilegiis.

PRÆFATIO.

Perfeci tandem Observationum de Aere & Morbis Epidemicis Volumen alterum (ab Initio scilicet Anni 1738. ad Exitum usque 1748) in quo quidem eodem usus sum Ordine, atque Notis, in priore descriptis *.

Quàm fuerunt plena Laboris hæcce Opera solus ille norit, qui talia conscripserit — Lubentiùs autem secundùm hoc Opus suscepi, quòd & prius Publico bene acceptum perceperim, & mihi porrò, id meditati, haud inutile — Dum enim Cœli atque Aeris Mutationes notarem diligenter, variosque Morbos has consequentes, eorum sanè Causam, ac Naturam, multò meliùs dignoscebam; quales enim Tempestates, tales etiam sunt Morborum Constitutiones; sicut notavit olim Hippocrates †, & fida dudum docuit Experientia — Multus ideò est divinus Senex in præcipiendo diligentem Aeris atque Tempestatis Observationem, optima quinetiam dedit Exemplaria, præcipuè in Libro primo & tertio Epidemicorum.

Hujus etiam Laboris aliud mihi fuit Incitamentum, quoniam scilicet Observationes hujusmodi,

* Porro in Volumine 2. notavi, quolibet Mense, Diem novæ, necnon plenæ, Lunæ — Hic obiter monebo, quod nota Pluviæ Quantitas Anni 1737. (Vol. 1.) fuit tantum Dig. Dec. 364. non, ut falsò imprimitur, 36. 70. † Lib. de humorib. Sect. 7.

modi, quæ per longam Annorum Seriem, uno eodemque Loco factæ sunt, melius longè istius Regionis *Atmosphære* Constitutionem, Morbos vulgares, eorum Successiones, Relationes, imò & curandi Rationem, ostendunt, quàm si per unum solummodò, alterumve Annum detur Historia: monet ideò rectissimè clarissimus *Ramazini*, “ Nil foret in Arte medica utilius, “ quàm succedentes sibi ad invicem Constitu- “ tiones conferre, ut recta medendi Methodus “ institui posset, quoties eadem Tempora, ac “ iidem Morbi, recurrerent * “ — Paulò etiam ultrà processit expertissimus *Hoffman*, hortando nimirum ardentè “ Omnes & singulos Medico- “ rum cordatiores, quibus Curæ Cordique Sa- “ lus Hominum est, ut in annotandis Morbo- “ rum Historiis, si epidemii Morbi grassantur, “ & diligentissimi & accuratissimi sint; & quif- “ que in suo Loco Temporum & Tempestatum “ præcedentium, & præsentium, Constitutio- “ nem, item in Barometro Mercurii Motum, “ ac Gradum Caloris ex Thermometro, simul “ adjiciant, integrasque & plenas Historias cum “ Methodo curandi & Eventu exhibeant †. “

Nostram profectò ad Vitam sustentandam om-
nium maximè necessarius est Aer, cæteris utiquè
per plures Horas carere possumus, hoc ne vel
Tempore quàm brevissimo — An igitur purus sit,
vel impurus, summi procul Dubio est Momenti,
ejus.

* Constitut. epidemic. urban. 1691. ipso Initio. † *Frid. Hoffman. Medicin. rational. Systemat. Edit. Francofurt. 4. 9. Vol. 1738. Patholog. general. Part. 3. Cap. 7. p. 430. Tom. 2º.*

ejusque adeò bonas, necnon pravas Qualitates*, probe perdiscere debet Medicus. — Aeris autem Nomine hic volo Terræ *Atmospharam*, non merum, uti dicitur, Elementum; quæ cum ex variis admodum Rebus componatur, variis etiam Modis officere nobis, ac proficere, potest. — Diversæ ergo hujus Constitutiones, tum ad Sanitatem tuendam, tum ad Morbos depellendos, assidue sunt observandæ.

Res erit Exemplo clarior. — Sicca valdè & frigida Tempestas, perflante diu Borea, aut Aquilone, Corporis Habitum constringit, Fibras roborat, Vascula arctiora & fortiora facit, Humores etiam magis densos; porrò Globulos sanguineos accumulât, & compingit validè; *Celsi* Verbis, totum Corpus spissat, & mobilius atque expeditius reddit; ideòque, ex *Hippocratis* † Opinione, omnium Ventorum Aquilo est saluberrimus. — At si diutiùs talis perstat Tempestas, solida fiunt stricta perquam, & *elastica* nimis, Fluida verùm crassa valdè & glutinosa, imò ad Vascula minutissima permeanda multò minùs idonea; namque non tantùm Humoribus inducit Lentorem, ad Inflammationes aptum, sed & ita quoquè condensat rubros Sanguinis Globulos, ut difficillimè per ultimos Arteriarum Ramusculos promoveantur: duros nempe plus æquo, & haud facilè Formam rotundam in oblongam mutant ad Transitum scilicet faciliorem; cum & jam etiam ipsæ *Arteriolæ* à Frigore coarctantur & Distensionem resistant plurimùm. — Hinc Obstructiones;

A 3

hinc

* Haud pauca de his dixi in Prolegomen. ad Vol. I. de Aere, &c. † Lib. de Morbo Sacro, Sect. 15. Edit. *Johann. Linden Lugdun. Batav. 2. Vol. 8. 1665.*

hinc Inflammationes, Pleuritides, Peripneumoniae, Anginae, Rheumatismi, Morbi denique, qui à crasso, viscido, ac inflammato Sanguine pendunt, prævalida Vi Cordis & Arteriarum adacti: quò magis etenim arctantur à Frigore Vasa, quò magis *Atmosphæra* comprimuntur Pondere, eò velocius, cæteris paribus, moventur contenti Humores, unde Frictio major, ac proinde Calor; quæ tandem Sanguinem incrassant & condensant maximè — Certa hæc sunt omnia & constantia, Sanguis enim, tali perdurante Aeris Constitutione, densus est admodum, atque glutinosus plerumque, vel si è Sanissimis emittitur, multò magis ubi Febris accedat.

Verùm enimverò nec protinùs oritur morbidus hic Lentor, nec in omnibus, fit namque gradatim, cum diu nimirum regnaverit aquilonia & sicca Tempestas, neque enim interest quales Dies sint, sed & quales etiam antè præcesserint. — Atqui laxis nimium & pituitosis Hominibus adeò non nocet hæcce Constitutio, ut vel sit apprime utilis, firmos hos magis, ac vegetos, efficiendo; una sic Natura, Præceptore optimo notante*, ad Hyemem, alia ad Æstatem, bene aut malè se habet. — Hinc insuper esse videtur quòd una Febris *epidémica* fortibus est funesta & robustis, parcitque imbecillis, alia verò, sub humido tepidoque Cœlo nata, in hos teneros maxime sævit. — Ex magnis igitur *Atmosphæra* Mutationibus vel mutatur maximè Morbus popularis, vel supprimitur prorsus; quòd persæpè videmus.

Ad Mala autem sicca & frigida Tempestatis præ-

* Hippocrat. Aphorism. 2. Sect. 3.

præcavenda (imò & tollenda) utendum est multa, diluente, emolliente, tepida Potione, Viæque molli & relaxante, neque unquam antè progredi quis debet quàm tepidum aliquem Potum assumpserit, sive Pedibus, sive Equo, eundem est contra Ventos aquilonares; at si inhorrescat aliquis indè, ac febricitet, mittendus est actutum Sanguis, potissimum si Thoracis, aut Lateris, Dolor impetat; idque sanè mox repeti debet si Febris invalescat—Hoc utiquè perpetuum est quòd Sanguis nunquam tutiùs, aut feliciùs, in Morbis acutis mittitur, quàm frigidas inter & siccas Aeris Constitutiones, altiùs perstante *Barometro*: nec in Pleuriticis solùm & Peripneumonicis consentaneum hoc est, sed in aliis plurimis, utpotè *Variolis*, *Morbillis*, *Rheumatismo*, *Colica*, &c.—imò in ipsis Febribus intermittentibus, quotidianis putà, ac tertianis, opportuna tunc sæpe est Venæ Sectio, per Initia saltem, ex facili aliter in continuas ardentes, aut *inflammatorias*, haud rarò mutantur.

E contrario, humida tepidaque *Atmosphæra* *κατάστασις* Fibras relaxat nimium, Vim Vasorum enervat, Sanguinem debito solutiorem, pituitosum, inertem facit, totumque Corpus hebes, humidum, languidum, Febribus lentis, putridis, intermittentibus longis, obnoxium——Hic ergo contraria prorsus Diæta, atque Medicina, est adhibenda; quæ solidas Corporis Partes firmare, quæ Fluidorum *Crasin* conservare, quæ validè compingere Globulos sanguineos possint, indicantur; Potus nempe subausterus, frigidus, generosus, Viætus valentior, desiccans, astringens, Balneum frigidum, ejusque Generis alia.—Ad hujus autem Constitutionis Febres parùm utiquè

confert Sanguinis Detractio, quinimò nocet admodum, si sit effusior, oriuntur namque ab imminuta Cordis & Arteriarum Potentia, à laxa nimium Sanguinis Textura, & lentefcente Lympha; tendit hinc ad *Stasin* atque Putredinem Liquidum Vitale, unde Febres intermittentes, lentæ, putridæ, malignæ, hujus Tempestatis semper sunt Soboles; in quibus quidem curandis, quæ Vires foveant desiderantur, quæ minuant neutiquàm — Sæpissimè etiam, dum talia permanent Tempora, quotidianæ, ac tertianæ, in longas continuas putridas Febres degenerare solent, haud levi cum Ægrotantium Periculo, quas si tandem effugiant, in Icterus, atque Hydropem, incidunt plerumque. — Nunquam profectò citius, neque felicius, restituuntur Ægrotantes, quàm sudo effulgente Cœlo, alrèque in *Baroscopio* stante *Mercurio*; hoc ego observavi constanter, idemque olim notavit percelebris *Frid. Hoffmannus*, in Medicina faciunda diutissimè versatus, lentissimè contrà convalescunt, dum nubilus perflat ac pluviosus Auster.

Cæterum & haud parum insalubris est gelidus humidusque *Atmosphæra* Status, multis quippè Modis obest, præcipuè frigidos insinuando in Corpus Humores, atque *Perspirationem* inhibendo plurimum* — bene tunc nobis cingendum est Vestibus, luculento etiam Foco, debitoque Vitæ Regimine, ab algidis Vaporibus, quantum possibile, cavendum est; omnibus denique Modis *Perspiratio* est promovenda, inter quos frequens
totius

* Vel paucæ subitanæ Nubes sub fervido Cœlo *Perspirationem* impediunt plurimum. Vid. Observat. accuratissimæ *Job. Lining*, M. D. *Philosoph. Transact.* N. 470.

totius Corporis Frictio ad Ignem confert plurimum, necnon Exercitatio quotidiana *, eaque etiam paulò fortior.

Semper adeò pugnare debemus contra peculiarem Aeris Intemperiem.

Eluceant magis forsan, quæ dixi suprâ, si Morbos *endemicos* perpendamus; horum namque Pars longè major haud Dubio nascitur à singulari cujusque Loci, ubi infestant, *Atmosphærâ* Depravatione; in Locis videlicet cavis, palustribus, uliginosis, grassantur semper Febres lentæ, putridæ, intermittentes, irregulares, quæ nullis ferè cedunt Remediis, nisi mutato prorsus & Loco & Aere, ibi quoniam *Atmosphærâ* humidis perpetuò & noxiis abundat Vaporibus, qui Vim Fibrarum debilitant, *Perspirationem* supprimunt, corrumpunt Humores — idcòque si quis Advena, udis in his Locis, crassoque versatur Aere, per Dies vel paucissimos, certò ferè certius ægrotabit — si retentum namque *Perspirabile* nec per Alvum, nec per Urinam, neque per ipsos Cutis Meatus, intra perbreve Tempus expellitur, Febris † mox creat plùs minùsve; eòque fit gravior, quò major fuerit retenti Quantitas, quò acrior Qualitas ejusdem ‡. — Æstate igitur, vel Autumno, magno dum Calore acriores multò facti sint Humores, intercepta *Perspiratio* maxime hocet.

A 5

Con-

* Quantum promovet *Perspirationem*. Vid. elegantissima Experimenta *Georgii Rye*, Armigeri, in *Medicina Statica Hybernica*; ad Calcem Libri Doctis. Doct. *Rogeri* de Morbis epidemicis.

† *Sanctorii* Aphorism. 11. Lib. 1.

‡ ————— 46. ibid. — 35. Sect. 2.

Contrà qui Montes habitant aridos, Aquilonem spectantes, Febribus *inflammatoriis*, Pleuritide, Peripneumonia, Angina, affliguntur plurimùm: Has utiquè in Locis editioribus frigidis, Septentrioni expositis, crebrò notavi esse perfrequentes, cum per Valles autem rarus fuerit admodùm aliquis Pectoris Morbus—Quid quod & interdum vidi Febrem *Catarrhalem epidemicam*, *Pleuro peripneumoniæ* Naturam induisse per Loca montosa & algida, dum in humilioribus ad lentam proximè (seu *nervosam* ut dicitur) Febrem accessit—Hinc equidem haud obscura videtur Ratio, cur uno, eodemque, regnante Morbo populari, variis in Locis, diversus celebratur Modus medendi.

Sed & hìc quoque Ratio Ventorum habenda est plurimùm, *Atmosphæram* quippe maximè mutant: Boreas nimirùm siccam, frigidam, ac ponderosam, facit; Auster verò humidam, levem, atque tepidam: magnam adeò Vim habent Loca reddendi salubria vel insalubria, & diverso planè Modo afficiuntur Incolæ, hoc perflante, vel illo, Vento—Qui frigidis ergo læduntur & siccis, humectare, ac tepida subinde Potione fovere, Corpora debent, qui humidis, siccare; semperque peculiari Aeris Inclementiæ Victu, Regimine, atque Medicina, obsistendum est—Neque hoc solum, sed & noxios adversus Ventos, quantum fieri potest, muniendum est, Ædificia scilicet extruendo sic, ut quàm minimè sint objecta Flatibus perniciosis—Pestilentia quondam, Corcyraë grassanti, occurrebat *M. T. Varro*, occlusis Fensistris Austrum spectantibus, aliis ad Arctum apertis*
—Ma-

* *Varro* Lib. 1. Cap. 4. inter Scriptores de Re rustica, ex Edition. *Gesneri*, *Lipsiæ*, 1735. 2. Vol. 4.

—Magna sanè fuit Præscorum Diligentia in Ædificiis condendis & Oppidis, ut prospera foret Incolarum Valetudo; Viscera etiam Animalium, iis in Locis pascentium, ubi Ædes ponere statuebant, sedulò perscrutabantur, an nempe sana essent, vel insana; atque ita prospiciebant futuræ Habitantium Saluti, omnibus Modis quærentes Salubritatem* —Nunc verò Dierum, in Ædificationibus, plerumque pluris æstimatur Lucrum atque Mercimonium, quàm Salubritas —de quibusdam herclè, ut de Mitylene olim *Vitruvius* †, verè dicendùm est, “Auster cum fiat Homines ægrotant, cum Corus, tussunt, cum Septentrio, restituntur in Sanitatem, sed in Angiportis & Plateis non possunt consistere propter Vehementem Frigoris” —Haud pauca Ædificia quidem in Convallibus paludosis ità malè locata sunt, ut nunquam non Morbis infesta sint; quorum Possessoribus utiquè Consilium commendo laudat *Varronis* ‡, “ea vendant quot Assibus possint, aut, si nequeant, relinquunt.”

Sed hæc obiter; qui vult plura de Situ Locorum, adeat magni *Hippocratis* Librum de *Aere, Aquis, & Locis*; porrò Librum secundum de *Dietâ*, ubi etiam de diversorum Ventorum Natura —perplurima certè in his lectu sunt dignissima.

Quanquam aliquæ Febres *epidemicæ* à Contagione ducant Originem, oriuntur attamen plures ab Intemperie Aeris manifesta, neque enim probabilis magis videtur communis Morbi Causa, quàm

* *Vitruv.* Edit. *Philandri*, 4. Lib. 1. Cap. 4.

† ————— id. Lib. 1. Cap. 6.

‡ *Varro* de *Re rustica*, Lib. 1. Cap. 12.

quàm ipse Aer omnibus communis—Per humidas equidem tepidasque *Atmosphæra* Constitutiones, permanentes diu, Febres lentæ, putridæ, malignæ, semper grassantur, sicuti observavit tota Medicorum Schola ab ultima Antiquitate ad hoc usque Tempus; nec profectò cessant tales nisi omninò mutata Aeris Temperatura, quod etiam sæpe supprimit brevè ipsas contagiosas:—imò ipsæ Pestilentia ut plurimum occurrit sic cum Frigus hybernum; frequenter autem nimis, sub humido calidoque Cœlo, Vim maximam accipit.—Atque Ego quoque novi sæpius Febres putridas, malignas, per ætuosam ac nebulosam *Atmosphæram*, tum Vi, tum Numero, auctas maximè, mox tamen sicco flante Borea gelidoque, extinctas penitus—Imò ipsæ Procellæ sæpe juvant admodum morbida dissipando *Miasmata*: haud minùs corrumpitur stagnans Aer, quàm Aqua stagnans, quæ citò, nisi movetur subindè, putrescit.

Quidam insuper Morbi singulis Anni Tempestatibus respondent, Pleuritides nempe, Peripneumoniæ, Anginæ, tertianæ Febres, Tempori verno, Autumno autem quartanæ, putridæ, malignæ, Cholera, *Dysenteria*; quod nimirum solita, istis Temporibus, Aeris Dispositio his producendis Morbis, aut illis, faveat—Atqui si in tempestivè se habuerint Tempestates, Morbi proinde variabuntur maximè ita ut isti, qui Autumno sunt proprii, per calidum humidumque Ver dominari possint, per Autumnum verò frigidum Febres Veri magis peculiæres, utpotè Pleuritides, Peripneumoniæ *, &c.—Sed plerumque in Fe-

bribus

* Hippocrat. Lib. de Humor. Sect. 7.

moribus autumnalibus, qualescunque sint, Humores longe magis ad Putrescentiam tendunt ob prægressum Æstatis Calorem, nec adeò largum admittunt Sanguinis Dispendium. — Suppressa, ex suscepto Frigore, *Perspiratio* Vere Febres inflammatorias, Autumno putridas plerumque, aut magnas, generat* — imò si, per Autumnum inficiant Alvi Fluxus, multò magis acres sunt, aciliores, quàm Tempore verno, ut satis superque Medicis notum est — Æstatis siquidem Ardor *Perspirationem* auget maximè, Corporis humidissima diffilat, Sales Oleaque animalia exasperat, inde nascitur sensim magna Sanguinis Acrimonia; quæ ad Autumnum usque increscit, nisi diluentibus idoneis, atque demulcentibus, temperatur quotidie.

Sed audi de his Rebus Cum Oraculum †, Naturæ Interpretem: — “Omnium Generum Morbi profectò omnibus Temporibus fiunt; quidam verò in quibusdam magis gignuntur, & exacerbantur, *Aphor. 19. Sect. 3.* — Qualia Tempora (Ὠραι) tales Morborum Constitutiones — Tempora tempestitiva, & bene ordinata, Morbos regulares (εὐσαθείας) & iudicatu faciles faciunt. *Lib. de Humorib. Sect. 7. & Aphorism. 8. Sect. 3.* — Atqui, prout variaverit Tempus, similes, aut dissimiles erunt Morbi, “ qui

* *Sanctor. Aphor. 35. Sect. 2.* † Citavi plerumque *Hippocraticam* ex Editione *Lindeni*, non quòd hanc valdè præferam (nam *Foesianam* huic longè ante fero) sed quia *Textum Hippocraticum* in varias distribuit Sectiones; quo facilius inveniuntur Loca citata.

“ qui in hoc oriuntur , Lib. 1. de Humor. Sect.
 “ 7. — Conversiones Temporum * (Anni) maxi-
 “ mè pariunt Morbos , & in ipsis Temporibus
 “ magnæ Mutationes, Frigoris putà , aut Calo-
 “ ris; & sic de cæteris, *Aphorism.* 1. Sect. 3. Lib.
 “ de Humorib. Sect. 8. — Constitutiones Hominum
 “ aliæ ad Æstatem, aliæ ad Hyemem, benè aut
 “ malè se habent, Morbi porrò ad Tempora ,
 “ *Aphor.* 2. 3. Sect. 3. Lib. de Humor. Sect. 8.
 “ — In Anno autem aliquando Hyems maximè
 “ prævalet, aliquando Ver, modò Æstas, modò
 “ Autumnus, Lib. de Natur. Homin. Sect. 16.
 “ — Hyeme Pituita in Homine augetur, ibid.
 “ Sect. 12. — Vere Pituita magis dominatur, at
 “ Sanguis increfcit, ibid. Sect. 13. — Æstate San-
 “ guis adhuc viget, sed & Bilis exaltatur; per
 “ Æstatem etiam, ac Autumnum, Bile Corpus
 “ abundat; Autumno autem atra Bilis plurima
 “ est & fortissima, Sanguis verò parcissimus,
 “ ibid. Sect. 14.

Quicunque Morbi Hyeme augescunt, Æstate
 cessant, qui per Æstatem increfcunt, desinunt
 Hyeme, Lib. 3. *Epidemic.* Sect. 3. & de Natur.
 Hominis, Sect. 17. — Sin autem diu productam
 Hyemem insequitur Ver perfrigidum, hyberni
 fiunt Morbi, Tusles, Peripneumonix, Anginæ:
 — quinimò si Ver processerit More Autumni
 Morbum regium producit, licèt propriè sit Mor-
 bus autumnalis, Lib. de Humor. Sect. 7. — Siqui-
 dem verò hæc, vel illa, Anni Constitutio dura-
 verit diutiùs, Morbi huic congruentes diutiùs
 quo-

* Ἡ Μεταβολαὶ τῶν Ὁρέων.

quoque permanebunt, atque eò erunt fortiores, quò magis prævaluerit & perduraverit Tempestas peculiaris; etiam & communissimi grassabuntur, & perlongo Tempore perstabunt, *Aphorif. 7. Sect. 3. Lib. de Humor. Sect. 9.* — Ex Anni Constitutionibus Siccitates (*Αὐχμοί*) sunt pluviosis salubriores, ac minùs lethales, *Aphor. 15. Sect. 3.* — Etsi per magnas Siccitates Febres acutæ, *ibid. Aphor. 7.* — Sed in valdè pluviosis Febres longæ, putridæ, Alvi Fluxiones, Anginæ, Apoplexiæ, *ibid. Aphor. 16.* — Austri Caput gravant, Corpus dissolvunt, & humidum, languidum, hebes faciunt* — Aquilo Tussim movet, Fauces exasperat, Ventrem astringit, Horrores excitat, item Dolores Lateris & Pectoris, attamen Corpus compactum, firmum, agile reddit, & benè coloratum, *ibid. Ap. 5. 17.* — & *Lib. de Humor. Sect. 8.* — Aquilo enim omnium Ventorum est maximè siccus, atque ideò saluberrimus; Auster verò quoad omnia huic contrarius, *Lib. de Morbo Sacro Sect. 15* — Si Hyems sit moderata, nec valdè mitis, nec valdè frigida, Vere porrò, ac Æstate, tempestiva decidat Pluvia, Annum esse saluberrimum consentaneum est *Lib. de Aere Aquis & Locis, Sect. 25.* — At si sicca sit Hyems, atque aquilonia, Ver autem pluviosum, & australe, erit Æstas Febribus abundans; nam Æstu mox accedente, non potest fieri quin acutissimæ Febres perplurimos invadant, præcipuè pituitos₂

* *Νότος χαρνακικός*, ideò aptissimè hunc plumbeum vocat *Horatius*, *Lib. 2. Satyr. 6.*

fos, Dysenteriae verum Mulieres & Viros humidiores, ibid. — Atqui si circa Caniculæ Exortum accedunt Pluviae, frigidique Aquilones*, Species Cessationis est, necnon Autumni salubris, ibid. Sect. 26. — Si quando Æstatem pluviosam, atque austrinam, similis sequitur Autumnus, plurimos Morbos excitat Hyems — Siccæ autem Æstati, Boreaue perflatae, pluvius, & australis, succedens Autumnus, Hyeme producit Capitis Dolores, Cerebri Corruptiones†, Gravedines, Raudedines, Tusles, imò & Tabem, ibid. Sect. 28. — Quòd si aquilonius sit Autumnus & siccus, neque Pluviae sub Cane, nec vel sub Arcturo, decidunt, confert equidem pituitosis, humidis, ac Mulieribus; biliosis verò nocentissimum est, quod humidissima Corporis dissipat, crassissima autem & acerrima relinquit, ibid. Sect. 29. — Medicus ideò sic Morbis occurrere debet, ut respiciat semper cum Hominum Constitutiones, tum etiam varias Tempestatum Mutationes, contraria nempe contrariis curando; oportet igitur laxa nimis constringere, solvere stricta, Lib. de Natur. Hominis Sect. 17. 18.

Nec tantum reverà diversos diversarum Tempestatum Morbos descripsit optimè divinus Senex, sed optimum quoque Regimen, atque Medicinam, ad hos præcavendos, ac curandos, præscripsit, præcipuè in Lib. de Salubri Victus Ratione, necnon per Initia Lib. 3. de Dieta — Sed ista
jam

* Καὶ χειμῶν ἡ οἱ Ἐτίσιαι.

† Σφακέλους τοῦ Εὐγεφάχου.

iam nunc perscribere longum est — Hæc pauca verò passim ex Scriptis *Hippocraticis* excerp-
psi, & paulò forsan transtuli liberius, cum eo-
tamen (ni fallor maximè) ut Sensum semper
Auctoris tradiderim fideliter — Sed propius ad
Fontes accedite, Medici Tyrones, atque hau-
rite affatim, percipietis indè quàm sagax,
quàm admirabilis fuit Priscorum Diligentia —
videbitis utiquè non minùs ingeniosam fuisse
antiquitùs Observationem, quàm nunc Ratio-
nem; ut pulchrè de Veteribus olim dixit *Ca-
lus Plinius*, *Histor. Natural. Lib. 18. Capit.*
29.

At enim si quis fortasse hiis objiciat, quòd Ob-
servationes ab *Hippocrate*, suaque Schola per
Græciam factæ, ad Nostrates pertinet parùm;
sciat ille velim, similem esse ubiquè Hominum
Naturam, sicco nempè Frigore semper & con-
stringuntur Corporis humani Solida, & conden-
santur Fluida, hæc porrò utraque humidus Ca-
lor solvit semper; nusquam non minuit *Per-
spirationem* uda frigidaque Tempestas, hanc
nusquam non promovet tepida Serenitas: adeò,
que magnæ Aeris Mutationes, quòd ad Ca-
lorem, aut Frigus, Siccitatem, aut Humiditatem,
magno pariter ubiquè Terrarum for-
tiuntur Effectus — Nec profectò multùm dif-
ferre videntur; facta diligenter Comparatio-
ne, Observationes *Hippocraticæ* ab illis, quæ
captæ fuerunt nuperis Annis, & in Locis
à Græcia longè longèque remotis, inter e-
tiam

et penitus toto divisos Orbe Britannos.

Sed diluit hanc Objectionem optimè clariss-
mus

mus *wintringhamus* in Prolegomenis ad Com-
mentarium suum Nosologicum: — Subjiciam ve-
rò & ipse, quòd etiamsi Græciæ Regiones Cælo
magis clemente gaudeant quàm Insula nostra,
haud levibus tamen Aeris Mutationibus subjectæ
sunt frequenter; imò in ipsis Constitutionibus,
ab *Hippocrate* descriptis, leguntur subinde, Ὑδατὰ
πολλὰ, Αὐχμοὶ, Χειμῶνες μεγάλοι, Χιόνες μεγάλαι,
Οὐρανὸς λαιλαπώδης, ἐπινέφελοι, &c. quin ejusdem
planè Generis Febres populares apud *Hippocratem*
passim occurrunt, quibus & nostra quoquè *Bri-
tannia* plectitur subindè — *Epidemica* quippe Fe-
bris Effectus tantùm est Causæ morbificæ, ista
autem Causa plerumque peculiaris *Atmosphæræ*
Constitutio, adeòque hanc gignit aquilonia, il-
lam austrina, ubicunque nimirùm hæc, vel illa,
diu duraverit.

In sequente (necnon in præcedente) Morborum
epidemicorum Historia, non tantùm Febres popu-
latim grassantes exposui, sed & hos etiam Mor-
bos, qui unà cum istis sparsim intercurrerant;
eo scilicet Animo, ut singulorum indè Natura
clarius innotesceret; sequens in hoc utriquè ma-
gni Præceptoris Vestigia, qui in describendis Aeris
& Morborum Constitutionibus hanc tenuit Ratio-
nem. — Sæpe quippe sæpius accidit, dum Pleu-
ritides & Peripneumoniæ per siccam valdè &
frigida Tempestatem sæviunt, Anginæ quoque,
Ophthalmiæ, *Rheumatismi*, Cruciatus Intestino-
rum, eodem etiam Tempore, multos infestant;
atque ut plurimum haud minùs ab inflammato,
ac viscido Sanguine pendent quàm ipsæ Pleuri-
tides, nec minùs Sanguinis Missionem postu-
lant; aliis quanquam Temporibus meliùs mul-
tò Pur-

tò Purgantibus discutiantur. — pone jam aut *Variolas*, aut *Morbillos*, tunc unà grassari, longè tum sanè liberiùs, cæteris paribus, Venæ Sectionem, his in Morbis, consulerem, quàm ubi non talis prævaluerit frigida *Atmosphæræ* Temperies, nec proindè tam viscida Sanguinis *Diathefis*.

Si noscimus equidem qualem Sanguinis *Crasin* hæc progignit, vel illa, *Atmosphæræ* Constitutio, satis benè conjectare possumus, quales indè Corporis Affectiones sint futuræ, qualiaque possint Remedia; Morbi enim, ut monet *Hippocrates*, non derepentè Hominibus accedunt, sed paulatim sunt collecti, licèt erumpant subitò; —* Exempli Gratia, robustis & exercitatis Homini- bus insitus est naturaliter Sanguis densus atque tenax, adventante jam arida, & aquilonia Tem- pestate, Fibræ vasæque magis adhuc constringun- tur, magisque densa atque crassa redduntur Flui- da, usque eò ut Sanguis tandem fiat valdè glu- tinosus; his jam ita constitutis, mox oritur fa- cillimè, ex Frigore suscepto, Labore nimio, Ingluvie, aut quolibet ferme, in Vita, Erro- re, Lentor inflammans, qui infixus nunc Pul- moni Peripneumoniam, nunc Pleuræ Pleuriti- dem, nunc Intestinis colicam Inflammationem, generat.

Vides adeò, Lector amice, quantum ad Pro- phylaxin valeant Observationes meteorologicæ, quantumque etiam ad Morborum Curationes.

His

* Lib. 1. de Diæta Sect. 3.

His igitur frui modò , tandemque melior
res cde . — Quatenùs nobis denegatur diu vi-
vere, relinquamus aliquid , quo nos vixisse te-
stemur *.

DE

* *Plinii Epist. Lib. 3. Epist. 7.*

DE AERE ET

ANNO MDCCXXXVIII.

O RIENTE Anno totum obducitur Cœ-
lum Nubibus, quæ continuas ferè des-
stillant Pluvias, furente subinde Procel-
la: Hoc verò per Initia Mensis, post enim Plu-
via pareior, at durat usque Constitutio Aeris
crassissima, ac maxime humida, quæ *Barome-*
trum ad Stationem præaltam sustinet; quod qui-
dem sæpissimè accidit dum *Atmosfera* * est
valdè nebulosa; Vapore nempe una cum Aere
premente.

Rarum hoc Mense Gelu, nec Frigus solitum,
Ventus plerumque inconstans, Malacia nonnun-
quam.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{1}{3}$ 4. 5. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ 8. $\frac{11}{9}$ 10. — 12
 $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{11}{21}$ 22. 23. 30. — 2. 974.
 Dig. Deca.
 * B Nox

* Vide Menf. Januar. 1728. Vol. primi.

Nox procellosa 2. w S w 4. Procella 5. p. m. S w 4. Fulgur, Tonitru, & Turbo vehemētissimus 6. Hora sexta p. m. Procella 7. p. m. S w 4. gravis Procella 9. p. m. & tota ferè Nocte S w 4. Nix & Grando 11. Gelu 14. 15. N N w 1. Magna AB. 14. H. 10. p. m.

8 Altitud. maxim. 17. 30. 5. N 1. }
 ——— minim. 9. 29. 0. S VV 4x. } media 29. 9²⁰/₂₉
 Dies frigid. 15. 66. N N VV 1. }
 — tepid. 23. 48. Malacia. } media 54⁷/₂₉

Febris *Catarrhalis* & *Rheumatismus* passim ; *Pleuritides* aliquæ , *Peripneumonia* notha * verò longè frequentior est ; Tussis creberrima ; gravis *Arthritis* torquet permultos . Febris lenta , *nervosa* frequens, quæ nonnunquam, rubris urentibus Pustulis, Die nempe nono, undecimo, aut decimo quarto, erumpentibus, solvi videtur, maxime si crassæ, subsidentes Urinæ concurrunt . Haud multum utique Boni sperandum est ab Eruptione Pustularum dum Urinæ crudæ prorsus & tenues perstant ; in ipsis etiam *Variolis* ac *Morbillis* pessimè significant : Ne vel ullus Sudor salutifer habendus est, dum aquosa fertur Urina.

Nova Luna 7°. FEBRUARIO. *Plena Luna* 23°.

Perstitit ad quintum Februarii Diem humi-
 dissimus *Atmosphææ* Status, tunc Boreas discessit
 fit Vapores rigido accedente Gelu : à decimo
 sexto ab Occidente plerumque Ventus, ac alia
 Rerum Facies.

Pluvia

* Vide quæ de *Peripneumonia* notha dixi, *Essay on Fevers*, p. 222.

Pluvia 8. ¹¹16. 17. ¹¹18. 20. ¹22. 24. 26. 27.

Dig. Dec.

= 0. 928.

Nix super Montes 14. nulla hic autem.

8 Altitud. maxim. 6. 30. 4. ENE 1. } media 29. $8\frac{4}{28}$
 ——— minim. 18. 29. 0. S VV VV 3. }
 Dies frigid. 13. 75. N E 1x.
 — tepid. 1. 49. N VV b VV 1. } media $58\frac{3}{28}$

Tussis & Angina inter Equos valdè frequentes, haud pauci suffocantur. — Pleuritis, aut Peripneumonia, multos corripit Homines, spuria tamen est ut plurimum; Tusse permultæ.

Tempestas quidem haud insalubris est, at plures jam Phthisi tabescunt pulmonaria, cui dedit Originem malè judicata Febris catarrhalis * hic maximè sæviens ultimo Novembri & Decembri. Periclitantur admodum qui Asthmate olim, aut Tussicula sicca, laborabant, quorum in Pulmone nempe delituerant Tubercula; quæ, cum sint Impedimento trananti Sanguini, facilè inflammantur, ac in ulcera tandem degenerant; vel, negata, his in Locis obstructis, Sanguini Via, nimius ruit ad alias Pulmonum Partes, unde Hæmoptoe sequitur denique, aut Inflammatio, aut tabifica in Bronchiorum Cava Destillatio.

Non omnis utique Tabes pulmonaria ab Ulcere pendet (rarior enim est hic Casus quàm vulgò putatur) plures enim quotidie per longum Tempus immensam Muci falsi, dulcis, vel etiam planè insipidi, Copiam per Tussim rejiciunt,

B 2.

cui

* Post nimias Destillationes Tabes, Cels. Lib. II. c. 7.

cui nec Foetor inest, nec purulenti aliquid, Glandulis nimirum cum Ductibus Asperæ Arteriæ relaxatis nimium. Hoc tamen sæpe, licet Ægros diutiùs trahens, haud lethale minùs fit quàm si vel ipsam Saniem expuissent. Haud absimilis interdum Laticis vitalis est Profusio *Diabete* laborantibus; simile quid sæpe *Diarrhœa* tabescentibus, ubi ne vel minimum Ulcus, ut incisus Cadaveribus patuit. Nuper trimulum incidi Pue-
rulum pertinace admodum Alvi Fluxu peremptum: hujus Intestina peralba, tenuissima, sedula quasi arte deterfa inveni, minimè autem ulcerata.

Augetur semper hoc Malum ex levissimo suscepto Frigore, occlusis scilicet Cutis Spiraculis; maximum fit in Pulmones Influxum; haud aliter sanè quàm persæpe videmus retentum *Per-
spirabile* per Nares depluere. Contra sicca frequenter urget Tussis, & spirandi Difficultas, obstructis adeò & induratis Pulmonum Glandulis, ut in lapideam penè abeant Duritiem*, dum *Bronchia* præ nimia Siccitate rigescant, Muco naturali deficiente. Quis non videt quàm diversam prorsus Medicinam poscunt hæc duo Mala, utcunque in Praxi faciunda haud semper satis probè servatur Distinctio? Nec pauci sunt equidem, qui in omni ferè Tussi, sit sicca, sit humida, *Oleosa*, *Emollientia*, *Dulcia*, *Ecclegmata* porrigunt. Id quidem in priore rectè satis, modò *Incidentia* aliqua commista sint; secus longè
ubi

* Haud ita pridem Juvenem generosum, tabidum, vidi Lapillos asperos extussientem, qui, Tracheam lace-
rantes, haud leve Sanguinis Sputum movebant.

ubi serosa Colluvies inundat Pulmonem; Relaxant enim nimis, Humoribus Lentorem inferunt; & Perspirationem impediunt; unde augetur vel ipse Morbus. Cibi insuper Appetentiam & Concoctionem pessundant, demumque Diarrhæam colliquantem inducunt. Rectius multo blandè moventia Sudores *, inter Scapulas Epispastica, ac lenia subinde Cathartica præcipienda sunt, interpositis crebrò Anodynis; maximè si sit tenuis admodum ac irritans Illuvies, hanc enim demulcent & increassant, quo facilius longè per Sputa emolitur. Porro ad hoc Genus Valetudinis plurimùm facit Decoctum Corticis Peruviani cum Ligno Guaiacino & Styrace, quod in altero Casu foret nocentissimum: Nec inutiles hic sunt Suffitus * desiccantes idonei, qui quidem in Destillationibus haud parum valent.

Ubi verò Tracheæ & Bronchiorum Glandulæ obstruuntur, nec satis oleosi Mucoris secernunt ad lubricandas eorum Membranas; atque, uti sæpe fit, Lacerti musculosi Asperæ Arteriæ † & Bronchiorum rigidi sunt, ac nimis contracti, ibi lenis, emolliens, tepida Potio, ejusque Vapor, hausta sæpissimè proficiunt maximè, oleosis, & relaxantibus subinde assumptis.

B 3

Nova

* Vide Bennet. Theatr. Tabidor. Sect. 28. 30. &c.

† Andr. Laurent. Histor. Anatomic. Lib. 9. c. 14. porro Jo. Bapt. Morgagni Adversar. Anatomic. Sect. 25.

Nova Luna 9°. *MARTIO*. *Pleno Luna* 24°.

Principio *Ventus borealis* afflavit, mox irruebat *Auster* madidus, à decimo autem ad decimum sextum *Aquilo* siccam fecit *Atmosphæram* & frigidiorē: Libs inde ut plurimum, *Pluvia* sæpe cadente.

Pluvia 5. ¹¹8. 9. 11. ¹17. 18. 19. — 22. ¹¹23. 24.
Dig. Dec.
¹¹28. ¹29. 30. *Grando* 1. — 1. 730.

Levis Procella 8. p. m. S S w 4^r. — *gravis Procella* 19. Mane S 4^r.

8 *Altitud. maxim.* 31. 30. 1. NN VV 1. } *media* 29. ²⁴5₃₀
— *minim.* 8. 28. 8.
Dies frigid. 16. 62. NN E 1. } *media* 54⁶₃
— *tepid.* 22. 46. S S VV 2. }

Frequens Ophthalmia; *Tusses plurimæ* & acres admodum, quæ utique *Exitio* sunt pluribus, illis maximè, qui *Asthmate* vetere laboraverant, aut quibus infelix *Exitus epidemicæ Febris hyemalis obstructum Pulmonem*, & *Pectoris Oppressionem* intulerat, cita nempe *Phthisi* abreptis.

Pleuritides & *Peripneumoniæ* frequentes; sæpe etiam & *Latus* vehementer affectum est & *Pulmo*; Morbum vocant *Pleuripneumoniam**, in quo, dum sævit *Lateris Dolor*, urget simul *Tussis* & *Pectoris Gravitas*: Fit evidentior si *Sputa sanguinolenta* exantlantur.

Jam

* Vid. Librum Nostrum de Febris, &c. (*Essay on Fevers*) Cap. de *Peripneumon.* &c. p. 199.

1738) & Morbis Epidemicis. 7

Jam certè multa Sputa cocta, facilia, non multo Sanguine tincta, Morbum solvunt feliciter; sæpe tamen vel tenuis prorsus & acris Colluvies ejicitur, vel vana sunt omnino Naturæ Conamina, eludente nimirum pertenui & incocto Humore Vim Pulmonis: Pessimum certè ubi nihil excreatur, aut nil nisi crudum & spumofum*.

Nunc quoque in his Malis pulmoneis haud rarò erumpunt Pustulæ magnæ, urentes, imò etiam interdum dolentes valdè, circa Pectus, Scapulas, Cervices, quæto circiter aut septimo plerumque Die, quarum aliquæ plurimùm acerrimum fundunt *Ichorem* †: Felix hoc semper ferè & faustum fuit Ægrotis. — Diligenter utique in Morbis notandum est, quò Natura sua Sponte vergit; adeò cum Pustulas excitet, aut Furunculos in Humeris, aut Cruribus, per eas quoque Vias Arte tentandum est Morbum levare, admotis *Epispasticis*, Cucurbitulis, &c. — In omni itidem Naturæ Molimine, sive sit per Cutim, sive per Alvum, aut Urinæ Vias, aut libera Sputamina, invigilandum est Medico ut idonea & concurrentia adhibeat Auxilia.

Nova Luna 8°. *APRILI*. *Plena Luna* 23°.

Varius fuit Ventus variaque Tempestas hoc Mense, Imbre, ut solet, decidente frequenter: Exeunte Mense Eurus spiravit plerumque, isque frigidus valdè.

B 4

Pluvia

* Vid. Librum Nostrium de Febris, &c. (*Essay on Fevers*) Cap. de Peripneumon. &c. p. 199.

† *Φύκταιναι*, Hippocrat.

Pluvia 1. 4. — 6. 11. 12. 14. 15. 19. 21. ¹¹
 22. 23. 24. 25. — 1. 110.
 Dig. Dec.

Glacies 20. 24. E N E 1. Levis AB. 5. H.
 10. p. m. 10. w N w 2.

8 Altitud. maxim. 17. 30. 2. E b N 1. } media 29. 6 ¹/₃.
 ——— minim. 23. 28. 8. VV S VV 2. }
 Dies frigid. 20. 56. E N E 1. } media 47 ¹/₃.
 — tepid. 13. 40. S VV 2. }

Plures *Ophthalmia* vexantur; Tussis plurimæ; haud pauci jam acri Tussi & *hectica* Febre consumpti pereunt. Id utique perpetuum est, quod sæviente *epidemica* Tussi *Asthmatici* & pulmonarii pessimè se habent; novo nimirum accedente Malo veteri Morbo.

Qui *Phthisi* laborant periclitantur maximè in eunte Æstate, quoniam augescente indies Tempestatis Calore Sanguis expanditur, unde transit difficiliùs per obstructos Pulmones, hinc etiam augetur *hectica* Febris & Sudor colliquans. Tales ideò Ægrotantes hortor, ut se tunc Ruri recipiant, ubi Aura purior & frigidiuscula, lenis & accurata Diæta, forsàn & missus paulatim Sanguis, si nimium ebullit, rapidum Morbi Cursum reprimere possunt.

Nova Luna 7°. *MAIO*. *Plena Luna* 22°.

Ventus australis, perpetuus ferè ad Diem vicesimum Mensis, Argentum vivum in *Barometro* suppressit, Aeremque fecit densum ac humidum: inde per tres Dies Boreas, postea Zephyrus.

Pluvia

Pluvia $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ 6. 9. 10. 12. $\frac{1}{13}$ $\frac{11}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{17}$
 Dig. Dec.
 18. 20. 22. — 24. 26. 27. 30. = 1. 544.

Altitud. maxim. 21. 29. 8. N E 1. } media 29. 4.
 ——— minim. 5. 19. 0. S S VV 1. }
 Dies frigid. 2. 54. S S E 2^x. } media 38 $\frac{8}{29}$
 — tepid. 21. 30. Malacia p. m. }

Tusses, Gravedines, & Ophthalmia humidæ
 frequentes: Quosdam Apoplexia, quosdam Pa-
 ralysis corripit; Pleuritis & Peripneumonia mul-
 tos præcipuè incunte Mense: Febres intermitten-
 tes passim.

Nova Luna 6°. JUNIO. Plena Luna 20°.

Constans fuit ab Occidente Ventus per totum
 annum, nunc ad Austrum, nunc ad Septentrio-
 nem flectens; inde Pluviæ satis & Frigoris; Aer
 interim factus est crassus valde & humidus.

Pluvia $\frac{1}{2}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$
 $\frac{11}{16}$ $\frac{11}{20}$ 22. — 24. Grando vehemens 12. 13.
 Dig. Dec.

2. 398.

Circius admodum ferox 1. p. m. Procella 14.
 prima Nocte S w 4^x. — 20. Mane S w b S 4. Ful-
 gura 11. Nocte.

Altitud. maxim. 30. 29. 9. N VV 1. } media 29. 4 $\frac{13}{28}$
 ——— minim. 16. 18. 9. S VV 2. }
 Dies frigid. 18. 42. VV N VV 1^x. } media 34 $\frac{15}{28}$
 — calid. 30. 24. Malacia p. m. }

Tusses

Tusses acres & implacabiles ferè sunt valde frequentes, multæ quoque *Peripneumonia*, & vix & nothæ; crebri, atque fortes interdum *Impetus apoplectici*.

Qui Capite magno sunt & brevior Colla facti, multoque abundantes Sanguine, ex facili in *Apoplexiam* incidunt, quacunque de Causa nimium calefiant Humores. — His Curæ sit id præcedente Vere, ac invalescente Calore, & Sanguinem mittere, & leni, & parco Victu præcavere Morbum; maximè si Vertigo incidit, si Capitis Dolor, aut Tinnitus Aurium aut falsi ac subiti Splendores; hæc, ni caveantur maturè, certa sunt sæpe sæpius subitaneæ Mortis Prænuncia.

Nova Luna 5°. JULIO. Plena Luna 19°.

Magna jam Cœli facta est Mutatio, fuit enim hic Mensis & siccus & calidus valdè, flante plerumque ab Oriente, vel Septentrione, Vento qui *Barometrum* crexit, ac discussit Vapores.

Dig. Dec.

Pluvia 11. 12. 14. 19. 20. 21. 23. 28. = 0. 590
Fulgur & Tonitru 20. primo Mane, Dies valdè fervidi 4. 17.

8	Altitud. maxim. 3. 29. 8. E 1.	} media 29. 6 $\frac{5}{28}$
—	— minim. 19. 29. 2. S VV 2.	
	Dies frigid. 31. 33. N. 1.	} media 24 $\frac{4}{28}$
	— fervid. 4. 17. Malacia.	

Graves Capitis Morbi adhuc passim, & Tusses plurimæ; *Colica biliosa* frequens; Sudores maximè profusi omnes ferè debilitant valdè. Perplures jam Mulieres largissima patiuntur Menstrua sum.

1738)

& Morbis Epidemicis.

11

mo cum Virium Languore ; an fuso Sanguine ;
an rarefacto duntaxat ?

Nova Luna 4°. AUGUSTO. Plena Luna 18°.

Redit pluvia Tempestas, quæ porro pro An-
ni Tempore est admodum frigida, unde Messis
infelix : Corus subinde flavit, Libs sæpe, non-
nunquam Vulturus, interdum Aquilo.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 5. 7. $\frac{11}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{1}{10}$. 12. 14. 17. — $\frac{1}{22}$.
Dig. Dec.

3. 24. 25. 27. 28. = 2. 210.

Grando 10. Levis Procella & Fulgura 7. Nocte
b w 4^r.

Altitud. maxim. 29. 29. 9. N 1. } media 29. $6\frac{4}{30}$
minim. 8. 29. 2. S VV b S 3. }
ies frigid. 27. 39. N N E 1^x. } media 32. $\frac{6}{30}$
calid. 9. 27. S VV b VV 2. }

Cholera, & Morbus colicus passim: Anginæ,
Febres putridæ hand paucae. Variolæ jam fre-
quentes à miseris Saltzburgensibus, Patria expul-
sæ, huc advectæ.

Jure merito inter Morbos maximè contagio-
sæ ponuntur Variolæ, adeò ut vel unus Puerulus
scilicet correptus, fortè longè latèque sæpissimè
contagium dispergit: Atqui nisi etiam unà conspiret,
contagium fovens, Aeris Constitutio, sæpe vel
contra unum, alterumve Domicilium, in ipsis
quasi Incunabulis, extinguitur Morbus. — Hoc
sæpe vel in ipsa Peste quandoque notatur,
nam Hyems frigida coercet *.

Nova

* Hodges de Peste per Initia.

Nova Luna 2°. *SEPTEMBRI*. *Plena Luna* 16°.

Pluvia ferè perpetua ad medium usque Septembrem, Africo subinde fremente, Vulturno interdum; à decimo octavo autem Ventus Orientis inter & Septentrionem perflabat.

Pluvia 1. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{7}$. 8. 9. $\frac{1}{10}$. 11. $\frac{1}{14}$. 12.
 $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{27}$. 28. = 2. 9 12.
 Dig. Dec.

Procella 10. p. m. S w b w 4.

8 Altitud. maxim. 30. 30. 0. E b N 1. } media 29. $6\frac{20}{29}$
 ——— minim. 10. 29. 3.
 Dies frigid. 29. 48. E N E 1. } media 39 $\frac{22}{29}$
 — tepid. 1. 32. S V V 3x.

Multæ *Variolæ*, *Morbilli* & *Tormina* frequentia; *Febris Catarrhalis* Pueros infestat: Mensis vero fuit parum morbosus.

Nova Luna 2°. *OCTOBRI*. *Plena Luna* 16°.

Ineunte & exeunte Mense Ventus ab Oriente prævaluit, intermedio autem Tempore fuit varius admodum, sæpe turbidus Auster perfremuit, labente *Baroscopio*, & Pluvia ruente; à vicefimo tertio tamen nulla prorsus.

Pluvia 2. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{5}$. 6. 7. 10. 11. $\frac{1}{12}$. 15. 18.
 $\frac{1}{20}$. 22. 23. = 3. 330.
 Dig. Dec.

Procella 13. w S w 4. = 20. p. m. necnon insequente Nocte S 4.

Maxima

1738) & Morbis Epidemicis. 13
Maxima Procella 23. Nocte S 4^r. Maximæ
Pruinæ 16. 17.

AB. 21. H. 10. N w b N 1.—24. H. 9. w
N w 1.—25. N N w 1.—27. H. 9. w b N 1.

Altitud. maxim. 16. 30. 4. E N E 1. } media 29. $4\frac{24}{3}$
— minim. 6. 28. 7. S V V b S 3^x. }
Dies frigid. 22. 55. N N V V 1. }
— tepid. 5. 40. S V V b V V 2^x. } media $45\frac{2}{3}$

Variolæ & Morbilli sparsim, Ophthalmiæ, Rheu-
matismi, & Morbi colici frequentes: Febres len-
æ nervosæ passim.

Nova Luna 31^o. ultimo NOVEMBRI Plena Luna 15^o.
Nova Luna 30^o.

Parca admodum Pluvia ante Diem decimum
optimum decidit, dum vel Subsolanus spiravit,
el Ventus borealis, surgente Barometro; post
ruit nimbosus Auster, multaque Pluvia; quod
atmosphæram humidavit plurimum, quæ fuit
ante sicca satis & tenuis.

Pluvia 8. $\frac{111}{17}$. 18. $\frac{1}{19}$. 20. $\frac{1}{23}$. 24. $\frac{11}{25}$. $\frac{2}{26}$. $\frac{1}{29}$.
Dig. Dec.

Grando gravis 27. primo Mane = 1. 874.

Procella 19. à Diluculo ad seram Vesperam
w 4.

— 20. p. m. w S w 4^x. — vehemens 25.
m. S 4^x.

Maximus Halo circa Lunam 10. 11. prima
octe E S E 2.

Altitud. maxim. 9. 30. 3. E N E 1. } media 29. $7\frac{23}{30}$
— minim. 21. 28. 8. S 4^x. }
Dies frigid. 9. 66. rigidum Gelu. }
— tepid. 20. 47. S V V 3^x. } media $53\frac{1}{3}$

Plen-

Pleuritides, Peripneumonia, & Ophthalmia frequentes, præcipue Mensis Initio: Multi *Rheumatismo* laborant, aliqui lenta Febre. Tussis Anginæ, Coryzæ, Gravedines undique. *Vario* adhuc, *Morbilli epidemici*.

Plena Luna 15°. DECEMBRI. Nova Luna 29°

Per Initia Mensis Aer tepidus & humidus Libs ferè perpetuus & pluviosus; ab undecimo ad viccesimum quartum Boreas perflavit, qui *Barometrum* ad Altitudinem enormem evexit, frigidam fecit *Atmosphæram* & paulò sicciorer Ventus erat postea varius, frigidus, & pluvius

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 3.—5. $\frac{1}{6}$. 7.—9. 12. 20. $\frac{1}{21}$
26.—30. $\frac{21}{31}$. Grando cum Fulgure & Tonitruo
Dig. Dec.
7. Nix 21. Nocte. = 2. 404.

8. Altitud. maxim. 14. 30. 7. NNE 1. } media 29. $8\frac{23}{31}$
— minim. 3. 29. 1. S VV 2. }
Dies frigid. 24. 72. ENE. valdè rigidum Gelu. } media 57 $\frac{1}{3}$
— tepid. 2. 47. VV S VV 2. }

*Ophthalmia**, *Rheumatismi*, ac *Morbilli* pluri adhuc, *Variolæ* passim: Multi Vertigine corripuntur. Anginæ, pleuriticæ & *peripneumonia* Febres valdè frequentes; haud paucæ lentæ nervosæ; longè plures tamen acutæ ab acriter inflammante Viscido; quod, dum ad variam transf-

* Per frigidas & humidas Aeris Constitutiones diu durantes Ophthalmias esse per frequentes observavit Frid. Hoffman, Medic. ration. Tom. 4. Part. 1. Cap. de Inflam. Oculi

1739)

De Morbis Epidemicis.

15

transfertur Partes, varios producit Morbos, Pleu-
ritidem puta, Peripneumoniam, Anginam, Oph-
thalmiam, &c. prout nempe in hac, vel illa Parte
consistat obstruens Lentor. Nec mirum ideo
quod Ophthalmiam in Anginam interdum muta-
am videmus, Anginam in Peripneumoniam. — Τῶν
δυνέων δὲ ἐν πλευρῇσι, δὲ ἐν ἐνδοσσι, δὲ ἐν τοῖσιν ἄλλαι-
ν μέρεσιν ἢν μέγα διαφέρωσι, καταμαθεῖν.

Hippoc. Aphor. Sect. 6.

Tota Pluviae Quantitas, quæ Ann. MDCCXXXIII.
Dig. Dec.
ecidit, fuit = 24.004.

Plena Luna 13°. JANUARIO. Nova Luna 28°.

Per Anni Initia Pluviae multum & procellæ;
adit hinc Barometer, paulò tamen post, elucen-
e Sudo, resurgit, dum Corus intervenit; mox
utem Libs nubilus; brevique iterum Corus;
variante sic per sæpe Vento variat quoque Cœli
Facies: atqui per totum Mensem Aer fuit val-
lè crassus & longè humidus, ac plerumque te-
pidior solito.

Pluvia $\frac{ii}{i}$. 2. $\frac{iiii}{3}$. $\frac{iii}{4}$. 5. $\frac{iii}{6}$. 10. — 13. $\frac{i}{19}$. 20. 21.
23. $\frac{ii}{24}$. $\frac{ii}{25}$. 26. 28. 29. 31. Grando 1. 5. 25.
Dig. Dec.

Nix. 2. = 3. 962.

Procella 3. Nocte & tota Die 4. w S w 4.
— 6. Nocte w S w 4.
— 24. S w 4. — 29. Nocte S S E 4. Ful-
gur & Tonitru 4. 25.

8 Altitud.

☿ Altitud. maxim 11. 30. 3. VVN VV 1. } media 29. 7.
 ——— minim. 4. 2. 7. VV S VV 4.
 Dies frigid. 2. 65. N VV 1x. } media 54 ¹⁶/₂₉
 — tepid. 31. 50. S VV 3x. }

Morbilli Epidemici, Variolæ sparsim & Ruri &
 in Oppido: Plures acerbo admodum & pertina
 ci *Rheumatismo* laborant, multos vehemens & di
 durans *Arthritis* excruciat. *Peripneumonia* & v
 ra & spuria passim: Tussis *convulsiva* inter Pu
 ros frequens; acerrimè quidem sæpe post *Morbi*
los sævit, vix utique compescenda nisi Missio
 Sanguinis tollatur *Diatheſis phlogistica*, ac Collu
 vies acris lenibus expurgetur, miti nempe Vom
 tione, & blanda *Catharsi*, servata interim molli
 diluente, accurata Diæta: pessimus sanè Nutricu
 larum Mos est Carnem mox & Piscem post *Mor*
billos Porrigere, hinc enim sæpiſſimè Febris *Pe*
ripneumonica inſequitur.

Plures gravi Angina cum acuto Aurium Do
 lore capti sunt, cui non rarò *Parotis* accessit sæp
 in interiore Aure, aut Faucibus Abscessus, im
 nonnunquam *Phrenitis* & Strangulatio subita
 Duos, tresve brevissimè abreptos novi, attonito
 quasi & prorsus stupidos, quibus Vox primò mirè
 admodum stridula, mox omnino interclusa fuit
 horum tamen unus faciliùs multò quam quis cre
 deret oblata quæcunque deglutiebat. — Dirum
 hoc Symptoma quàm maxime semper timendum
 est, quòd Inflammationem Musculi *Arytænoidis*,
 & superiora Asperæ Arteriæ denotat; unde, oc
 clusa penitus Rima *Glottidis*, Spiritus protinus
 eliditur: estque stridulus hic Clangor hujusce
 Inflammationis Signum *diagnosticum*. — In *Mor*
bo hoc pestifero opportuna *Bronchotomia* Aegrum
 inter-

interdum vindicat ab imminente Morte : Vanâ tamen est omninò, atque irritò celebratur Auso, dum Inflammatio Pulmones etiam corripuit, uti funestum sæpe docuit Experimentum. Hujus Signa præcipua sunt Pectoris Oppressio, summa Anxietas, perpetua *Orthopnæa*, & suffocans quasi Tussicula. Ita tamen non pertimescenda est hæc Operatio, ut vix Vena faciliùs tundatur; modò idoneus sit Artifex. Quid quod memini, triginta abhinc Annis, Discipulum quendam Chirurgicum vesano Puellæ cujusdam Amore percitum, qui *Cartilaginem Thyroideam* ter, quaterve Scalpello pertudit, adeò ut Lucernam extingueret illicò Flatus erumpens, dum officiosè consueret Vulnuscula Magister Chirurgus : quem monui, tandem advocatus, desisteret, potiùsque, Brachiis Juvenis Lectulo alligatis, prohiberet ne violenta Manu Vitam impeteret rursùs : inde Emplastro solùm adhærente, Vulnera probè contingente, ex facili sanatus est.

Si qua unquam & Cautela & Festinatione simul est Opus, in Angina quidem suffocante necessarium est. Hoc tristi olim Exemplo persensi in quodam Amico : erat hic sexagenarius ferè, agilis, rubicundus, & *Psychrolusia* gaudens ferè quotidie. — Mane, Die Saturni, frigido usus est pro More Balneo, post Meridiem gravi Horrore correptus penè obriguit, paulòque post incaluit vehementer, mox accessit Ardor Faucium intolerabilis, ac Dolor summus : Vesperis missus est Sanguis; media Nocte vocatus detrahi iterum Zxxvi . jussi, Clysterem emollientem cum multo Sale marino injici, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Nitrum* ex Decocto laxante exhiberi affatim, *Epi-*
spastica largiora & acria Cervicibus admoveri.

* C

Mane,

Mane, die Solis, omnia pejora, adeò ut vel Liquidi, vel Solidi Deglutitio frè impossibilis, multò minus *Mannæ*, &c. satis ad Alvum solvendam. Hinc Humeris Cervicibusque affixis Cucurbitulis extractus est Sanguis ad 3x. Locisque scarificatis applicata Vesicantia, injectumque acrius *Enema*, sed ne sic quidem ullatenus levatum est Malum, imò jam Vox evasit stridula valdè, etiam & subinde intercisa prorsus; unde de *Bronchotomia* suggesti aliquid; id verò quasi esset Hominem jugulare non servare mussitabant adstantes: timidulus factus, junior tunc Medicus, destiti, ne Ægrotum occidisse viderer nisi servassem. Secta adeò rursus est Vena, ac repetitum *Enema*: Jam paulò facilior Deglutitio, multòque minùs Doloris, ast Vox argutissima,* subinde nulla; porrò *Dyspnœa* maxima, Anxietas summa, Pulsusque vacillans admodum, sæpe intermittens prorsus cum Sudore frigidulo. — Jam tandem mihi maximè pœnituit neglectæ *Bronchotomiæ*, satis superque percipiens Pulmones jam morbo esse obrutos penitus, facta *Metastasi* lethali. Dum deliberavi quid ultra faciendum erat, Vir bonus, inscius, Alvum egeffit,† mox Distentione nervorum correptus occidit; vix elapsis triginta & sex Horis à prima Morbi Insultura.

Est utique funesti plerumque Eventus dum augetur Spirandi Difficultas vanescente subitò Angina, Fauciumque Tumore; idque notat ab

Hip-

* Ὁξυφωνία κλαυθμώδης, πονηρόν. Lib. i. Proorrh. Sect. 6.

† Οἱσι διὰ σφοδρότητα πνιγμοῦ, κόπριον εξαπινής διαχωρῆει θανάσιμον. Coac. Prænot. 7. Cap. de Angina ex Edit. Duret.

Hippocrate * Celsus, " Si Angina subito finita est,
 " in Pulmonem id Malum transit, idque saepe
 " intra Diem septimum occidit. " — imò multò
 ante Diem septimum, si fuit Morbus ad Laryn-
 gem & Tracheæ Lacinias musculosas, primo
 scilicet, aut secundo, aut tertio Die; id ipsum
 quoque monente divino Sene Lib. Prognostic.
 necnon Coac. Prænot. 1. Sect. de Angina Edit.
 Dureti: quinimò notante † Aretæo etiam eodem
 Die: nec mirum utiquè cum & præcludatur
 Spiritus, & Sanguinis per Pulmones Transitus. —
 Omni igitur Ope nitendum est ut ad extra Tu-
 mor vergat, admotis acribus Cataplasmatibus,
 imò acerrimo ad Collum anterius applicato Ve-
 sicante; quod quidem, etsi haud usitatum, est
 tutum satis & valdè efficax Auxilium: Nec certè
 omninò spernendum est ‡ Celsi Consilium " in-
 " cidere satis altis Plagis sub ipsis Maxillis, su-
 " pra Collum, & in Palato circa Uvam, vel eas
 " Venas quæ sub Lingua sunt, ut per ea Vulne-
 " ra Morbus erumpat. " Atque hanc Methodum
 à Cælio Aureliano laudatam video, utcunque mol-
 liter plerumque Methodici tractabant Ægrotos.
 Venæ quidem sub Lingua in Angina saepe se-
 cantur feliciter, ac si vehemens urget Morbus,
 Febrisque itidem, non satis Sanguinis fundunt:
 ideo à Brachio priùs debita Quantitas emitti de-
 bet, rectèque monet II. Aretæus ex largo Vulnere,
 & ad Animi ferè usque Deliquium, ut gravis In-
 flammatio nempe citiùs tollatur, ægrum aliter

C 4

breui

* Lib. 2. Cap. 7. † Vide Aret. de Morb. acut. Lib. 1.
 Cap. 7. ubi accurata admodum habetur Anginæ Descrip-
 tio & Distinctio. ‡ Lib. 4. C. 4. II De Curatione Anginæ.

brevi suffocatura. Porro in graviore Casu suaderem Cucurbitulas scarificatas Cervicibus apponendas atque summis Humeris (Occipitio, Palis, & Pectori etiam vult * *Calius Aurel.*) mox his ipsis Locis *Epispastica*. Nihil enim negligendum est in tanto Discrimine, ubi quàm brevissimo Tempore de Vita agitur, & ubi sæpissimè parùm valdè agendum est per Remedia Ore assumpta: Clysteres adeò laxantes, irritante quodam Sale adjecto, marino putà aut *Cathartico* communi, injiciendi sunt subinde — non quòd non Purgantia refrigerantia protinùs exhibenda sunt, si fieri potest, Nitrosa quoquè diluentia & *Emollientia* affatim, hausto interim Vapore tepido relaxante perpetim, Fauces etiam colluendo, ac fovendo, Liquore: Gargarisationes verò fortes & frequentes utiquè minimè laudo, quòd & Dolores augment & Inflammationem.

Est tamen quædam Anginæ Species ubi Gargarismata, imò & acriora, valent plurimùm, à Destillatione nempe salsa & pituitosa in Fauces & *Pharyngem*, quæ tument quidem plurimùm, at subalbidæ sunt & Muco plurimo obductæ; atqui Febris tantùm modica subest, Respiratio autem est satis difficilis & Deglutitio obstructa plurimùm. In tali equidem Casu non multa Sanguinis Missione Opus est, sed *Epispasticis* & *Catharticis*: Suadet etiam *Elaterium Aretæus*; habemus tamen mitiora multò, at efficacia satis: Sinapi interim ex Mulso & Aceto coctum & idoneum facit Gargarisma & perutilem Vaporem, quodque mirè elicit Colluviem. Attamen fu-

gienda

* Lib. 3. C. 3.

gienda sunt omninò hæcce ubi magna subest Inflammatio, Ficus enim hîc & Nitri Decoctio ex Aqua & Lacte, melius multo est Gargarisma & tutius longè, etiam & haud inutilis Potio.

Sed hæc hæctenus de Angina ; cujus quidem variæ cum sint Species* variam quoquè poscunt medendi Methodum . At ea sanè , quæ longis accedit Morbis , vel lentis Febribus , ubi nec Tumor est extrà , nec in Faucibus aliquid conspicuum , sed aridæ sunt quodammodò & pallidæ , Sanguinis Dispendium & Alvi Purgationem minimè fert , nedum indicat : *Cardiaca* contra idonea atque Victum instaurantem postulat , his enim solis si ullis , levatur Malum : Est tamen ut Plurimùm certus Exitii Nuncius .

Plena Luna 12°. FEBRUARIO. Nova Luna 26°.

Altam plerumque Stationem tenuit *Barometer* hoc Mense, etsi Libs sæpe furebat, Pluvia quoque haud parca cadente; immensa tamen *Atmosphæ*æ Densitas Mercurium sustinuisse videtur; porro Corus interfuit sæpe, Subsolanus interdum. Vix ullum Gelu hoc, aut elapso Mense: Aer crassissimus semper ac humidissimus.

Pluvia $\frac{11}{1}$ 3. $\frac{1}{5}$ 6. — $\frac{1}{8}$ 9. $\frac{11}{10}$ 11. 13. 14.
Dig. Dec.
7. 18. $\frac{1111}{19}$ 26. $\frac{1}{27}$ 28. = 2. 876.

Maximus Halo circa Lunam 5. H. 9. p. m.
Magna AB. 23. H. 7. p. m. E 1.

C 3

♂ Altitud.

* De his Vide *Celsum*, Lib. 4. C. 4. — Necnon *Aretæum* e Morb. acut. Lib. 1. C. 7.

8 Altitud. maxim. 23. 30. 3. E 1. } media 29. 8 $\frac{7}{18}$
 ——— minim. 19. 29. 4. S S VV 1. }
 Dies frigid. 6. 59. N VV b 1x. } media 51 $\frac{18}{18}$
 — tepid. 27. 47. S VV b VV 3x. }

Ophthalmia, *Pleuritides* & *Peripneumonia* passim. Tumores Colli Fauciumque cum acerbo sæpe Dentium Auriumque Dolore valdè frequentes; Haud rarò nascuntur in Meatu auriculari *Apostemata*, vel in Tonsillis, subinde *Parotides* diu dolentes, tandemque aliquando suppurantes.

Rheumatismus & *Arthritis* sævit maximè : *Variolæ* plurimæ.

Morbilli pustulosi, & maximè eminentes, admodum sunt *Epidemici*; at, nescio unde, magis funestos edunt Effectus quàm vel merè maculosi; mox enim ab Initio vehemens invadit Tussis, & perpetua ferè Sternutamenta cum maxima ad Oculos Naresque Fluxione, protinùs ardens accedit Febris cum Delirio plerumque, & per magna Præcordiorum Oppressione; quæ fit etiam, Morbi Statu, multò violentior, adeò ut tunc Affectio sæpissime evadat prorsus *Peripneumonica*. Hinc Stupor accedit, vel sævissimi Dolores Colici, sæpe *Dysenteria*; Tussis autem usque ingravescit, unde haud rarò expuitur Sanguis, rupto in Pulmone Vasculo, interdum etiam ex Naribus plurimus effunditur. — Sanguinis Missio *Colicam* æquè levat ac *Peripneumoniam*; pernecessaria est utiquè, sine qua quidem vix aliquid proficit, post autem *Cathartica* lenia Morbi Reliquias expurgant feliciter, modò parcus sit Victus & idoneus. Plures equidem Pueros hic Morbus opprimit, vehementi Pulmonum Inflammatione

1739). *de Morbis Epidemicis.* 23
 tione, aut lenta Tabe & importuna admodum
 Tussi consumptos. — Qui Artuum Lassitudinem*
 ac Dolorem graviter diuque plorabant, imminen-
 te Morbo, sævum admodum perpeffi sunt: quod
 in *Variolis* quoque sæpius notavi. An Humorum
 Acrimoniam indicat hoc *Symptoma*, an Globu-
 los sanguineos in Vasculo, Sero Sanguinis dun-
 taxat idoneo impacuos?

Plena Luna 14°. *MARTIO.* *Nova Luna* 28°.

Et ineunte & exeunte Martio sublimis fuit
Barometer, Ventus ab Oriente, aut Septentrione,
 per totum ferè Mensem, unde Sudum plerum-
 que: atqui inter 14. & 25. subsidente Mercurio,
 Nix multa, Pluvia frequens & Grando, atque
 algida Tempestas: rigidum Gelu. 18. 19. N E 1.

Pluvia 6. 14. 18. 21. 22. 23. 24. Nix 11.
 Dig. Dec.

15. 16. 18. 20. Grando 17. 22. = 1. 5 12.
 Magna AB. 1. H. 10. p. m. N E 1. — magna va-
 riata AB. 15. H. 7. N. b. w. 2°. fuit tamen ma-
 jore ex Parte Coloris Ferri igniti: hujus Radii
 lucidi vel à S. w & S E jaculati fuere: maxima rur-
 sùs lucida versicolor AB. 30. H. 10. N. b. w 1.
 Centrum Coronæ (ut dicitur) certissimè ad Pla-
 gam orientalem. Lineæ meridionalis divergebat
 per Gradus ferè quindecim, totidemque saltem
 ab ipso Zenith ad Austrum declinabat.

Altitud. maxim. 30. 30. 4. N b V V 1. }
 ——— minim. 22. 29. 1. E S E 2. } media 29. 7.

C 4

Dies

* Ὁσσοχώπος. Hippocrat.

Dies frigid. 16. 66. N b VV 2. }
 — tepid. 31. 46. N b VV 1. } media 55.

Morbilli adhuc *Epidemici*: *Variolæ*, *Ophthalmiæ*, *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* plurimæ: non hic tantum sæviunt omnes hi Morbi sed & undique *Tusses convulsivæ*, vehementes, suffocantes, *Morbillos* sæpe & *Variolas* insequuntur, quæ magnam sanè edunt Stragem. — Cum 4^o. ab Eruptione *Morbillorum* Die probè desquamatur *Cuticula*, quasi *Furfure* crassiore aspersa, læta *Spes* effulget; at parva certè, ubi *Pustulæ* lividæ, aut luridæ fiunt. Tunc autem *Epispastica* haud parcè admovenda sunt, & *Frictiones* calidæ per totum *Corpus* mox adhibendæ; intereà *Serum Lactis* vinosum, tepidum, sorbillandum est affatim, paucis *Sp. C. C. Guttis*, si languet *Pulsus*, instillatis.

Coryzæ, *Raucedines*, *Faucium* Collique *Tumores*, apud omnes ferè; haud pauci etiam *Angina* corripuntur, quæ tamen est plerumque mucosa, nec multa *Febre*, nec magna *Spirandi* *Difficultate* stipata: *Parasynanchen* hanc *Anginæ* *Speciem* vocabant *Veteres*. Pendens autem à multa *Colluvie* serosa rectiùs *Epispasticis*, blandis *Sudoribus*, & *Alvum* purgantibus, discutitur, quàm larga & repetita *Sanguinis* *Missione*; utcunque sit prudens, in ipso *Morbi* *Initio*, *Venam* secare: Hic etiam *detergentia* & paulò acriora *Gargarismata* proficiunt, quibus quoquè *astringentis* aliquid immiscetur utiliter. Sæpe equidem nimii sumus in *Emollientibus* ubi *Fluxio* serosa quasi *Fauces* inundat, quia plus *Humoris* ibidem invitant.

Longè

Longè tamen alia debet esse Ratio medendi ubi urget pestifera *Cynanche*, hìc enim plerumque Febris est acutissima, rubet tumetque Vultus, usque eò ut interdum etiam liveat, torvi sunt Oculi & inflammati, pulsant dolentque admodum Tempora; mox succedit Phrenitis, aut Stupor somnolentus, difficillimè trahitur Spiritus, imò vix respirare valent nisi prorsus erecti, protinùsque suffocantur nisi juvat cita, larga, & repetita Sanguinis Missio.

Plena Luna 12^o. APRILI. Nova Luna 26^o.

Aquilo perflavit sæpissimè hoc Mense, interveniente subinde Cauro, interdum Vulturno, unde valdè frigida Tempestas: Nix, Grando, Gelu, frequenter per Initia, sub Finem Pluvia, spirante Austro.

Pluvia 1. 2. ¹/₇. ¹¹/₁₁. 15. 21. 22. 24. 25. 26.
¹/₇. ¹/₂₈. ¹/₂₉. Nix 3. 4. 8. ¹/₉. Grando 8. 9.
 Dig. Dec.

o. Acre Gelu 5. NE 2 = 1. 698.

lagna ignea AB. 20. H. 9. ENE 3. Procella
 . NNW 4^r.

Altitud. maxim. 11. 29. 8. NE 2. } media 29. 4²⁵/₃₀
 ——— minim. 24. 29. 1. SE 2. }
 ies frigid. 5. 64. NE 2. } media 50.
 — tepid. 30. 44. S VV b S 2. }

Ophthalmia, Pleuripneumonia, Angina, valde
 equentes, multòque magis vehementes. Varo.
 grassantur plurimùm, at multò magis Epide.
 mici

mici sunt *Morbilli*, magisque etiam funesti. — Tussi gravissima infestantur. Pueri; febricitant sæpe haud leviter, ægrèque admodum exantlatur tenax Pituita, unde haud pauci Distentione Nervorum corripuntur: Missione Sanguinis levantur & Usu *Oxymel. Scillit. Expressione Milleped.* &c. Tempestas est valdè funesta Tabidis. Longæ & difficiles *Apthæ*, ac. Faucium Ulcera pertinacia haud rarò febricitantibus * accidunt: *Hæticis* & *Phthificis* utiquè sunt certa, imò & cita, Mortis Præsagia.

Febres tertianæ aliquæ; Arthritis & Rheumatismi sævissimi.

Plena Luna 12°. MAIO. Nova Luna 26°.

Mensis Initio Ventus ab Austro non parcam demisit Pluviam: à 13°. Subsolanus sæpe, mox Vulturnus, tunc Aquilo, Corus interdum: 15°. Fulgur, Tonitru, Pluvia, Vento omni Modo, & omni Hora, variante: 16°. Aquilo velox, nulla Pluvia; Nocte tamen Vis immensa, etiam inter Horam Noctis undecimam & Meridiem 17°. Pluviæ Digitus integer decidit, minimè intereà subsidente Baroscopio. Perstitit Aquilo ad 19^m; inde Ventus inconstans micante subinde Fulgure: sub. Finem Aquilo rursus, qui, contra quod solet, fuit hoc Mense plerumque Austro tepidior.

Pluvia

* Φάρυγγέλκυσμειν, σὺν Πύρετω, δεινόν. Hippocr. Prognost.

Pluvia $\frac{I}{I}$ $\frac{III}{II}$ $\frac{I}{I}$ $\frac{II}{II}$ $\frac{III}{III}$ $\frac{II}{II}$ $\frac{III}{III}$
 1. 2. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 15. 17. 18.
 " Dig. Dec.
 19. 24. 30. = 3. 210.
 Procella 2. Nocte S S E 4^r. Fulgur & Toni-
 tru 18.

Altitud. maxim. 25. 30. 0. NE 1. } media 29. $5\frac{20}{29}$
 ——— minim. 10. 29. 2. SS VV 3. }
 Dies frigi. 2. 47. S b E 3x. }
 — tepid. 27. 28. E N E 1. } media 38 $\frac{7}{29}$

Ophthalmia, *Anginae*, *Pleuritides*, *Peripneumonia*, & veræ & spuria, frequentes: *Variolæ*, *Morbilli*, ac *Febres Miliare*s passim. *Tussis convulsiva* plurimos infestat *Pueros*, aliquos protinus suffocat. Plures solito à *Pleuripneumonia* malè judicata fiunt *empyici**, rupto interdum in Latere Abscessu, haud rarò intra Pulmonem; qui faciliùs purulenta expuunt servantur, sin aliter brevi totus absumitur Pulmo, magna accedente Raucitate, & Gutturis Asperitate. — *Raucedo* frequenter utiquè Pulmonarios vexat, eaque pertinax admodum; quod sanè inter confirmatæ *Phthiseos* Signa rectè numeratur, nec profectò longè Mors abest si *Apthæ* accedunt, aut Gutturis Ulcera: pertimescenda est adeò in Morbis Pulmonum Raucitas, maximè si viridia sint Sputamina aut quasi cœnosa.

Plena

* De Signis Empyematis perlege *Hippocr. Prognostic.* & Libri, de Locis in Homine, Sect. 28.

Plena Luna 10°. JUNIO. Nova Luna 25°.

Infauſta, pluvia, frigida Tempeſtas toto fere Junio, Ventus ab Occidente plerumque, ad Auſtrum ſubinde vergens, haud raro etiam ad Septentrionem.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------------|-----|-----------|------------|-------------|-----|-----------|-----|
| | | | <u>1</u> | | <u>11</u> | <u>111</u> | <u>1111</u> | | <u>11</u> | |
| Pluvia | 1. | 2. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 15. | 18. |
| | | | <u>111</u> | | <u>11</u> | <u>11</u> | | | | |
| | 20. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 30. | 4. | 218. | |
| | | | | | | | | | Dig. Dec. | |

Fulgur & Tonitru 5°. Noctu. Levis Procella 26. Mane S S w 4°.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|---|--|
| 8 | Altitud. maxim. | 16. | 29. | 8. | NN | VV | 1. | } media 29. 4 ¹⁸ / ₃₀ | |
| — | minim. | 10. | 29. | 0. | SS | VV | 3. | | |
| | Dies frigid. | 3. | 38. | | N | b | E | 1. | |
| — | tepid. | 29. | 27. | | VV | N | VV | 1. | } media 32 ² / ₃ |

Variolæ & Morbilli adhuc frequentes: *Febres Miliare*s compositæ (ut dicuntur) haud raræ: Multos torquet *Rheumatismus*, & *Laterum Dolor*; nec paucos opprimit *Peripneumonia*, at plerumque notha. *Tussis* sæviſſima paſſim apud *Pueros*, quæ vix ſedatur niſi poſt *Vomit*us frequentes, & repetitas *Rhabarbari Doſes*; tunc vero *Decoct. Cortic. Peruviani* brevè fugatur.

Plena Luna 9°. JULIO. Nova Luna 24°.

Perdurat uſque frigida, ac humida Tempeſtas, Aer plerumque crassus valdè & nebulosus, Pluviæ quidem plus fatiſ; unde *Fructus* ωπαίοι crudi prorsùs & inſuaves. Ventus ab Occidente prævaluit, ad Auſtrum ſæpe flectens, ſæpiùs tamen ad Septentrionem, interfuit *Boreas* interdum,

1739) & Morbis Epidemicis! 29
dum, aliquando Malacia. — Raræ admodum Pa-
piliones, rarissimæ Cicadæ.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 3. — 5. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{13}$. 14. 15.
 $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{27}$. 28. 29. $\frac{1}{30}$. $\frac{1}{31}$. = 3. 172.
Dig. Dec.
Fulgur & Tonitru 12. a. m. Malacia?

8 Altitud. maxim. 20. 30. 1. N b VV 1x. }
— minim. 11. 29. 2. VV S VV 2x. } media 29. $6\frac{14}{29}$
Dies frigid. 13. 40. N N E 1. }
— calid. 23. 24. Malacia. } media $31\frac{2}{29}$

Variolæ epidemicæ, haud tamen valdè lethales;
Morbilli aliqui, *Tussis convulsiva* atrox adhuc;
Diu duravit Angina quædam *apthosa*, quæ omni-
bus penè Morbis acutis accedit, præcipuè pustulo-
sis; jamque etiam *peripneumonicos* vexat. — Mo-
lestum sanè, ac sæpe periculofum, est *Symptoma*,
ubi in Febribus Membrana Faucium inflamma-
tur, ac Pustulis obsidetur: Paucae utiquè *Vario-*
læ, in ipso Faucium Isthmo, multò plus nocent
quam mille extrà.

Plena Luna 7°. AUGUSTO. Nova Luna 23°.

Prior Augusti Pars fuit læta satis, posterior
infelix admodum Pluvia ferè perpetua cadente,
quæ Segetes corrumpit maximè: *Atmosphæra*
porrò, quæ vigesimum usque fuit sicca satis, jam
facta est crassissima ac humidissima, Libs intereà
perflavit; Corus autem prævaluit Initio.

Pluvia 1. 2. 5. 6. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. 25.
 $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{28}$. 29. 30. 31. = 2. 016.
Dig. Dec.

Fulgur

Fulgur & Tonitru 23. Permagus igneus Halo circa Lunam 5. H. 10. p. m. w 1^x. Procella 21. Nocte S S w 4^x. — 24. Nocte S w 4^x. — 26. Nocte S w 4.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 0. N. 1.

— — — minim. 29. 29. 2. S V V b V V 3. } media 29. 6²/₃₀

Dies frigid. 31. 42. 42. V V N V V 2^x.

— calid. 15. 20. N N V V 1^x.

} media 31¹³/₃₀

Variola epidemica, *Tussis convulsiva* adhuc frequens, praesertim in *Cornubia* citeriore: *Anginae* & *Peripneumoniae* nothae passim, multis *Pustulis* rubris & aquosis, *Statu Morbi*, erumpentibus iisque plerumque salutiferis. *Rheumatismus* vexat plurimos, qui multò nunc facilius *Catharsi* cedit quàm *Venae Sectioni*.

Magnus Languor omnes opprimit; imò vel *Aviculæ* contristantur, filet ipsa *Cicada*.

Plena Luna 6°. *SEPTEMBRI*. *Nova Luna* 21°.

Pluviosus porrò ac frigidus sequitur *Septem-ber*; *Libs* furibundus sæpe ineunte *Mense*, post xvi. *Vultur* plerumque, intercurrente nonnunquam *Malacia* — *Nimio Squalore* obruta tabescunt plurima *Frumenta*.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | $\frac{111}{1}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{11}{5}$ | $\frac{11}{6}$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{11}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{13}$ |
| Pluvia | 1. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | — 10. | 11. | 12. | 13. |
| | $\frac{1}{17}$ | $\frac{111}{19}$ | $\frac{111}{20}$ | $\frac{111}{21}$ | $\frac{111}{22}$ | $\frac{1}{26}$ | $\frac{1}{27}$ | $\frac{1}{28}$ | $\frac{1}{30}$ | $\frac{1}{32}$ |
| | 17. | 19. | 20. | 21. | 22. | 26. | 27. | 28. | 30. | 32. |

Levis Procella 3. Noctu S w. 4^x. — gravis 10. Nocte S w 4^x. — 11. a. m. w S w 4.

Fulgura & Tonitrua 7. Nocte — Fulgura perpetua sine Tonitru 10. Vesperi — 21. Vesperi — perpetua sine Tonitru quoque 23. ab Hora 6. p. m. ad

1739) & Morbis Epidemicis. 31
m. ad mediam Noctem & ultra. AB. 12. & 13.
Hora 8. p. m. N w b N 1.

Altitud. maxim. 14. 29. 8. N N E 1. } media 29. $5\frac{3}{30}$
— minim. 11. 29. 0. VV S VV 4. }
Dies frigid. 14. 48. }
— fervid. 22. 32. S S E 1. } media $38\frac{2}{3}$

Variolæ usque vagantur, hic autem benignæ
satis sunt, aliis tamen in Locis haud rarò letha-
les. Tusles convulsivæ etiamnum frequentes: Fe-
bres lentæ nervosæ atque miliares passim, aliquæ
etiam putridæ, aliquæ intermittentes.

Icterus & Hydrops, jam sæpe quidem unitis
Viribus, plures opprimunt.

Tusles plurimæ, Fauciumque Tumores, Col-
li Parotidum, Maxillarumque, levi sæpe cum An-
gina, ubique permolesti sunt.

Plena Luna 5°. OCTOBRI. Nova Luna 21°.

Ab ultimo Septembris Diem ad usque vicesi-
mum secundum Octobris Boreas perflavit assi-
luè, unde sublimior Barometri Statio, & sicca
Tempestas; porrò inter xiv. & xxiii. frigida val-
lè: sub Finem Mensis infremuit pluvius Vultur-
us. Gelu rigidum 18.

Pluvia $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 13. $\frac{11}{12}$ 24. $\frac{1}{2}$ 25. $\frac{1}{2}$ 26. $\frac{111}{112}$ 27. 28 — 31.
Dig. Dec.

Grando 28. = 1. 516.

Procella 29. — 30. S E b S. 4. AB. 19. H. 8. p.
n. E N E 1.

Altitud. maxim. 8. 30. 3. E N E 1x. } media 29. $7\frac{29}{31}$
— minim. 31. 29. 1. S E 3x. }

Dies

Dies frigid. 18. 65. E N E 2. }
 — tepid. 1. 44. N N E 1. } media 52¹⁵/₃₁

Ubique ferè dominantur *Variolæ*, plerumque tamen sunt benigniores. Febres aliquæ putridæ, intermittentes aliquæ, ceu potius remittentes, quæ faciliter *Eccoproticis* lenibus abiguntur, epoto subinde *Hauftu salino* cum *Corticis Peruviani* tantillo — *Ophthalmiæ*, Anginæ, Coryzæ, Tusles humidæ, creberrimæ; *Pleuritis*, ac *Peripneumonia*, & vera & notha, frequens.

Spuria *Pleuritis* plerumque nihil aliud est quàm *Affectio Musculorum externorum Pectoris*, quæ *Rheumatismi* utiquè Species est; at ubi ipsum *Costarum Periosteum* inflammatur, Dolor sæpe vehemens urget, & pertinax admodum, unde *Respiratio* haud rarò impeditur maximè* — atqui jam ex facili discutitur, molli existente Pulsu, Fomentis idoneis, & leni *Catharsi*.

Plena Luna 4°. NOVEMBRI. *Nova Luna* 19°.

Ipso Mensis Initio gravis decidit Pluvia, Austro fremente; à vi. ad x. Aquilo frigidissimus prævaluit, mox Vultur Diem ad usque xvii. durans; frigidus hic quoquè, ac sæpe nimbosus & pluvius. xxi. Vesperi gravis irruit Procella, Libanoto furente vehementer, dum per plurima corrui Pluvia; duravit hæc per integrum ferè Triduum, quo maxima fuit, imò & insolita, *Baroscopii* Depressio, Æstus autem Maris immensus †: ad Finem verò Caurus *Mercurium* erexit.

Pluvia

* Vid. *Essay on Fevers*, Cap. de *Pleuritide*. † De his Vid. Vol. I. p. 18.

Pluvia ^{III} 1. ^I 3. 4. 5. 7. 8. ^I 11. 12. ^I 13. 14. ^I 15.
^I 17. 19. 20. ^{III} 21. ^{III} 22. ^{II} 23. ^I 24. 25. ^I 26. ^I 27. 28.
^{II} Dig. Dec.

29. Grando 23. & 29. = 4. 574.

Levis Procella 12. Nocte S E b S 4^r. Procel-
 la 21. Vesperis S S w 4. — tota Die 22. S w b
 w 4^r. — 23. Mane S w 4. Fulgur & Tonitru
 21. Nocte — 23. Nocte.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 1. S E b E 3. } media 29. $4\frac{12}{28}$
 ——— minim. 23. 28. 2. }
 Dies frigid. 10. 70. N N E 1. Gelu valdè rig. } media 58 $\frac{10}{56}$
 — tepid. 1. 48. S 3. }

Pleuritides & Peripneumoniae, & veræ & spu-
 riæ, haud infrequentes, nec Febres nervosæ, ac
 miliares; præcipuè in Cornubia: Crebra Tussis
 convulsiva inter Pueros. Anginæ & Tumores
 Faucium, Parotidum, ac Maxillarum undique,
 qui sæpe suppurantur & intus & extrâ.

Variolæ epidemicæ hic, & ubique, jamque mul-
 tò peioris sunt Notæ, sæpe cum lividis & nigris
Petechiis, sæpe sessiles sunt prorsus & subnigræ,
 sæpe vacuæ omninò, sæpius acri admodum ac
 crudo Ichore turgidulæ: Plures sanè jugulant:
 Qui evadunt plurimis molestissimis Furunculis
 & Ulcusculis frequenter admodum infestantur —
 Haud rarò immensa fit, ipsis primis Morbi Die-
 bus, *Salivatio*, tenuis quidem ea & acris maximè,
 unde Fauces & totum Os mox exulcerantur.
 Semper mihi suspectus est utiquè præmaturus
 hic & crudus Fluxus*, Tædii quippe plurimum
 Ægrotis ac Doloris facit, arcetque protinus Som-
 num;

* Vid. *Essay on Fevers* C. de Variolis, p. 145.

num; unde nec faustè replentur Pustulæ, nec maturantur bene. Porro magnam hoc Sanguinis indicat Acrimoniam; quod quoquè valdè frequens Sternutamentum denotat, & enormis Narium ac Oculorum Fluxio: unde hæc rectè inter mala Signa ponuntur—Nihil huic Malo succurrit magis, imò & sæpe occurrit, quàm tempesta, summos inter Humeros & pone Aures, *Epispastici* *corum* Applicatio, quibus aeris evocetur Humor.

Plena Luna 4º. DECEMBRI. Nova Luna 19º.

Tempesta hoc Mense fuit planè mirabilis; ad Initium Boreas, rigidum Gelu, mox pluvius & turbidus Auster, paulò post Libs furens, multaque Pluvia, surgente tamen Baroscopio: xiv. ac xv. Corus, xvi. Boreas Geluque recurrunt: xix. & xx. Vulturnus velox; Libs iterum nimbosus xxi. inde Eurus ad xxviii. intercurrente tamen Borea perfrigido xxv. & xxvii. Hinc sævissima Procella ab Oriente ad Finem usque cum rigidissimo Gelu & Nive perpetua minutissima; brevi omnia penetrabile Frigus adurit intus atque foras, vel generosissima Vina congelans; quicquid Aeri expositum est dicto citius congeliat—ad Ignem luculentos rigentes, etiam in Lectulis algidi, adeò ob Frigus horrendum torpemus ut vix ferè simus vitales.

Vehementissima Tempesta ad Finem Decembris perplurimas Aves & Aviculas abs Terra abripuit, illasque ad immensam à Littore Distantiam abegit; quæ defessæ prorsus perlongo Volatu ad Naves se contulere medio in Oceano, & à Nautis erant facillimè capiæ: Mirum utiquè Genus Aucupii! —Ipse vidi, Januarii sequentis Initio, fortè tunc visitans nobilissimum *Comitem Delo.*

1740)

& Morbis Epidemicis.

33

Deloraine, in Navi præfidiari (*the Weymouth*) ægro-
tantem, Artocream ex Aviculis confectam, quas
Nautæ in Reditu ab Olyssipone ad Portum no-
strum captaverant, longè longèque ab ulla Terra.

Pluvia $\frac{11}{3}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{11}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{11}{9}$ 10. 11. $\frac{11}{12}$ $\frac{11}{13}$

$\frac{11}{14}$ $\frac{11}{15}$ $\frac{11}{20}$ $\frac{11}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{11}{23}$ $\frac{11}{24}$ = 4. 102. Dig. Dec.

Multa Pluvia 21. 22. 23. etsi *Barometer* erat
ad 30. 1. Libs porrò perfurebat, atqui Aer fuit
longè crassissimus ac humidissimus immensa sci-
licet Vaporum Copia per *Atmospharam* diffusa.

Non potui Nivis Quantitatem æstimare, quip-
pe quæ fuit à Vehementia Ventorum è Recipien-
te diffata.

Altitud. maxim. 16. 30. 2. N E 1. } media 29. 8.
minim. 4. 29. 1. S S VV 3x.

Dies frigidissima per Hominum Memoriam }
repida 31. 90. E N E 4x. } media 61 $\frac{25}{28}$
10. 52. S VV b VV 3x.

Febres *miliares* & *nervosæ* aliquæ, Variolæ
passim, Anginæ & Ophthalmiæ crebræ: Tusses:
Rheumatismi, *Pleuritides* ac *Peripneumoniæ* sunt
frequentes.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXXXIX.
Dig. Dec.
= 36. 308.

Plena Luna 2º. JANUARIO. Nova Luna 17º

Persistit adhuc frigus enorme, quale quidem
in hac Regione haud perceptum fuit antehac un-
quam: Primo licet Mensis Die maxima fuit Ni-
vis Solutio, decidente Pluvia, mox tamen recur-
rit Boreas, ac Gelu accerrimum, ad Finem us-

que Mensis perdurans — Quamvis enim omnia Solis Ardore liquantur interdiu, constringuntur Noctu rigidissimo Gelu. *Atmosfera* fuit plerumque crassa valdè & veluti offuscata Fumo, inter x. verò & xvii. tenuissima. Dies frigidissimi erant 11. 15. 16. 17. 18. 26. 27. 28. adeò sævum regnabat Frigus ut Vina omnigena, foras exposita, mox congelarentur; imò ac vel ipsum ad Littora Mare, quod utique hic accidit rarissimè. Plantæ & Arbores innumeræ pereunt, vel & ipsæ duræ Genistæ, vix vides viridem Herbam. Innumerabiles huc advolant Aves aquaticæ, perplurimæ etiam ab exteris Regionibus, vix unquam hinc visæ.

Dig. Dec.

Pluvia ¹¹ 1. 2. 9. Nix & Grando 8. 9. = 0. 416.

Nullum vidi Lumen boreale toto hoc Mense, etsi Ventus ferè perpetuus è Septentrione spiravit.

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 14. 30. 4. E N E 2. | } media 30. $1\frac{14}{31}$ |
| — | minim. | 1. 29. 1. S V V 2. | |
| Dies frigidissimus | 26. 84. | N N E 1. | } media 75 $\frac{11}{31}$ |
| — tepidus | 31. 69. | S E b E 3 ^x . | |

Variolæ adhuc *epidemicæ* sæpe parvæ sunt admodum, sessiles & subnigræ, sæpe lethales; Ægroti, his correpti, parùm tument, perpaululùm expuunt, unde non rarò 8. aut 9. Die suffocantur. Perpetuùm est ferè, quod per siccas ac frigidas Aeris Constitutiones, diu durantes, *Variolosi* paricissimè expuunt *; unde tali prævalente Tempestate suaderem Gargarisationem emollientem ac frequentem, Potus tepidos, relaxantes, continuos, Vaporem aquæ tepidæ, aut Lactis dulcis, Ore

* Vide *Essay on Fevers*, p. 145.

Ore haustum, ut per hæc, laxatis Fibris, attenuato Sanguine, reſeratis Salivæ Ductibus atque absterſis, eliciatur *Salivatio* libera, quæ in hoc Morbo maximi ſemper eſt Momenti.

Tumores Faucium, *Parotidum*, Tonsillarum, &c. apud omnes ferè, qui & Tuſſi quoquè vexantur & acri Deſtillatione. Anginæ, *Odontalgia*, *Pleuritides*, *Peripneumonia*, ſunt undique frequentes. Perniones innumeris moleſti ſunt, ſæpe etiam in Adultis ulcerant.

Febres lentæ, *nervosæ* aliquæ, aliquæ *miliares*; *Aſthma* grave admodum ſævit plurimum, haud paucos Senes jugulat.

Plurimi in Vicinia, & hic quoquè, Tumore Faucium, Colli atque Capitis corripuntur, mox Inguinis & Teſticularum Dolore acuto, ac Tumore: hunc Morbum tamen Sanguinis Miſſio, & lenis Alvi Purgatio, ex facili diſcutit—Sanguis ſubflavo Glutine, haud autem valdè tenaci, obducitur.

Plena Luna 10. FEBRUARIO. Nova Luna 16.

Siccus quoquè & frigidus valdè fuit hic Mensis, utcunque enim per Initia Vulturſus Brumam aſperrimam temperavit aliquantulum, rediit tamen mox Aquilo cum duriffimo Gelu: Ad Finem verò Ventus australis ſpirabat, qui pluviæ fecit *Atmoſphæram* ac multò tepidiorem: *Barometer* altam tenuit Stationem toto Mense: Aer fuit interdum pertenuis, plerumque tamen craſſus valdè & fumofus, intercurrente ſubinde Malacia: Maximæ ſæpe ſæpiùs Pruina; medio nempe Die a Solis Fervore relaxata Terra plurimos exhalavit Vapores, quos Frigus nocturnum

num mox condensavit, imò & gelavit Forma
Prunæ — Mare ad Littora sæpiùs congelatum
fuit hoc Mense.

Pluvia 16. 19. 26. 27. 28. 29. Nix ali-
qua 12. = 0. 482.
Dig. Dec.

AB. 11. H. 8. p. m. N. 1x. Enorme Frigus
14. Thermom. 84.

⌘ Altitud. maxim 23. 30. 5. E N E 1. } media 30. 1²/₂₉
— — — — — minim. 28. 29. 8. S V V 2. }
Dies frigidissima 14. 84. E N E 2x. } media 68¹¹/₂₉
— tepid. 29. 56. S S E 2. }

Pleuritis, *Peripneumonia*, *Angina*, *Rheumatif-*
mus, maximè frequens undique; missus ex his
laborantibus Sanguis crassus est valdè & glutino-
sus, parùm habet Serii sublutei. Per plurimi *Tus-*
si, *Catarrho* *sthmate* sævo premuntur: Multi
Xerophthalmia laborant. Innumeri, etiamque Se-
niores, Pernionibus dolentibus, aliquando exul-
ceratis, cruciantur. Febris quædam *Catarrha-*
lis cum acuto Capitis Dolore & Vertigine, ac-
cedente etiam aliquando *Phrenitide*, multos deti-
net — *Phthisici* & *Asthmatici* jam pessimè se ha-
bent — *Variolæ* adhuc passim.

Scabies fœda jam regnat undique inter Po-
pulum.

Plena Luna 2°. MARTIO. Nova Luna 16°.

Perstat usque alta *Mercurii* Statio, Aer cras-
sus valdè & frigidus plerumque, Malacia fre-
quens, præsertim Mensis Initio. Primo Die,
flante Vulturno, multa decidit Pluvia, post au-
tem

1740)

de Morbis Epidemicis.

39

tem Ventus inter N w & N E constitit: Gelu
sæpe hoc Mense & maxima Pruina.

Pluvia $\frac{111}{1}$ 3. $\frac{1}{5}$ 7. 11. $\frac{1}{14}$ 18. 23. 26. 27.
Dig. Dec.

Grando 12. = 1. 278.

Circius vehemens 8. Mane. Magna AB. 12.
H. 9. N N E 2. levis AB. Vesperis 13. N N w 1.
— 14. H. 9. N w 2. Perfrequenter sanè notavi
AB. per duas, tresve Noctes consequentes Vento.
à Plagis Septentrionalibus spirante.

Altitud. maxim. 30. 30. 3. N 1x. } media 30. $0\frac{4}{11}$
— minim. 1. 29. 7. SE b E 1x. }
Dies frigid. 13. 67. N N E 5. } media 55 $\frac{18}{31}$
— tepid. 18. 51. N VV b N 1. }

Anginæ frequentes & Faucium Tumores;
Rheumatismi multi, & gravis sæpe Arthritis: Va-
riolæ adhuc. Asthma sævissimum, diuque admo-
dum durans, permultos premit; plures Phthisi-
ci moriuntur. Pleuritides & Peripneumonix plu-
rimæ, perrarò autem Sanguinolenta expuuntur,
ne liberè quidem & copiose aliquid, unde haud-
parùm in Morbo Discriminis.

Sanguis, ex omnibus Pleuriticis & Rheumati-
cis missus, est densus valdè & tenax, & non
Sero satis imbutus.

Nescio unde, sed per plures Menses, Junio-
res, atque etiam haud pauci Adulti, Lumbricis
teretibus infestantur, qui per Morbos sæpissimè
dejiciuntur — An à corrupto Frumento*, nec-
non immaturis & crudis Fructibus, Progenies
hæc verminosa?

D 4

Plena.

* Vid. Menl. August. Anni 1739.

Plena Luna 1^o. *APRILI*. *Nova Luna* 15^o.

Siccus fuit hic Mensis & frigidus maximè ;
stetit plerumque Ventus Orientem inter & Se-
ptentrionem , Malacia interdum interveniente ;
Pruina sæpissimè , & nonnunquam Gelu , ad xv.
Nix sæpe , & Grando pòst ; permansit Nix super
Montes ad xxvi. usque.

Pluvia 8. $\frac{1}{12}$. $\frac{11}{13}$. 14. 25. 26. 29. Nix 20.
Dig. Dec.
21. 22. Grando 26. 27. = 0. 802.
Levis Procella 23. p. m. N N w 4^x.

∪ Altitud. maxim. 17. 30. 2. Malacia } media 29. $8\frac{2}{17}$
— minim. 12. 29. 3. E 2.
Dies frigid. 14. 62. E N E 2x. } media 51 $\frac{3}{27}$
— tepid. 19. 45. N N VV 2x }

Perdurante adhuc eadem Aeris Constitutione ;
iidem prorsùs sæviunt Morbi , jamque multò
sunt severiores ; pereunt permulti Ruri & in Op-
pido.

Morbis acutis jam sæpe accedunt *Petechiæ* , et-
iam ipsis *Peripneumonicis* , hoc tamen accidit præ-
cipuè inter Nautas : Horum verò Sanguis pa-
rùm glutinosus est , sed magis putridus , ac livi-
dus quasi , ejusque Serum aut viride est , aut tur-
bidum maximè ac veluti Luto foedatum ; purus
lenta quoquè protinùs expuunt & persæpe foeti-
da : à *Scorbuto* * forsan hæc , qui longè longè-
que , his in Oris saltem , dominatur.

Vario-

* Vid. *Essay on Fevers* , p. 211.

1740) & Morbis Epidemicis.

41

Variolæ passim, & Pleuritis quædam acerbiss-
ma, quæ haud paucos jugulat More paraphre-
nitico, quarto vix elapso Die: horum Sanguis
extractus merum ferè Gluten refert.

Plena Luna 30. ult.

Nova 14.

MAIO. Plena Luna 30°.

Permanet usque sicca atque frigida Tempe-
stas, Ventus ferè perpetuus ab Oriente, flectens
plerumque ad Septentrionem, ad Austrum et-
iam aliquando, sæpe velox, mox tamen omni-
no silens, maximè sub Noctem; insolitum &
planè stupendum fuit Frigus pro Anni Tempore
Die v. vi. & vii. Mensis; imò haud parùm Ni-
vis decidit quinto.—*Atmosphæra* fuit perquàm
crassa, etsi tam Pluviæ parùm decidit.

Pluvia 4. 5. 12. 14.—17. 20. 23. 26. Nix
Dig. Dec.

Grando 4. 5. 8.—10. 538.

Procella 25. a. m. E 4. AB. 27. Vesperis N
w b w i.

Altitud. maxim. 9. 30. 1. N E 1. } media 29. 7 $\frac{11}{30}$
— minim. 4. 29. 3. NN E 2x. }
Dies frigid. 6. 62. N b VV 2. } media 42 $\frac{22}{30}$
— tepid. 30. 32. Malacia. }

Perfurunt usque Febres pulmonariæ, magisque
multò jam sunt malignæ Maculis nigris, lividis,
fuscis sæpe stipatæ; dolent vehementiùs Caput
Dorsumque, Præcordia premuntur maximè;
nunc quoquè semper ferè accedit Phrenitis effe-
ra, ac persæpe Angina quædam ulcerosa vel ab
ipso Initio, totas Fauces sensim perreptans: Vel
cruda

cruda prorsus, vel saniosa expuunt: Cruda, lurida, turbida Urina, pessimè significans, Nihil unquam deponit. Faustè interdum, sub Morbi Finem, Pustulæ erumpunt & Furunculi — sæpe verò jugulat Ægros hic Morbus, dira Anxietate jactatos, perpaucos intra Dies, More quasi *Paraphrenitidis*; imò etiam haud rarò *Hepatitis* correptos: nam & Situs Doloris & Color ictericus & intensa Urinæ Flavedo hoc indicare visa sunt.

Jamque etiam grassatur Febris putrida *petechialis*, quæ plurimos Nautas Orco dimittit atque inter Popellum multos. Hæ Febres sæpe complicatæ videntur & unitis Viribus sæviunt, pulmonaria nempe atque *petechialis*.

Variolæ nunc magis frequentes sunt, ut plurimum tamen mites, licet parcè admodum expuitur: At discreti sunt plerumque Generis, quod mirum utiquè videtur, quandoquidem alii Morbi acuti Monstri jam quid maligni alunt.

Tussis vehemens inter Equos cum Angina suffocante & Febre plures obruit; imò & bubulum Pecus tali etiam effectu sæpe abripitur. — Grex lanigera summa Macie & arida Tussi maxime laborat; pereunt Oves innumeræ, quarum omnium Jecur tumet multum & indurescit, Vesicula Fellis autem, subatra Bile turgida, ad enormem crescit Magnitudinem.

Nova Luna 13°. JUNIO. Plena Luna 28°.

Major fortè nunquam observata fuit Siccitas, Fontes arescunt prorsus, & Flumina desiccantur; *Pabula canescunt, cum Frondibus uritur Arbor*; Ov. Quamvis *Hygrosopia* omnigena siccissimam Aeris Tem-

1740) & Morbis Epidemicis. 43
 Temperiem denotant, tota *Atmosphæra* tamen
 crassa valdè & fumosa quasi apparet — unde
 utiquè nescio, ni deficit forsan sufficiens in *At-*
mosphæram Humor ad regularem Luminis Trans-
 missionem — Sic Corpora quædam videmus,
 quæ, humectata, pellucida sunt, arida verò o-
 paca prorsus. — Subsolanus à i. ad v. à xix. ite-
 rum ad xxv. cæterum Corus plerumque, haud
 rarò etiam Libs.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{7}$. 8. 10. 11. 13. 24. Grando
 Dig. Dec.
 multa 7. p. m. = 0. 742.

Altitud. mazim. 18. 30. 2. Malacia
 — minim. 7. 29. 3. S VV b VV 3. } media 29. $7\frac{24}{28}$
 Dies frigid. 12. 42. S VV b VV 2. } media 33 $\frac{3}{28}$
 — calid. 25. 25. S E b E 1.

Durat adhuc Febris *pneumonica*, quam sæpi-
 sime comitantur *Petechiæ* — Sanguis in hoc Mor-
 bo detractus lividus valdè imò & ater conspici-
 tur, ac plerumque nimium solutus*, haud rarò
 sane prorsus saniosus.

Variolæ frequentiores, sed ut plurimum beni-
 gnæ Indolis. — Febricula quædam cum Pustulis
 tubellis & valdè urentibus, quæ per ipsa Mor-
 bi Initia erumpunt, perfrequens; levis tamen
 videtur & evanescit citò magna Cuticulæ Aspe-
 citate relicta.

Febris

* In Febre peticulari epidemica, quam accuratissime de-
 scripsit *Ramazzini*, Sanguinem semper roseum, purpu-
 reum, solutum, invenit, minimè verò glutinosum. vid.
Ramazzini Constitut. Epidem. Ann. 1692. &c. Sect. 17. 47.

Febris nautica pestilentialis jam sævit maximè; en hujus Historiam.

Ineunte Vere ad hunc Portum appulsæ sunt Naves duæ bellicæ (*Panther & Canterbury*, quarum posterior mox à Mari *Mediterraneo*) ex his Ægroti plusquam ducenti ad Terram protinùs delati sunt; horumque Pars major Febre maligna, imò pestilente laboravit; hinc in Vulgum quoquè sparsa maximam edidit Stragem.—Nec vana forsan fuit Suspicio has quidem Naves Pestilentia quadam per Africas Oras tunc longè latèque grassante, attactas fuisse, quoniam has inter & illas frequens fuerat commercium.

Levis Rigor primò corripuit Ægros, mox subitus Ardor incerto prorsùs Ordine; Pulsus interea fuit admodùm inconstans, nunc incitatus valdè, nunc mirè depressus; accessit proinde Gravido Capitis, aut Dolor acutus, sæpe Occipitis, sæpe Sincipitis, sæpiùs autem in Temporibus, aut paulò supra Oculos, qui quidem longè vehementior—perdolebant etiam ipsi Oculorum Globi Lumininaque refugiebant: Sopor interim perpetuus urgebat, at parcus admodùm aderat reverà Somnus, Tinnitu Aurium semper molestante aut Vertigine gravi. Foedus valdè & amarus in Ore Sapor Vomitiones excitabat frequentes & biliosas admodùm; multa tamen permixta Pituita. Lingua ferè subflava erat, aut fusca & sordida, rarò autem valdè arida, medio autem scabra. Jam exemplò plurimùm debilitati discumbunt, anxii tamen & quasi perterrefacti, errantibus per omnia Membra huc illuc Doloribus. Urinæ tenues, crudæ, aquosæ, aut luridæ, sæpe tamen rutilæ, ceu tantillum inesset Sanguinis intimè permixtum, aut fortissimum aliquod Lixivium referentes;

par-

parcæ hæ & tenues semper; & Nihil prorsus deponabant:—Mali admodum Ominis nunquam non omnes has notavi Urinas.

Hæc quidem inter Morbi Initia, exactis autem tribus, quatorve Diebus in pejus multò ruebant omnia; jam enim vehementius ardet Febris, mox Phrenitis accedit, aut *Coma* Vigil, cum torvo Aspectu & fulvo oculorum Rubore; Jactatio perpetua, Anxietas summa, vix vel ipsis constantibus tolerabilis; sæpe Furor immanis, levis sæpe Desipientia aliena subinde murmurans.

Petechiæ violacæ, lividæ, fuscæ, imò & ipsæ nigræ, sextum inter Diem & undecimum sæpissime prodibant, nunc citius, nunc tardius; quò magis floridæ eò meliùs; fuscæ tamen quasi *Cutis Lenticulæ*, parvæ, innumeræ, malè semper significabant, at pessimè omnium *Vibices*, & *Ungues* atque summi *Digit*i lividi* aut plumbei—Funestum utique semper est hoc ultimum in Morbis acutis, indicat enim stagnantem in extremis Arteriis Sanguinem—bonum verò omnino ubi vividus adest Unguibus Color:—Medici est igitur hos etiam diligenter inspicere.

Adfuit vel ab Initio permagna Præcordiorum Oppressio, quæ aucta quotidie cum stringente quodam (hoc enim semper plorabant) Cordis Angore, & Respiratione tremula & singultiente quasi (imò sæpe diro cum Singultu ac Languore summo, haud rarò ad Deliquium usque) maximum portendebat Discrimen; cum & jam quoque Tremores, Subsultus Tendinum, Capitis Vacillatio, incerti Rigores, frigidique Sudores ingruerent

* *Essay on Fevers*. p. 98.

erent— Pedes erant sæpe frigidissimi, dum Facies, Genæ præsertim, magno flagrabat Ardore, profusus intereà & valdè foetidus Sudor manabat Talos ad usque; Pulsus interim exilissimus erat, at quàm citissimus: jam jamque instabat Mors.

Frequenter autem *Diarrhœa* foedissima Miseros colliquabat, arida prorsus facta ac dura Cute, Corrii ad instar, dum Lingua, quasi fuerat indurata Fumo, rigebat, impos ferè Motus, nedum Loquelæ. Haud rarò etiam in summo Morbi Statu *Apthæ* subnigræ, ulcerosæ, totas Fauces cruciabant Gulamque, quas paulò pòst perpetuus insequeretur Singultus; Saniosa inde, aut *gangrænosa*, *Dysenteria* Ægrotos brevè conficiens—Levis attamen obrepens Alvi Fluxus circa undecimam, ceu Arte, Sponte eveniens, Saluti fuit plurimis, modò nec lividus, nec liquidus nimium.

Jam nunc quoque (Morbi nempe Statu) interdum maximum attulit Levamen larga Pustularum Eruptio, More veluti Variolarum, quæ tamen nil nisi tenuem & acrem *Ichorem* continebant * — erumpebant etiam aliquando multò minores, at urentes admodum, quæ verò in Squamas mox abirent: salutiferæ quoquè & hæ. In quibusdam peralbas quasdam & latas Maculas notavi, paulò eminentes, quasi ex Urticæ Morbo; hæ verò difficilis Indicium.

Erant verò Ægrotantes plurimi ubi Nihil horum planè, sed aut *Parotides*, aut Tubercula, aut in Auribus *Apostemata*, eos sublevabant: omnibus erat ferè magna Surditas, diu durans.

Mul-

* *Φλύκταιναι* veterum Medicorum.

Multis fuit Narium Hemorrhagia salutaris, ac pessimum ubi paucae, acres, subcruentae Guttulae destillabant; nec utique juvabat semper copiosa; nam haud raro longè nimium profunde-
bant Nares, imò ad *Synopen* usque, praesertim sub Julii Finem, cum esset saepe prodiga valdè: tunc etiam *Dysenteria* cruenta saepius accederet.

Vix ullam memini Febrem in qua *Scotomia* & falsi Oculorum Splendores erant tam frequentes.

Nihil utique novi aequè certum Vietricis Naturae Signum ac liberum valdè & copiosum Spuum, benigno prodeunte Sudore, aut fluente as-
tatim fulva & crassa Urina: perraro autem Sedi-
menti aliquid deposuit Lotium per totum Morbi Decursum; imò, cum interdum crassum fuisset
modum per Horas aliquot, mox tenue prorsus eddebatur. Signum hoc semper est malè judi-
catae Febris: atque adeò hæc vel ex levissima Cau-
sa fuit recidiva—Si quis carnem comederet vel
piscem, nisi probè purgatus & confirmatus benè,
certò certius hoc passus est magno herclè cum
vitæ Periculo; nec minùs sanè subiret Discrimen
sepe ab acriore *Cathartico*.

Mihi equidem haud levis Noxa Popello acci-
sse visa est à nimia Comestura Piscium, qui
abundantissimè hac Tempestate undique scate-
ant, præcipuè Scombri; quippe qui lentos ge-
nerant ac rancidos Humores. Sudor vel sanis-
simi Hominis, qui multo utitur Pisce, longè ma-
gis foetidus est quam si Carne solùm & Pane ve-
reretur—quinimò jam diu notum est, quòd ni-
sius Piscatus *Scorbutum* infert & Morbos cuta-
neos

Hæc adeò de Febris Natura, jam quoquè de
uratione pauca.

In Morbis equidem curandis Regulæ quædam generales servandæ sunt, cum eo tamen, ut propria quoquæ cujusque Ægrotantis Natura perspicienda sit: ideò ex *Hippocrate Celsus* * dixit
 “ Mederi oportere & communia & propria in-
 “ tuentem. “ Nec in ulla Re magis hoc necessarium est quàm in Sanguine mittendo, ubi & Vires & Ætas & Habitus diligenter sunt consideranda.

Ipsò harum Febrium Initio rectissimè mittitur Sanguis, plùs, minùsve, pro Ratione *Symptomatum* nempe †: Si Pulsus sit validus, si Febris vehementis, si Dolor acutus, repeti id debet, maximè si Pellicula tenax Cruorem obtegit, minimè tamen si haud satis firma sit Sanguinis *Craasis* & tenuis nimium, præcipuè si Serum ejus sit luridum valdè, aut rubellum—Haud tamen fida satis Indicatio Colore & Superficie Cruoris desumitur nisi pleno Flumine & Impetu profiliat: cum per Brachium destillat, aut exit quasi guttatim falsa semper & florida Specie decipit.

Secta imprimis Vena, mox Vomitus leni *Emetico* movere oportet, maximè si Nausea urget aut Vomitus; hoc enim Modo exantlatur optimè biliosa Colluvies, Fomes, si restaret, futurus Morbi—Hoc etiam ipsa Natura indicat, sua sæpissimè Sponte Vomitiones concitans—Nec solum Initio, sed in quolibet Morbi Statu eluendus est Ventriculus, si urget Vomendi Conamen, aut Ructatio biliosa, olida & ingrata valdè ‡—Vitellus Ovi putridus

* *Cels.* Præfat. p. 17. ex Edit. *Almeloveen.* † Perlege quæ de Sanguinis Missione dixi in Febribus putridis malignis, *Essay on Fevers*, p. 104. ‡ Ubi Ructus amari cum Gravitate Præcordiorum sunt, ad Vomitus proinus confugiendum est. *Cels.* Lib. 1. C. 3.

tridus, vel ad perpauca Grana datus, horrendam
mox excitat Choleram; stagnans & putrida Bilis
haud multò minùs virulenta est, quam primùm
igitur est ejicienda.

Sequitur plerumque post *Emeticum* Alvi De-
jectio, si verò non respondet, Clystere leniore
ducenda est: sive sic parùm reddit, sive fuerat an-
te Febris Accessionem astrictior debito, *Pharma-*
cis idoneis liquanda est, Manna nimirùm, *Crema-*
re Tartari, *Rhabarbaro*, Sale *Glauberi*, &c. quæ
scilicet in primis Viis præcipuè agunt, minimas
saltèm movent in Sanguine Turbas. — *Drastica*
utiquè *Cathartica* deprecor prorsùs, utpotè nocen-
tissima: mitiora verò hæcce exterminant commo-
dè Humores, qui in Visceribus diutiùs morando
majorem indiès acquirunt Acrimoniam, imò &
in Sanguinem per Vasa *Mesaraica*, Venasque la-
cteas remigrant perpetuò. — Et post Vomitus
& post *Catharsin Theriacæ Andromachi* aut *Elixir-*
is asthmatici paululum administrandum est.

Hisce peractis paulisper jam cunctandum est,
ut qua Natura vergat scrutemur, nec officiosa
Medicamentorum Farragine illam agamus de-
viam*; intereà tamen Diluentia quædam subacida
propinanda sunt affatim, ut nova puraque Mate-
ria corrupto Sanguini admisceatur, ut acres ejus
solvantur Sales, atque peccans corrigatur Acri-
monia; hoc enim Modo *Crisis* promovetur opti-
mè; præsertim si lenia aliqua attenuantia ac sol-
ventia adjuncta sunt. Nec facilè video quæ alia

* E

Medi-

*— Ἀμαλγσῶν τῶν Νοῦτων Ἡσυχίου. ἔχειν βελτίον. *Hip-
pocrate*. Aph. 29. Sect. 2. Maximi profecto est hoc Moni-
tum in acutis, quis prudens Medicus Naturam durante
Paroxysmo vel Febris intermittens interturbat?

Medicina hoc Tempore Febris tentanda sit, ni forsan Vis Vitæ langueat, & torpeat Sanguinis Motus; tunc enim Stimulis agitandum est idoneis, *Epispastica* admovendo nempe; generosa porro exhibenda sunt *Alexipharmaca*.—Sed ne nimius sis, obsecro Medice! in Salibus *Volatilibus Alcalinis* ingerendis, ruunt enim jam omnia ad summam Putredinem, nisi Humorū Acrimonia temperare potes, & Sanguinis Dissolutionem prohibere.—Ideò ubi calidiora Medicamina exiguntur, admiscere soleo plerumque Acida quædam, uti Acetum, *Limonii* Succum, vel *Elixir Vitrioli*; quod Aromatibus imbutum haud contemnendum est *Alexipharmacum*, cujusque Guttæ aliquot sæpius exhibendæ sunt, ex Vino aromatite, aut *Julepo* quodam *Cardiaco* cum Bolo ex *Confect. Cardiac.* Croco, *Rad. Contrayerv.* &c.—Sed Nihil necesse est tradere Formulas, cum qui, quid indicatur in Re præsentē, calleat facillimo Negotio potest adaptare Remedia*: cave tamen ne Calcaribus utaris cum Opus est Fræno; nec vehemens nimium esto in Sudoribus exprimendis præcalidam Medicinam urgendo, nam si probè diluitur Sanguis, & servatur bene mistus, suo semper Tempore, suaque Sponte, ipsa Natura Sudorem profert†—Haud ibo Inficias equidem quod absque Sudore quàm rarissimè solvitur Febris, profusus tamen mihi semper suspectus est.

Hanc

* Εἰ τις ἐδέῃ τὴν Αἰτίαν τοῦ νοσήματος, οἷός ἐστιν προερεῖν τὰ συμφέροντα. Hippocrat. de Flatib. Initio. † Πάντη δὲ ἀνοιγόμενον, τε ἡ ἀναπνὴν, καὶ κινεμενον τὸ Σῶμα, συμφέρον ποιήσει. Hippocrat. de Locis in Homin. Sect. 39.

Hanc adeò in Morbis hujusmodi curandis *Methodum* plerumque sequor—Per Initia Febris, debitas post Exinanitiones, *Hauftus salinos* præcipio, ex Sale nempe *Alcalino* fixo aut *volatili* (prout Res postulat, quorum hic Sudores, ille Urinam magis movet) Succo *Limonum*, *Aurantiorum* Hispaliensium, aut Aceto Vini acerrimo, bene saturato, cui admisceo Aquam *Alexeter* simplicem Sp. Lavend. C. aut his similia. Hoc modo conficitur Medicamentum; blandi ad instar Saponis, crassos resolvens Humores ac cum aquosa Sanguinis Parte Olea Salesque intimè commiscens—Diluentia interim subacida affatim ministranda sunt, quæ, mediante hoc Remedio salino, toti Humorum Massæ promptissimè admiscuntur: Sic bene mistus & fluidus servatur Sanguis, ejusque temperatur Acrimonia; dum acres soluti Sales per Cutim, per Alvum, per Urinam effluunt perpetim; nec verò intercè interturbatur Natura dum Concoctionem molitur. Atqui si tardat nimis languetque, generosa magis Medicina vacillantem refoveo; id maximè, si aut Sudor sit frigidulus, aut Urina Pallida, aut Eruptiones (Pustulæ sint sive *Petechiæ*) Coloris minùs vividi.

Per hæc efficitur plerumque ut blandi tandem Sudores erumpant, qui Febrem tenuant quotidie; si tamen inæquales sunt, & parùm constantes, aut subfrigidi, aut profusi admodum, haud ita feliciter, mox enim Rigor accedit sæpe, ac Febris *Exacerbatio*, paulòque post Phrenitis; qua quidem ingruente Alvus protinùs *Enemate* ducenda est si fuerat astricta (vellem utiquè semper teneram potiùs quàm constipatam per totum

Morbi Decursum) Si Furor urget ad Cucurbitulas scarificatas, Humeris Cervicibusque affixas, confugiendum est; quo peracto *Epispastica* admovenda sunt pone Aures, Occipiti, ipsis quandoque Locis scarificatis; Tibiis proinde aut Femoribus—Hæc verò maximè ex Usu sunt, ubi Vis Naturæ torpet, languetque Pulsus Arteriarum—Jam autem Bolis *cardiacis* adjicio *Campchoram* ac *Succini Salem*, interposita quoque interdum *Uncia una*, vel altera, *Diacodii*, imò si Vigiliæ urgent uno, alterove, Extracti Thebaici Grano.

In hac ferè Medicina perfisto Morbi usque Statum, quo aut in melius, aut pejus multò celerius mutantur omnia; nec Dies jam, sed & vel ipsæ Horæ æstimandæ sunt: Si modò nec propitius adjuvat Sudor, neque *Diarrhæa* blanda, nec libera accedit Expuitio, in Malis Aeger est—Tentandum est tunc utiquè quid possit lenis Alvi Purgatio, exhibendo nimirum *Rhabarbarum*, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Salem Glauberi*, &c. subveniendum est interea Virium Ruinæ *Cardiacis* idoneis: vix meliora novi utiquè quàm Vinum rubrum generosum Aromaticis incoctis, Cinnamo scilicet, Maci, Nuce Moschata, Cort. *Aurant. Hispalienf. &c.* cum Aquæ Dimidio, aut subaustera quædam *Alexipharmaca* cum *Elix. Vitrioli*, vel *Limonum* Succo; hæc quippe & Vim Fibrarum & Sanguinis *Crasin* confirmant, Humorum autem Putrefactioni obsistunt maximè. Quod quidem diligenter cavendum est, ubi aliter Sanguis in Saniem, Lympha verò in *Ichorem* degenerant, brevique obrepit omnium Dissol-

Dissolutio putrida, ac si Sanguini immistum fuisset Viperæ * Venenum.

Purgationem per Inferiora poscunt Hypochondria tumida, Intestinorum Murmura, Abdomen tensum, Alvus adstricta, Caput grave, Somnolentia nimia, Vertigo, ingruens Delirium, Halitus foetidus valdè, & Præcordiorum Oppressio cum Ructu frequente.—Prohibent autem Sudores faciles, constantes & æquales, Pustulæ, aut *Exanthemata* jam erumpentia, Expuitio copiosa adveniens; nam vel in *Peripneumonicis* *Diarrhæa* sæpe Sputa supprimit prorsus; quod quoquè in *Variolis* haud rarò accidit infelicitè—minùsque commodè semper fert *Catharsin* magnus Virium Languor.

Sub conditionibus autem suprà expositis nullo non Tempore Morbi Alvum moveo †, maximè declinante Febre, ubi nulla alia Via molitur Natura *Crisin*.

Tentatur sæpissimè, fausto admodum Successu, hæc purgandi Methodus in *Variolis* confluentibus, nono, vel undecimo ab Eruptione Die, cum parùm aliquid ultra per Salivæ Ductus, aut per Cutis Meatus exterminari possit: Quidni & in hac quoquè Febre?—Procul Dubio ubi putrida Colluvies atque corrupta Bilis in Ventriculo & Intestinis abundant, quantocyùs herclè expurganda sunt, ni vis usque fovere Morbum, aucta in Horas Putredine †.—In hac Febre profectò, de qua nunc agitur, & per Vomitum & per Alvum immensam Vim biliosæ Saburræ sæpiùs rejectam vidi, magno utiquè cum Ægro-

* Vide *Essay on Fevers*, p. 51. † Ibid. p. 111. — 114.

tantum Levamine; suavi mox accedente Somno, ubi per plures Dies Noctesque summa antecesserat Anxietas, ac Vigilia perpetua—Dum Venterculus sanè acribus gravatur Sordibus, & putrida Bile, laborat semper maximè Caput, perturbantur Spiritus, & prosteruntur admodum Vires.—Nec in primis tantum Viis felices edit Effectus Vomitus, sed & per omnem undique Vasculorum Compaginem, ubi lentescientes attenuat Humores, putridosque expellit.*

Nova Luna 12°. Julio. Plena Luna 27°.

Hic quoque Mensis fuit subfrigidus, Aer autem maximè siccus & quasi fumosus; Libs sæpe afflavit, Corus sæpius, Eurus interdum: Fons omnis & Rivus exarescunt ferè, vix viridis inventa est Herba.

Pluvia 4. 7. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{12}$. 16. 19. 20. 26.
Dig. Dec.

30. = 0. 608.

Tonitru 30. Pluvia gravissima ad Septentrio-
nem 28.

8 Altitud. maxim. 15. 29. 9. N N VV 1. } media 29. $6\frac{16}{31}$
—— minim. 26. 29. 3. S S VV 3.
Dies frigid. 22. 39. N N VV 1. } media $31\frac{3}{31}$
— calid. 3. 26. S VV b VV. 2x. }

Variolæ jam epidemicæ, mites tamen plerumque; Rubcoli passim & Morbi Pulmonis; sub Finem Mensis Dysenteria frequens.

Jam

* Vide Cr. Cheyne's *new Theory of Fevers*, p. 83—94.
Edit. 3. Ann. 1722.

Jam maximè furit Febris pestilentialis plurimosque demittit ad Umbras; Funera certè nunc sexiès saltèm excedunt solitum Numerum: nec solùm hìc, sed & per Viciniam jam grassatur Morbus. — Anxietas horrida, Jactatio perpetua, atrox Capitis Dolor, cruciant Ægrotos, atque mox ferox accedit Insania, paulòque sæpe pòst Veterous, aut Nervorum Distentio: Alvus, Urina, Lachrymæ, Nil sentientibus effluunt, sæpe Vox Faucibus hæret prorsùs, sæpe Lingua nigra aridissima, Verba incondita, aut aliena balbutit. — Plurimis sub Morbi Finem adest Exulceratio Faucium acerbissima, etsi Initio levis tantùm erat Aspretudo; difficillima hinc Deglutitio, nec sine summo Tormento. *Parotides*, *Bubones*, Furunculi admodùm dolentes; haud rarò nonum inter Morbi Diem & decimum quartum erumpunt; Salutaria hæc plerumque, maximè si probè suppurant, pessima utiquè si mox recedunt: interdum verò per plurimos Dies indurata permanent sine vel minima Suppuratione, præcipuè in Cervicibus, ubi per Menses etiam aliquando perdurant.

Circa hoc Tempus quoquè sæpe *Diarrhœa* salutifera oritur, id potissimum si biliosa, aut subnigra, atqui non nimis liquida, dejiciuntur: Alvus autem saniosa, cruenta, aut valdè aquosa, mala semper — hujus autem Fœtor plerumque vel Aniculis ministrantibus, imò & ipsis Ægris, planè intolerabilis: interdum urget admodùm pestifer Tenesmus.

Urina vel in Convalescentibus cruda perstat, ac sæpe tenuis, sæpe autem turbida, lactea, & oleosa quasi, nihil tamen omninò Sedimenti deponit: evidens hoc magnæ Cruditatis Argu-

mentum est; adedque, licet Ægrotantes penè restituti viderentur, frequenter tamen promptissimè, in * Recidivas incidunt. Convalescentes sanè, qui Carnem nimis citò, aut Pisces comedunt, in Febrem certò certius relabuntur; Præcipuè haud probè prius purgato Corpore. — Fortiora tamen *Cathartica* hos etiam in idem Periculum conjiciunt.

Quibus in Meatu auriculari, aut pone Aures; aut per Cervices Abscessus enati sunt, maximè si circa Labia Pustulæ plures urentes, certa ferè Spes Salutis effulsit: omnibus Ægrotantibus Surditas ac Tinnitus aurium accidit, diu sæpe post ruptum *Apostema* durans.

Mirum est herclè, quod Eruptio tantillæ Materiæ morbidæ tam felices sortiatur Effectus; quod tamen persæpe videmus: vix enim hoc Modo ejici posse videtur Morbi Causa. Suspicor ego quidem hoc duntaxat esse Signum, quòd validæ adhuc sint Naturæ Vires, & quòd sit usque Sanguini Motus sat expeditus per ultimas minimalque Arteriolas: quibus deficientibus, nec maturatur *Apostema*, aut Tuberculum, nec emergunt Pustulæ. Hinc vides paulò ante Mortem, succumbente nimirum prorsus Natura, Ulcuscula pallida, aut exsiccata, &, si quæ sint Pustulæ, eas pallescentes, aut luridas, hærente scilicet in extremis Vasculis Sanguine.

Inter salutifera Signa insuper fuit acidus, aut falsus in Ore Sapor, cum Sputo multo; contrà verò amarus & quasi ex Ærugine (ut dicerent) foedus

* Febris, quæ sine Ratione, sine bonis Signis, finita est, ferè revertitur, *Cels. Lib. 2. C. 7. Hippocr. Aph. 12. Sect. 2.*

cedus certum fuit malè judicati Morbi Signum ;
e Febris mox recidivæ, ni per Vomitum, aut
enem *Catharsin* ocys expurgata forent putrida
Bilis & colluvies morbida. Quo quidem pe-
acto felices quotidie experiebar *Tincturæ Corti-*
is Alexipharmacæ * Effectus, & ad Vires refi-
iendas & Febris Reliquias abigendas. Hujus est
tiquè Medicamenti roborare Fibras atque debi-
am Fluidorum Constitutionem restituere, nec ta-
nen intereà prohibet morbose Humoris Exitum
er Cutis Meatus: hinc longè tutiùs sæpe exhi-
etur quam ipse Cortex *Peruvianus*, qui haud
arò vehementer nimis constringit.

Per totam hanc insaluberrimam Tempestatem
desiccatoria immensum ferè fundebant Humorem,
anescebant verò difficillimè; quosdam certè e-
ormi Fluxu consumeabant prorsùs.

Diu fuit undique Piscium immensa Quantitas,
maximè Scombrorum, quorum Usu immodico
rocul Dubio plures generantur Morbi; augent
nim & Humorum Putredinem ac Labem *Scor-*
uticam, jam ubique grassantem, inter Nautas
ræcipuè, quorum Gingivæ exesæ sunt admo-
um & Halitus Oris valdè olidus—Rectissimè
leò cum Piscibus comeditur Aceti plurimùm,
quod rancidum eorum Oleum corrigit, & putre-
entem Indolem—Nullus utiquè dubito quin lar-
us Aceti & *Pomacei* Usus foret Nautis utilissi-
us in longis Navigationibus †: imò hoc jam
tis expertum est, adeò ut secum plurimi ad In-
iam usque Orientalem *Vinum Pomaceum* depor-
tant:

* *Essay on Fevers*, p. 122. † Vide Monitum nostrum
e Sanitate Nautarum tuenda ad Calcem Lib. de Febris.

tant: Acetum verò Carnis & Aquæ Corruptionem prohibet.

Nova Luna 11°. *AUGUSTO*. *Plena Luna* 25°.

Maxima jam Cœli est & Soli Mutatio, perpetuæ ferè decidunt Pluviæ, atque omnia nimio diffuunt Humore; unde Messis infelix admodum, Frumentum penè corruptum, & Fructus prorsus fatui—Immensa scatet undique Virentium Fungorum.

Ventus fuit australis sæpissimè; haud rarò sæviit Libs procellosus, hinc *Atmosphæra* crassa valdè, frigida, & maximè humida, præsertim sub Mensis Finem.

Pluvia ^{II} 2. 3. 4. ^I 5. 6. 10.—12. 15. ^I 16. ^I 17. 18.
^{II} 20. 21. 22. 24. 25. ^{III} 26. ^I 27. ^I 28. ^{III} 31. = 3. 5 10. Dig. Dec.
 Procella 26. a. m. S S W 4^r.—28. a. m. S W 4.
 Magna Pruina 29.

⌘ Altitud. maxim. 30. 29. 0. S E 1. } media 29. 4²/₃
 ——— minim. 3. 29. 1. S VV 2. }
 Dies frigid. 29. 42. N. 1. } media 34²⁵/₃
 — calid. 1. 27. N VV 1. }

Variolæ Epidemicæ, quæ hic quidem parùm sunt lethiferæ, longè aliter tamen aliis in Locis.

Dysenteria cruenta, ac *Cholera* frequens—multi levi Angina atque Faucium Tumore vexantur cum Doloribus vagis *rheumaticis*.

Grassatur adhuc Febris nautica maligna, Plurimosque trucidat, quosdam vel Die septimo, imò interdum citiùs; multos autem vel ad vicissimum & ultra trahit—jam sæpe aut nullæ prorsus

us apparent *Petechiae*, aut raræ; sæpe tamen totum Corpus maculant — crebrò Sudores pingues, foetidi Ægrotos, colliquant; haud rarò quos febris ferè reliquerat sæva *Dysenteria* consumit: plutis adeò Sanguinis Principiis, qua data Porta eunt Humores.

Nova Luna 10°. *SEPTEMBRI*. *Plena Luna* 24°.

Ventus ab Occidente, ad Austrum plerumque vergens, prævaluit decimum usque octavum, continua ferè ac gravi decidente Pluvia, post item contrariò planè Cursu spirabat, surgente *Perisporio*, Aeremque ficcabat.

Pluvia 1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 13. 15. 17. 22. 23. 24. = 3. 628.
Dig. Dec.

Levis Procella 7. p. m. S w b w 4^x. — 27.
Nocte E b S 4^x. Paraselenæ 17. H. 7. p. m.
N w 1.

Altitud. maxim. 25. 30. 0. N E 1. } media 29. 6²/₃
minim. 11. 19. 0. VV 3. }
es frigid. 30. 59. N E 1. } media 41¹/₂
tepid. 6. 34. S VV 2. }

Febres malignæ jam nec Vi, nec Numero, adeò sæviunt. *Dysenteria* plures cruciat; Tussis quædam gravis *Asthmatica* haud paucos. Tumores Faucium, *Parotidum*, Maxillarum cum verbo Dentium Dolore permultos divexant: morbus colicus à *Pomaceo* novello, cum Alvo rissima plures exercet, *Ophthalmia* passim, *variola* plurimæ.

Nova

Nova Luna 9°. OCTOBRI. Plena Luna 23°.

Fuit hic Mensis multò frigidior solito, Gelu ipso Initio, etiam rigidum Die decimo; Borea plerumque spiravit, Eurus haud rarò, pluvius Auster nonnunquam: Alta fuit utplurimum Barometri Statio, Aer verò crassus.

Pluvia $\frac{11}{4}$ $\frac{6}{5}$ 6.—8. 16. $\frac{11}{17}$ $\frac{6}{19}$ 20. 21. $\frac{1}{23}$
 $\frac{1}{24}$ 28. 29. Grando 7. Grando & Nix multa
 Dig. Dec.
 ta 23. = 1. 914.

⌘ Altitud. maxim. 27. 30. 3. N E 1. } media 29. $8\frac{21}{28}$
 ——— minim. 20. 29. 3. S VV 2x. }
 Dies frigid. 27. 69. } media $56\frac{12}{18}$
 — tepid. 20. 44. }

Febres lentæ *nervosæ* frequentes; permanentes usque aliquæ malignæ quibus sub Finem accedunt *Diarrhæa*, interdum *Dysenteria* mucosa cum Sanguiinis Strigmentis.

Tussis, Angina, Faucium Tumores, Dentiumque Dolores perplurimos corripunt. Jam regnant admodum *Colica pomacea*, haud solito tamen cum Furore, ob *Diarrhæam* ferè semper comitantem *Variolæ* adhuc *epidemicæ*.

Nova Luna 8°. NOVEMBRI. Plena Luna 22°.

Fuit & November perquam frigidus, Aer plerumque crassus, afflavit Aquilo sæpe, sæpe Caurus,
 rus,

us, intercurrente frequenter Africo furente & pluviOSO; maximæ subinde Pruinæ, haud rarò rigidum Gelu.

Pluvia $\frac{III}{I}$. $\frac{I}{2}$. 5. 7. $\frac{I}{9}$. 10. 11. 13. 14. $\frac{II}{16}$.

20. $\frac{II}{21}$. 22. 23. $\frac{III}{25}$. $\frac{I}{27}$. 28. — 30. Grando 1. Dig. Dec.

25. Nix multa 2. 24. 25. = 3. 844.

Procella gravissima 1. à primo Mane ad Noctem usque. N. w 4^x.

21. Mane S w b w 4. — 26. Nocte S w 4^x.

Fulgur & Tonitru 25. Vesperi.

Altitud. maxim. 18. 30. 2. N N VV 1. } media 29. 5²⁰
 ——— minim. 24. 28. 8. E 2.
 dies frigid. 25. 69. N N E 1. }
 — tepid. 15. 50. S VV b VV 1. } media 60²⁰

Variolæ usque grassantur; Febres malignæ assim, lentæ ac *miliares* sparsæ, Ruri præcipuè: erysipelas, Angina, Tusles acres haud paucos corripunt. Plurimi Colica *pomacea* laborant cum *diarrhæa* plerumque, adeòque citò profligatur;olutum enim Ventrem rarò torquet admodum colicus Morbus, saltem brevi cedit Anodynis; sique opportunus est Locus post unam alteram. e Rhabarbari *Dosin*; neque inter hæc melius est aliquid *Philonio*. Cave tamen ne Alvum nimis citò strictam reddas, nam paulò post ut plurimum recrudesceit Dolor, congesta scilicet iterum cri Colluvie; tenera iccirco semper per Dies aliquot servanda est; probe autem intercà munien-

dum

dum est Corpus à Frigore, aliter, constrictum
Cute, mox plectuntur Viscera *.

Nova Luna 7^o. DECEMBRI. Plena Luna 21^o.

Per Initia *Decembris* dira, procellosa, pluviosa
Tempestas, Libs interim quotidie perfremuit
Die 2. & 3. Fulgura sæva cum Tonitru, Grandine
Pluvia; hinc Aer factus est craissimus & maxi-
mè humidus. Ab undecimo ad vicesimum, mu-
tata penitus Rerum Facie, rigidissimum Gelu
immensæ Pruinæ; Cœlumque sudum perflant
Borea: inde verò Auster prævaluit atque *Atmo-*
sphæram densam valdè ac udam maximè fecit

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-----------|
| | ⁱⁱⁱ | ⁱ | ⁱⁱ | | ⁱⁱ | ⁱⁱ | ⁱⁱⁱ | ⁱⁱ | ⁱⁱ | | |
| Pluvia | ⁱⁱⁱ 1. | ⁱ 2. | ⁱⁱ 3. | 4. | ⁱⁱ 5. | ⁱⁱ 6. | ⁱⁱⁱ 7. | ⁱⁱ 8. | ⁱⁱ 9. | 10. | 19. |
| | ⁱⁱⁱ 21. | ⁱⁱ 22. | ⁱⁱⁱ 23. | ⁱ 26. | ⁱ 27. | ⁱ 29. | 30. | 31. | Grando ve- | | |
| | | | | | | | | | | | Dig. Dec. |

hemens 2. Nix 14. 15. 19. 20. = 6. 290.

Furens Procella 1. Nocte S w 4^x. — 2. p. m.
S w b w 4.

Procella 3. S w 4^x. — 5. w 4^x. Vesperi — 6.
primo Mane w S w 4.

— 20. ante Lucem N w b N 4. — 21. to-
to Die SSE 4. cum enormi Pluvia, quæ o-
nem penitus Nivem colliquabat; isto etiam Die
Fulgura & Tonitrua gravissima.

Nebu-

* Consensum Cutim inter & Intestina probè novit *Alex. Trallianus* “ αὐξεραι γὰρ τὸ πνεῦμα (ad Intestina scilicet) εἰς ὅσον ἂν πυνώθῃ τὸ Δέρμα. “ *Trallian. p. 216. ex Edit. Goupyli*, sed etiam *Hippocræ. Lib. 6. Epidem. Sect. 38* ipso Initio *Lutet. Fol. 1548*.

741) & Morbis Epidemicis. 631
Nebula foetidissima 27. w S w 1x.

Altitud. maxim. 31. 30. 0. N VV 1x. } media 29. 4.
— minim. 22. 28. 8. S S VV 3x. }
es frigidissim. 19. 80. E N E 1. }
— tepid. 8. 49. S VV 3. } media 61 $\frac{25}{30}$

Crebrae adhuc Variolae: Pleuritides, Peripneumoniae, Rheumatismi passim: Febres petechiales quae adhuc, Tussis vehemens, & Asthma grave urimos premit: Morbus colicus frequentissimus, hunc tamen Alvus cita admodum & bilio. brevi solvit.

Tota Pluviae Quantitas Anno MDCCXL.
Dig. Dec.
24. 042.

Nova Luna 6°. JANUARIO. Plena Luna 20°.

Ab Initio Mensis ad Diem sextum spiravit Caucas, inde ad decimum quintum frigidissimus Bos, tunc Libs pluvius irruit, a vicesimo sexto men ad Finem usque fremuit subinde Vulturis—Medio Mense acerrimum Gelu, Aerque dè ficcus; dum autem Africus perflavit factus est humidissimus, liquecente prorsus Gelu.

Pluvia 2. $\frac{1}{16}$. $\frac{11}{18}$. $\frac{111}{19}$. $\frac{2}{21}$. $\frac{1}{22}$. 24. 25. $\frac{1}{27}$.
Dig. Dec.

29. Nix 10. 12. 14. = 1.936.
Procella 27. Nocte & toto Die sequente S E
E 4.

Altitud. maxim. 1. 30. 3. N. VV 1. } media 29. 8.
— minim. 16. 28. 9. SS V 3. }
s frigidissima 15. 79. E N E 1x. }
tepid. 22. 52. S VV 3x. } media 61 $\frac{22}{31}$

Vario-

Variolæ frequentes etiamnum; Perplurimi Colica laborant, multi sanè ex Usu *Pomacei* novelli, haud pauci verò à superabundante Bile; omnes liquida citaque Alvus exercet, nunc biliosa valdè, nunc mucosa. Multi acuti Pectoris Morbi; Anginæ & *Rheumatismi* frequentes *Apoplexia* & *Epilepsia* passim.

Tabidi pulmonarii jam pessimè se habent, aucta nempe plurimùm Tussi & Gravitate Spirandi.

Febris *petechialis* jam paulò magis sævit.

Fœda admodùm Scabies dominatur maximè inter Popellum, obstructis nimirùm Cutis Spiraculis, à gravi longoque Frigore, detinetur Materia, quæ perspirare debebat, unde Glandulæ mamillares obserantur atque roduntur tandem — In frigidis Regionibus & Tempestatibus semper grassatur *Scorbutica* Lues, densata plurimùm Cutis ac retenta nimium salina Corporis Fuligine — an non hinc hujus *Trophylaxis*, annon hinc Cura est facili elicitur? Multò faciliùs utique curatur per Æstatem quàm durante Hyeme asperiore.

Nova Luna 4°. FEBRUARIO. *Plena Luna* 19°.

Sublimè utplurimùm stetit *Mercurius* in Baroscopio hoc Mense, idque etiam Initio, licet Vulturnus nonnunquam flavit, imò & ipse Austroster; Aer autem tunc fuit humidus valdè & crassus*; à decimo octavo tamen ad Finem usque frequens Ventus borealis *Atmosphæram* tenuem fecit, perquam frigidam, & multò sicciolem.

Pluvia

* Vid. Vol. I. p. 181.

Pluvia 1. 5. — 7. 10. ¹¹14. 15. ¹⁶16. ¹⁷17. 18. 19.
Dig. Dec.

26. Grando multa 15. 16. 17. = 1.456.

Barometer fuit ad 30. 5. * septimo etfi Ven-
tus S S E 2^x.

Maxima verò tunc Nebula. — Procella 16.
Mane S 4^x.

Fulgur & Tonitru Vesperi. Quàm maximus
Halo circa Lunam 11. H. 9. p. m. S w b w 1.

& Altitud. maxim. 27. 30. 6. E N E 1. } media 29. 9 ⁵/₂₈
— minim. 16. 29. 2. S b VV 3^x. }
Dies frigid. 24. 72. E N E 1. }
— tepid. 6. 53. Malacia. } media 59 ²/₂₈

Multæ adhuc *Variolæ* : *Rheumatismi*, *Peri-*
pneumoniæ, *Pleuritides*, & veræ & nothæ passim.
Tusles vehementes, & diri admodum *Asthmatis*
Paroxysmi frequentes : hinc Tempestas fuit ma-
ximè noxia tabidis, nam Tussis movet Boreas,
Pulmones verò constringit ac Sputa suppri-
mit. — *Colica* & *Diarrhæa*, seu Tormina sæviunt
plurimum.

Durat usque Febris maligna, inter Nautas ve-
rò præcipuè, & maximè in *Nosocomiis*.

Nova Luna 6^o. MARTIO. *Plena Luna* 21^o.

Præalta fuit *Barometri* Statio toto Martio ;
ventus intereà perpetuus Orientem inter & Se-
ptentrionem ; Aer verò siccissimus ac frigidus
valdè, Gelu frequens admodum, imo ad Finem
* F usque

* Vide Vol. I. p. 181.

usque Mensis asperum: per totum ne vel Gut-
tula Pluviae.

Dig. Dec.

Nix 18. 19. Grando 28. = 0.072.

Maris Æstus suppressit maximè Boreas longe
frequens, paululum etiam magna *Barometri* Al-
titudo *. Hoc sanè perpetuum est, quòd ad-
ventante procellosa, pluviaque Tempestate &
Sonitus Maris permagni, & Æstus enormes
præcedunt, quinimò portendunt, his in Oris sal-
tem; contrà durante Apricitate, Ventoque bo-
reali, minimi sunt semper & Fluctus & Æstus
Maris.

AB. 5. H. 9. N N E 1. — levis 9. H. 8. E 1
— 21. Vesperi E N E 2.

Altitud. maxim. 7. 30. 9. N E 1. } media 30. 0 $\frac{2}{31}$
minim. 31. 29. 6. N 1. }
Dies frigid. 30. 68. E N E 2. } media 56 $\frac{12}{31}$
— tepid. 9. 50. E b S 1x. }

Variolæ ubique *Epidemicæ*, plerumque tamen
paulò mitiores, nisi inter Nautas, quorum plu-
res equidem pereunt, una forsan conspirante Fe-
bre maligna, quæ permanet adhuc: Credo et-
iam quòd *Scorbutica* Lues, qua hoc Genus Ho-
minum jam maximè afficitur, *Variolas* magis
exitiales reddit: haud rarò Mictus adest cruen-
tus, interdum Sputa sanguinolenta.

Plurimæ Pleuritides & *Peripneumoniæ*, æque
vehementès admodum † — sævit abundè *Rheu-
matismus* & *Arthritis*, nec infrequens est gravis
Angina † — sævissimum *Asthma* quosdam diu ac-
cru-

* Vide Vol. I. p. 17. † "Όταν χειμέριον γένται Ηρκα
όπισθόχειμών, χειμερινά ή αι νόσοι, και βηχώδες, ή πε-
ριπνευμονικά, και κυναγχικά. Hippocr. de Humorib. Sect. 7.

1741) & Morbis Epidemicis: 67
 crudeliter premit — Tussis importuna valdè &
 laboriosa plurimos — Horum omnium ferè San-
 guis extractus est perquàm tenax. Phthifici haud
 pauci subitò abripiuntur.

Nova Luna 4°. APRILI. Plena Luna 19°.

Manet usque *Atmosphæra* Constitutio sicca
 valdè & frigida; Initio Mensis Gelu & maximæ
 ruinæ; Ventus Aquilonius sæpiùs hoc Mense,
 sub Finem verò ab Oriente spirabat, Aer interim
 tenuis & maximè siccus, medio autem largissi-
 mæ Rorationes — Sub Finem multa Pluvia apud
Wotness, Dartmouth, Kingsbridge, &c. hic ne vel
 Guttula.

Pluvia 1. 5. 8. 9. 10. 20. 21. = 0.452. Dig. Dec.

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Altitud. maxim. 3. 30. 4. N 1. | } media 29. $9\frac{24}{25}$ |
| minim. 1. 29. 5. N 18. | |
| es frigid. 2. 64. N 1. | } media 47 $\frac{14}{29}$ |
| tepid. 14. 41. Malacia. | |

Variolæ quaquaversum *Epidemicæ*; *Pleurope-*
pneumoniæ frequentes valdè: *Asthma*, Tussis
 hemens, Verbo & acuti & *chronici* Pulmo-
 rum Morbi invalescunt maximè: haud pauci
 sanguinis Sputo corripuntur; permulti *Phthifici*
 plures abeunt.

Plurimæ Febres putridæ, sæpe cum Eruptio-
 miliari, sæpe cum *Petechiis* in australi *Da-*
monia — Sedulò inquirens has plerumque esse Pro-
 gines Febris nauticæ contagiosæ invenio, ea-
 mpe Loca adeuntè uno, alterove Nauta con-
 lescente: parùm adeò tutum est recipere ex

Febre contagiosa recuperatos: diu sanè Vestibus adhæret Morbi Seminium.

Nova Luna 4^o. MAIO. Plena Luna 19^o.

Ineunte & exeunte Mense Aer erat maximè ficcus, medio autem densus & paulò humidior; quippe frequens decedit Imber Diem quartum inter & undecimum, postea vix Guttula Pluviae; afflavit sæpe Vulturnus, Aquilo tamen Initio, sub Finem Caurus. Ros erat subinde uberissimus, à vicesimo præcipuè.

Erucae innumeræ Hortis sunt insensissimæ.

Pluvia 5. $\frac{4}{6}$. 7. $\frac{1}{8}$. 10. 13. 15. 17. $\frac{11}{18}$. 19.
Dig. Dec.

= 0. 928.

Procella levis 19. Mane SSE 4^r. Imbres gravissimi 30. ad Septentrionem hinc nulli.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 21. | 30. | 1. | E b S 1. | } media 29. $6\frac{2}{3}$ |
| | minim. | 18. | 29. | 1. | S VV b VV 2x. | |
| | Dies frigid. | 14. | 52. | N b E 1x. | } media 37 $\frac{22}{30}$ | |
| | — calid. | 27. | 24. | NN VV 1. | | |

Vix unquam meminì *Variolas* magis ubique grassantes; *Rubeoli* passim, seu *Rossalia Frid. Hoffmanni*. — Angina, Tussis, *Asthma* frequens. Febres quædam tertianæ*, lentæ quædam ac nervosæ, plures petechiales; jam autem multò magis floridæ sunt Maculæ.

Nova

* Consule quæ dixi, *Essay on Fevers*, p. 20. 21.

Nova Luna 2°. JUNIO. Plena Luna 17°.

Ventus hoc Mense varius, Zephirus autem prævaluit: Aer plerumque crassus; fervida admodum sub Finem Tempestas. — Vis immensa Erucarum omnium Generum omnia ferè Olera devorant: Cicadæ innumeræ, Muscæ infinitæ ac Afili Pecora maximè infestant.

Pluvia $\frac{1}{2}$ 2. 3. 6. 7. $\frac{1}{2}$ 8. 9. 16. — 18. $\frac{1}{2}$ 19. 20. $\frac{1}{2}$ 21.
Dig. Dec.

24. 26. 27. = 1. 250.

Lumen insolitum 29. H. 11. p. m. Arcus nempe igneus lucidus valdè ab Horizonte prope S E ad Gradus saltem nonaginta projectus.

Altitud. maxim. 13. 30. N VV 13 } media 29. $6\frac{15}{28}$
— minim. 8. 29. 3. VV S VV 2. }
Dies frigid. 10. 34. VV b N ix. } media 27 $\frac{22}{28}$
— fervid. 29. 18. S E 1. }

*Variolæ maxime epidemicæ longè latèque, per multos occidunt: hinc tamen non sunt adeò lethales, nisi accedunt Petechiæ. Aura * subfrigida & Potio subacida liberalis est variolosis nunc maximè necessaria, brevi aliter suffocantur; terribus enim jam est Odor confluentium Variolarum: neque hoc inter mala Signa numerandum est, modò cætera favent. Levis Febris rubeculosa, seu pustulata passim. Anginæ, & Faucium Tumores crebri. Febres nauticæ sparsæ.*

* F 3

Nova

* Consule quæ dixi, *Essay on Fevers*, Cap. de Variolis, p. 162.

Nova Luna 1^o. JUNIO. Plena Luna 17^o.
Nova 31^o.

Torrida valdè & aridissima Tempestas omnia ferè adussit, vix viridem vides. Herbam nisi in Pratis humidissimis, matura tamen hinc Messis & opima, Frumentum optimum. — Mensis Initio venit ab Oriente Ventus, pòst septimum ab Aquilone ad vicefimum utque, inde ad Finem parum erat constans. Ros plurimus omni ferè Nocte. Innumerabiles garrulæ Cicadæ: Muscæ & Afili Armenta vexant admodum.

Quamvis *Atmosphæra* est siccissima, ut *Hygrosopia* monstrant, levi tamen Fumo offuscata videtur, quod quidem haud rarò per siccas valdè & apricas Tempestates accedit*.

Dig. Dec.

Pluvia 5. 6. 16. 18. 20. 25. 28. 29. = 0.764.

Fulgura 3. Nocte E S E 3. Tonitru quoque è longinquo. Permagnum Lumen boreale & lucidum valdè, effulgente licet Luna, 12. per totam fere Noctem, N. 1.

| | |
|--|---|
| $\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 9. 29. 9. N N E 1x.} \\ \text{minim. 5. 29. 3. E S E 2x.} \end{array}$ | $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media 29. } 5\frac{8}{27}$ |
| $\begin{array}{l} \text{Dies frigid. 20. 30. 0. N 1.} \\ \text{fervid. 14. 14. N 1x.} \end{array}$ | |
| $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media 22. } 4\frac{4}{27}$ | |

Dies valdè fervidæ 1. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 24. 28.

Variolæ undique. Febres multæ putridæ magna cum Oppressione Præcordiorum, arida Lingua, ac

* Vide Observat. Mensè Junii 1740.

ac Urina valdè biliosa. Cholera & *Diarrhœa* valdè frequens; porracea, nigra, sæpe rejiciuntur; Tormina plerumque sæviunt multùm, Bilis subatræ plurimum deicitur. Ob Æstum enormem omnes maximè debilitantur Sudore profuso penè digesti.

Non solùm humidissima Sanguinis dissipat fervida Tempestas, sed & ejus Partem maximè actuosam, Vim porrò Fibrarum vehementer enervat: Quid inde? restat crassior atque segnior Moles Humorum, unde in Vasis *meseraicis*, Hepate, Splene, & ubicunque tardior est, ex ipsa Lege Naturæ, Sanguinis Motus, Obstructio facilis oritur & prompta nimis. Atqui, cum & ipse Calor immodicus Sales Oleaque Corporis torreat quotidie & exacuat, fit major in Dies majorque Humorum Acrimonia, inde Bilis acerri-ma: hinc Cholera, hinc Tormina sævissima, hinc putridæ Febres—Quid igitur? diluendus est affatim Sanguis, demulcenda quoquè perpetim hujus Acrimonia. “Faciam utique, ast quò
“bibitur plus, eò sudatur amplius.” En & hujus Mali Remedium sine vel Medicinæ Tædio; admisce modo Vini rubri generosi aliquid Potioni dilutæ, mirabere sanè expertus tantilli tantos esse Effectus; constringit nempe Vascula; Cutis coarctat Meatus, & confirmat Humores: Epoto tantum uno, alterove Vini rubri Gallici, aut Portugallici Cyatho, vidi multoties profusos, ex-templo sedatos Sudores, etiam in ipsis Febribus collquantibus. —Cave tamen, Cane pejus & Angue, Infusum *Theæ*, calidosque Liquores: nèc verùm intereà, dum Corpus æstuat, perfrigidi Poculi Pœnas lue.

Plena Luna 15°. AUGUSTO. Nova Luna 29°.

Sicca fuit satis & calida, imò nonnumquam fervida, Tempestas hoc Mense, unde Messis lætissima ac fœcunda valdè, nec tamen defuit tempestiva Pluvia, quæ Solum, exustum prorsus, recreavit maximè, ita ut sub Finem *Augusti* renovata quasi viridisquè videretur Facies Agrorum.

Ventus fuit varius, sæpiùs è Septentrione, quì Cœlum semper sudum & plerumque calidum fecit.

Pluvia 2. 5. 6. 7. 13. ^{II} 19. ^{II} 20. ^{III} 21. 22. 25.
^{II} Dig. Dec.
 26. = 2. 140.

Immensæ interdum Rorationes. Erucae & Cicadae innumeræ.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 0. N E 1. } media 29. $6\frac{26}{28}$
 ——— minim. 21. 29. 2. SS VV 1. }
 Dies frigid. 25. 36. E S E 2. } media 27 $\frac{26}{28}$
 — fervid. 10. 20. N 1. }

Variolæ adhuc maximè *epidemicæ*, jamque multò peiores, Maculis lividis scilicet haud rarò stipatæ. Febres putridæ, perlongæ (*Mesentericæ* forsan) plurimæ inter Popellum atque Nautas præcipuæ; quædam vero valdè *phreneticæ*, hæ autem multò citiùs jugulant. His tumidus est plerumque Venter & astrictus; retenta ideò in Visceribus biliosa Colluvie, lenibus Purgantibus commodissimè fugantur; parùm certè profunt Sudores, minimè verò præmaturæ, & ipso Morbi Initio erumpentes, qui certissimè ferè supprimunt Urinam & Alvum, obrepente mox Phrenitide. Mirum est utiquè quàm multum atræ Bilis

Bilis * ἀνω καὶ κάτω ejicitur sæpe. Sub Finem Mensis Angina (plerumque mucosa) frequens admodum, Dentium quoque Dolor Fauciumque Tumores multis infesti sunt. Cholera & *Dysenteria* grassatur plurimum; idque semper ferè accidit post Æstates præcalidas, non solum ob Bilem adustam acresque factos Corporis Succos, sed adventante subito autumnali Frigore patula Cutis nimium citò occluditur, unde quod perspirandum erat ad interiora ruit.

Plena Luna 14^o. SEPTEMBRI. Nova Luna 28^o.

Quanquam & calida fuit *Atmosfera* & sicca Mensis Initio, pluvius tamen & procellosus Auster, septimo adveniens Die, mutavit prorsus Aeris Temperiem; vicesimo tepida valdè & pulchra Tempestas recurrit, flante plerumque ab Oriente Vento, Ros interim perplurimus; ad Finem Auster iterum Pluviaque.

Cicadæ adhuc infinitæ inter Herbas, jam virides; lætissimè garriunt.

Pluvia 4. ^{III} 7. ^{II} 8. 9. 10. ^I 14. 15. — 18. 28. ^{II} 27.
Dig. Dec.
^I 28. 30. = 2. 756.

Procella 7. prima Luce SSE 4. — 13. E 4. : maxima Procella apud *Londinum* & Oras *Angliæ* boreales * 8. Die.

Fulgura 24. Vesperi. AB. magna ad multam Noctem durans 21. N E 1. — 27. H. 9. p. m.
8 Aki-

* Η μέλαινα χολή τῆ φθινοπάρου πλείη τε καὶ ισχυροτάτη ἐστίν. *Hippocrat. de Natur. Hominis, Sect. 25.*

8 Altitud. maxim. 21. 30. 1. N E 1. } media 29. $5\frac{14}{26}$
 ——— minim. 28. 28. 5. S b E 3x. }
 Dies frigid. 30. 41. N V 1. }
 — calid. 23. 26. E S E 1. } media 32. $\frac{2}{26}$

Variolæ usque grassantur. Febres *Synochæ*; necnon intermittentes quædam *anomalæ*, quæ verò Typum multò magis regularem servant post lentorem Alvi Fluxum, sive Arte, sive Sponte productum: Vomitu repetito sæpe eliduntur penitus.

Perplurimi Tumore Faucium Dentiumque Dolore & Aurium vexantur; crebrò inde in Meatu Auriculari Abscessus: Aliqui Angina gravi corripuntur.

Diarrhœa & *Colica* frequens, quibus Medela facilis ex *Rhabarbaro Catharsis* & repetita, fortior utiquè dira Tormina plerumque movebat.

Plena Luna 13°. OCTOBRI. *Nova Luna* 28°.

Haud parca cadente Pluvia per *Octobris Initia* Atmosphæra facta est longè humidior, atqui nono ortus ab Oriente Ventus ad decimum octavum duravit, Cœlumque fecit apricum plerumque ac siccum; inde Libs, mox Vulturnus, multam demisit Pluviam.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{11}{5}$ 6. 7. 9. 13. 15. 19. 20.
 Dig. Dec. $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1111}{24}$ $\frac{1111}{25}$ $\frac{1111}{26}$ $\frac{1111}{28}$ 30. = 3. 498.
 21. 22. 24. 25. 26. 28. 30. = 3. 498.

Procella 21. Nocte S w 4x. — 25. Noctu S E b S 4x.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 2. E N E 1. } media 29. $5\frac{3}{31}$
 ——— minim. 21. 29. 0. S V V 4x. }

Dies

1741.)

Morbis Epidemicis.

75

Dies frigid. 18. 50. E b N 1.

= tepid. 7. 36. S VV 2. } media $43\frac{16}{31}$

Variolæ passim: multæ Febres putridæ, ac *Catarrhales*; Fluxiones porro, & Tumores Fau-
cium levi quasi cum Angina frequentes, sæpiùs
omninò sine Febre. Multi *Asthmate* premuntur.
Pustulata Febricula (*the Chicken and Pigs or Swine's
Pox*) plures Infantes ac Puerulos corripit; sæpe
abeuntibus Vesiculis Stigmata relinquuntur quasi à
Variolis; quod quidem haud parvam denotat
Humoris Acrimoniam, adcoque postulat pur-
gantia idonea atque demulcentia. — Turpiter per-
sæpe falluntur Anniculæ dum hujusmodi Stigmata
pro veris *Variolarum* Vestigiis jactitant. — *Vario-
læ* quippe & Mora, & Maturationis Modo, ab
his longè diversæ sunt — abeunt nempe *Rubeoli*
tertio, vel quarto, *Variolæ* autem non nisi, licet
quam citissimè, post Diem octavum.

Plena Luna 11°. NOVEMBRI. *Nova Luna* 27°.

Eurus Initio, Aquilo sub Finem prævaluit,
Boreas interdum, sæpiùs tamen Libs & Auster
pluviosus; Aer fuit plerumque crassus valdè ac
tepidus, ad Finem autem rigidum Gelu invasit.

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|-----|-----------|------------|-----------|---------|
| | <u>1</u> | <u>III</u> | <u>III</u> | <u>1</u> | | <u>1</u> | <u>III</u> | <u>II</u> | |
| Pluvia | 1. | 6. | 7. | 8. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. 21. |
| | <u>III</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>II</u> | | | | | |
| | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | = 4. 024. | | | |

Grando 23. Procella 19. p. m. S w 4°. —
gravis 25. Nocte S w 4°.

Pulgur & Tonitru ad mediam Noctem ab H.
8. p. m. 6°. S w 2.

8 Alti.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 4. E N E 1. } media 29. $8\frac{16}{32}$
 ———— minim. 23. 29. 2. S VV b VV 3. }
 Dies frigid. 30. 66. N E 1. }
 — tepid. 6. 41. VV S VV 2. } media $52\frac{4}{30}$

Variolæ sparsim—Jam ingruunt *Morbilli*, ut plurimum quidem benigni: Febre pustulosa, & *Rubeolis* Pueri perplurimi corripuntur—Videtur adeò jam inesse Sanguini *Diatheſis* quædam peculiaris ad Exanthemata gignenda, quod sæpe sanè notatur; *Variolis* nempe, *Morbillis*, *Papulis*, & omnium Generum Pustulis, unà grassantibus—Fortè acris & biliosa Colluvies, quæ Mens se *Julio*, *Augusto*, & *Septembri* Intestina torquebat, nunc tendit ad Cutim—Anne deducenda hinc est Indicatio curandi per Sudores, Vesiccantia, &c. in Febribus per talem Constitutionem sævientibus?

Febres lentæ nervosæ sparguntur, item *Peri-pneumonia* nothæ. *Asthma*, Angina, *Rheumatismus* frequens.

Tusses & Destillationes permultos laceſſunt cum Tumoribus Faucium, Dentiumque Doloribus, sæpe admodum acerbis.

Plena Luna 11°. *DECEMBERI*. *Nova Luna* 26°.

Incunte Mense Aer erat crassus valdè, humidus ac subtepidus, post octavum verò multò frigidior, ad Finem frigidissimus: Boreas perflavit sæpiſſimè, Vulturnus frequenter, præsertim Mensis Initio, Auster interdum. Maxima fuit *Atmosphæræ* Mutatio Die ultimo, Mane nimirum omnia rigidissimo constricta Gelu, Vesperis Pluvia

1742) & Morbis Epidemicis. 77
 via perpetua Thermometro à Gr. 80. ad 65. ascen-
 dente, irruente Vulturno.

Pluvia 1. 5. 6. $\frac{1}{8}$. 9. 10. 15. 17. — 19. $\frac{1}{20}$.
 Dig. Dec.
 21. $\frac{1}{31}$. Nix 25. 29. Grando 9. = 1.070.
 Nivis plurimum erat difflatum.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. E b S 1. } media 29. $7\frac{16}{30}$
 ——— minim. 9. 29. 4. VV N VV $\frac{1}{2}$. }
 Dies frigidissim. 31. 80. Mane E N E 1x. } media 63
 — tepid. 7. 50. S S E 2x. }

Etiamnum Variolæ ; Morbilli frequentes ; An-
 ginæ , Pleuritides , Peripneumoniæ , & veræ & spu-
 riæ , plurimæ : Rheumatismi atque Asthmatis Pa-
 roxysmi vehementes multos corripunt . Coryzæ ,
 Destillationes , Tusses , Dentium Dolores Fau-
 ciumque , Colli , ac Capitis Tumores permul-
 tos affligunt undique .

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLI. fuit
 Dig. Dec.
 = 20. 354.

Plena Luna 9°. JANUARIO. Nova Luna 25°.

Ipso Anni Principio horrida Tempestas , Pro-
 cella , Pluvia , Grando , Fulgura , Tonitru ; nec
 multò lætior fuit totus hic Mensis , quippe nim-
 bosus admodum & squalidus : à xiii. ad xx. per-
 petua ferè Procella , Aer interim humidissimus
 ac valdè nebulosus ; tunc Eurus paululum dis-
 pulit Nubes ; mox autem Libs turbidus recur-
 rit ; ipso Januarii Exitu Corus : à septimo ad
 decimum aere Gelu.

Plu;

Pluvia ¹¹ 1. ¹¹ 2. 3. 4. 6. ¹¹ 11. 12. ¹¹ 13. ¹¹ 14. 15.
¹¹ 16. 18. — 20. 24. — 27. ¹¹ 28. 29. 30. Grando 1.
 Dig. Dec.

2. 17. Nix 7. p. m. E N E 2^x. = 3. 520.

Procella 1. S w 4. — 2. primo Mane w S w
 4^x. — gravis tota Nocte 13. S w 4^x. — 14. a. m.
 S w 4. — 15. w b S 4^x. — 16. S w 4. — 19. S
 w 4. — 28. S w 4.

Miror *Barometri* Altitudinem tantis furentibus
 Procellis.

Altitud. maxim. 22. 30. 2. E r. } media 29. 6²/₃
 ——— minim. 14. 28. 8. S VV 4. }
 Dies frigid. 10. 74. N N E 1^x. } media 57²/₃
 — tepid. 19. 50. S VV 4. }

Variolæ frequentes, *Morbilli epidemici*: Pleuri-
 tides, *Peripneumonix*, *Anginæ*, permultæ; *Ar-*
thritide & *Rheumatismo* plurimi plectuntur.

Sub Finem *Morbillorum* sæpius accedit sævis-
 sima Tussis atque *Peripneumonia*, quæ Morbum
 haud parùm fatalem reddit: quamprimùm hæc
 invadit Sanguis est protinùs mittendus, qui ple-
 rumque est viscidus admodùm & tenax: idque
 ferè notatur in omnibus Febre acuta, hac Tem-
 pestate, laborantibus; utiquè haud boni est O-
 minis, si fluidus sit & floridus nimium, quod
 anginosus accidit interdum & peripneumonicis,
 atque utplurimùm pessimè significat.

Plena Luna 8^o. FEBRUARIO. Nova Luna 23^o.

Quamquam per Initia Mensis blanda fuit satis Tempestas, advolans tamen octavo Boreas, Aerem fecit multò frigidiorē; post xiii. Ventus varius, xx^o autem Boreas recurrit cum aspero Gelu ad Finem ferè perdurans. Aer fuit persicus & valdè frigidus; Barometri Statio præalta.

Pluvia 3. 4. 6. 12. 13. 15. 17. 18. 19. Nix
Dig. Dec.

11. 18. 22. 23. 24. Grando 21. 22. = 1. 200.

AB. 20. N. 1. Procella 6. Nocte w S w 4^r.

8 Altitud. maxim. 27. 30. 4. E N E 2. } media 29. 9¹²/₂₆
minim. 19. 29. 4. S V V 2. }

Dies frigid. 28. 68. E N E 2. } media 61¹⁴/₂₆
tepid. 1. 54. V V 1. }

Morbilli epidemici, Variolæ passim. Rheumatismus, & Pleuropneumoniæ multos corripunt, Tussis ac Tonsillarum Tumores plurimos: Sæva Arthritis, & Asthma grave frequens admodum. Diu spirante Vento à Plagis orientalibus* Asthmatici semper pessimè se habent; imò novi plures, qui, etsi Lectulo inclusi, talem Ventum mox adventantem præsentunt, atque prædicunt.

Tabifica Tussis, & fœda Scabies plurimos Equos consumit, ac jugulat.

Ple-

* Vid. Not. F. 1728. Vol. I. de Aere & Morbis Epidem.

Plena Luna 10°. *MARTIO*. *Nova Luna* 25°.

Siccus maximè & frigidus fuit totus hic Mensis: Aer tenuissimus, vix Imberculus aliquis, Nix nulla, perpetuus spiravit ab Oriente Ventus ad Septentrionem plerumque vergens, hinc accepsæpe Gelu maximæque Pruinæ; minimi verò Maris Æstus, at alta semper *Mercurii* Statio—Sub Finem Martii graves ruebant Imbres ad Orientem, hic nulli.

Dig. Dec.

Pluviola 26. 27. = 0. 016.

Levis *AB*. 5. Vesperis N N w 1. — maxima 15. H. 9. N b E 1. — 16. H. 10. N b E 1. — 24. H. 8. p. m. E N E 1.

Zona Lucida subflava, ad Modum Iridis quasi, à N E ad S w. extensa, transiens porrò per ipsum *Lunæ* Corpus Die 6. H. 9. p. m. N b E 1.

| | |
|--|---|
| γ Altitud. maxim 4. 30. 5. N E 1. | $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$ media 30. 0 ¹⁸ ₂₉ |
| — minim. 21. 29. 8. E S E 1. | |
| Dies frigid. 1. 68. N E 2. | $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$ media 57 ²⁷ ₂₉ |
| — tepid. 31. 51. N b VV 1. | |

Sparsæ *Variolæ*, *Morbilli* *Epidemici*, haud raro lethales: jam & Pectoris & Pulmonum Morbi sæviunt admodum; Pulsus est multum incitatus & valdè durus, Spiritus difficilis, & inter tussendum acutissimus Dolor, Sputa densa, tenacia, rarò Sanguine tincta—Sanguinis Missio, & Potio diluta, subtepidà, liberalis, sola ferè fuisse Remedia, Nitro plurimo adjecto.

Tusses, *Catarrhi*, Dentium Dolores ac Faucium, omnes ferè infestant: Angina verò & *Rheumatismi* plures: *Asthma* pertinax & grave haud pau-

(742) & Morbis Epidemicis. 81
 paucos premit; Longi & sævi Arthritidis Pa-
 roxysmi.

Omnis penè Equi, nisi Stabulis bene curan-
 tur, Scabie ac purulenta Tussi vexati tabescunt;
 plurimi pereunt.

Plena Luna 8°. APRILI. Nova Luna 23°.

Ineunte Aprili tempestiva Pluvia sitientes A-
 gros rigavit, paulòque pòst grata Tellus lætam
 Herbam & Flores innumeros protulit, quos fo-
 vebat in Dies Ros uberrimus; his tamen infensa
 est maximè infinita Quantitas Erucarum omni-
 genarum. Post undecimum Ventus, inter Orien-
 tem & Septentrionem ferè perpetuus, siccissimam
 & tenuissimam reddidit Atmosphæram.

Pluvia $\frac{1}{5}$. $\frac{11}{6}$. 7. 8. $\frac{1}{11}$. 12. $\frac{11}{22}$. Grando 6.
 Dig. Dec.

XI. = I. 152.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 4. N b VV 1. }
 ——— minim. 7. 29. 0. N VV 2. } media 29. $8\frac{11}{26}$
 Dies frigid. 7. 57.
 — tepid. 23. 38. E 1. } media $46\frac{23}{26}$

Variolæ plures usque, Morbilli epidemici, &
 sæpe funesti. Rheumatismus, Angina, Pleuri-
 tides * Peripneumonix frequentes; Ophthalmix
 crebræ — Sanguis Febricitantium emissus jam
 ferè semper est viscidus admodum. Tusses
 graves, Raucedines, Tonsillarum ac Maxillarum
 Tumores perplures afficiant. Tempestas est ta-
 bidis.

* G

* Vid. Essay on Fevers. P. 21.

bidis prorsus infensissima: Febres tertianæ aliquæ * & Hemitritæ.

Febris putrida contagiosa, ac pestifera valdè, cum ingente Virium Damno, maxima Præcordiorum Oppressione, Tremore Tendinumque Subultu, Vigiliis, Delirio, Lingua nigra & sæpe arida valdè, Faucibus squallidis, & Halitu foetidissimo, jam apud *Launceston* ejusque Viciniam favit admodum, estque profectò funesta maximè — Pulsus vacillat plurimum mox ab Initio Morbi, idque vel in Robustis: Urina est plerumque lurida, & vapida quasi, sæpe subnigra & olida, rarissimè aliquid inest Sedimenti, interdum verò continet furfurosa quædam inæqualiter sparsa: haud rarò Statu Febris erumpunt atræ *Petechiæ*, sæpe Papulæ, aut Pustulæ livescentes cum oleoso Sudore ac valdè graveolente: Nihil fuit lætiùs quàm floridæ Pustulæ in ipsa Morbi *Ἀκμῇ*, Nihil funestum magis lividis & subnigris; meræ Maculæ nunquam non aliquid Mali denotabant. Alvus nigra, foetida maximè, & citissima, plures sub Finem abripuit: Aliqui Phrenitide post Per-vigiliū correpti sunt, plures quasi Vaterno, idque sæpe vel ipso Morbi Initio; si insciis his oborta est Alvi Dejectio certissima sequuta Mors est, Biduo vix exacto.

Genita hæc in Carceribus Febris, & per Comitia provincialia disseminata longè latèque, Plurimos Letho dedit, optimaque sæpe elusit Consilia — Certè qui fuere Sanguinis prodigi nimis Ægrum utique, non Morbum, jugulabant; per rarò enim secundam Sanguinis Missionem toleravit, si modò ullam.

Tres

* Vip. *Essay on Fevers*, p. 21.

Tres tantum hac Febre laborantes vidi, utpotè tunc haud prospera Valetudine gaudens, brevi Domum petere cogebar: Sedulo autem Pharmacopolas atque Chirurgos de Morbo percontans didici Sanguinem ab Ægrotantibus detractum primò fuisse rutilum satis & valdè fluidum, altera tamen Vice missum lividum semper aut nigrum—Hoc ego ipse profectò notavi, imò vix concretum aliquid in Sanguine cujusdam Generosi, etsi diù antè extracto: desideratus hic & à suis, & ab omnibus, Die decimo tertio interiit stupidus, delirus, purpureis Maculis & lividis Pustulis aspersus.

Cui ignota sunt Comitia Oxoniensia 1577. atque nupera apud Taunton Anno 1730, ubi pestifera Mephitis tot tantisque Viris mox fuit Exitio?—Perfrequens est utiquè Generatio Febris pestilentis in angustis immundisque Carceribus; etiam ipse Aer conclusus in Fodinis, Speluncis, Puteis, tandem evadit exitialis admodum; idque longè citiùs si accedunt quoquè plurimà Animalium *Effluvia*, quæ & ipsa porrò magis magisque in Horas virulenta fiunt, brevique pestifera maximè*.—*Atmosphæra* stagnans, Frequentia Hominum polluta, mox valdè rancet & ad Respirationem inepta est prorsus: imò Aquæ dulcis Balneum Sorde cutanea scædatum putrescit atque putet brevissimè.—Nec mirum est hoc utiquè, quandoquidem à quolibet adulto Homine Unciæ quadraginta ferè rancidi Vaporis quotidie exhalant.

* Mirabilis sanè est Historia apud *Lancisium* (Lib. 1. Cap. 6. de repentinis Mortibus) cujusdam Juvenis, protinus extincti, dum effoderet Quercum antiquam, cujus in Cavetna magna prægtandis Serpens latitabat.

Ociùs hæc eveniunt omnia accedente Calore, quò magis enim Sales Oleaque Animalia attenuantur, & exagitantur Tepore, eò magis ad Putredinem vergunt—Putrescentium autem Animalium Corpora, maximè Hominum, plùs semper minùsve noxium Contagium dispergunt; magnas ideò post Strages, putrescentibus nempe Cadaveribus, Febres pestilentes sæpiùs grassantur.—Carnis putrefactæ Fœtor nobis est planè intollerabilis, monente scilicet Natura, ut hunc quàm maximè vitemus—Profectò cum valdè putridum expurgant Odorem Ægrotantium Corpora à Contagione summoperè cavendum est, nam noxia admodùm spargunt *Miasmata*: id in *Variolarum* Maturatione præcipuè notatur, tunc enim maximè fœtent, & longè longèque magis sunt contagiosæ quàm per Initia Morbi, ut omnibus notum est.

Purgandus est ergo frequenter, atque ventilandus, corruptus Carcerum, Navigiorum, ac *Nosocomiorum* Aer, ubi plurimi congesti sunt Homines, ne longiore Mora fiat pestiferus—imò, & si sit aliquatenùs pollutus Fumis idoneis corrigendus est, quos inter utilissimus est Aceti & Camphoræ Vapor.

Commodissîma porrò erit hæc Aeris Purgatio in Ædibus privatis, ubi ægroti decumbunt, * apertis scilicet subinde Fenestris, accensis Focis, &c. indè namque non tantùm illi, sed & ministrantes, puriorem respirabunt Auram.—Memini equidem haud rarò me fuisse Gravitate Capitis, Nausca, Languore valdè affectum, dum per duas, tresve Horas Febre maligna laborantes

vissi-

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 162.

1742) & Morbis Epidemicis: 85

visitasset; mox verò resectum prorsus obambulando in Aere aprico, aut equitando. Si hoc non datur acre Acetum; Camphora imbutum, olfacto subinde, atque expue sæpissimè Salivam.

Plena Luna 8°. MAIO. Nova Luna 23°.

Per Maii Initia Eurus perflavit; isque fortis admodum, à xvi. autem ad xxiv. Libs pluviosus *Atmosphæram* humectabat plurimum, quæ fuerat antè siccissima. Non tantum Agros irrigando gratissimæ fuerunt hæ Pluviæ, sed & insuper Erucas perimendo; grassabatur enim plurimum tunc Temporis ista Pests Herbarum. Porro maximum impendebat Segeti Nocumentum à novo quodum Genere Erucarum nigrarum (erant autem robustæ & prælargæ) hæ Agmine vasto à Montibus, Torrentis ad Instar, ruente totos devastabant Agros. Amœnissimus planè ac insolitus est Telluris Ornatus, Flores infiniti!

Pluvia $\frac{11}{6}$. $\frac{111}{7}$. 15. 16. $\frac{1}{17}$. 18. $\frac{1}{19}$. $\frac{111}{20}$. 21. —
Dig. Dec.

24. 30. = 2. 364.

Procella 4. E b S 4. — 5. E S E 4. — 6. Mane E S E 4^r. Halo quam maximus circa Lunam 5. H. 9. p. m. E S E 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. E b S 2. } media 29. $6\frac{26}{30}$
minim. 21. 29. 4. S VV 3. }
Dies frigid. 5. 48.
— tepid. 24. 32. S S VV. 28. } media $38\frac{12}{30}$

Morbilli valdè epidemici; Variolæ, & Peripneumonix frequentes: Tussis & Asthma per plurimos infestant, multi tabidi moriuntur; multi

Hydrope laborant. Febris quædam *Catarrhalis* & *Rheumatica* passim proserpit, in qua Lingua subatra est aut fusca & valdè squalida, Ora *apthusa*, Halitus teter, Urina lurida, Pulsus celer, mollis, submissus, crebrò etiam *Petechiæ* lividæ, Tussis parva est, at magna Præcordiorum Oppressio — Mihi quidem videtur Species quædam Peripneumonix nuper malignè grassantis.

Plena Luna 7^o. JUNIO. *Nova Luna* 21^o.

Ne vel Guttula Pluvix decidit Diem ad usque viceesimum Junii, Aer interim fuit maximè siccus & calidus, Ventus Orientem inter & Arctum; pòst autem Auster haud parùm Pluvix demittebat.

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----|--------------|----------------|---------------|-----|---------------|---------------|
| | ^{II} | | ^I | ^{III} | ^{II} | | ^{II} | ^{II} |
| Pluvia | 20. | 21. | 22. | 23. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| Dig. Dec. | | | | | | | | 29. |

30. = 2.020.

Permagnus Halo circa Lunam 3. H. 10. p. m. N N E 2. Fulgur & Tonitru 25. Vesperis.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|----------|-------------|--|
| 8 | Altitud. maxim. | 4. | 30. | 1. | N E 2x. | } media 29. 6 ¹⁶ / ₃ |
| | minim. | 26. | 29. | 3. | S VV b S 1. | |
| | Dies frigid. | 3. | 32. | N N E 2. | } media 25. | |
| | fervid. | 13. | 17. | N 1x. | | |

Morbilli sunt valdè *epidemic*i, & sæpe funesti, Tussi admodùm violenta consequente, ac Febre quasi peripneumonica, quæ plurimos jugulat Infantes. Ubi Cuticula aspera fit valdè & Furfure velut aspersa quarto, vel quinto ab Eruptione Die, fausti est Ominis; è contrà ubi Maculæ & Papulæ lividæ sunt, aut lividæ, malum omnino. — Febris putrida passim sæpe cum Pustulis rubris ardentibus, sæpe cum permagnis *Petechiis*. Angi-

Anginæ, Pleuritides, Peripneumonix, magis jam quàm solent frequentes hoc Anni Tempore — Ophthalmix plures porrò, & Tumores Capitis erysipelatosi. — Tussis vehemens convulsiva, non solum Pueros sed & Adultos etiam sæpe invadit, præcipuè ad Mensis Finem — Multi Canes rabidi discurrent.

Plena Luna 6°. JULIO. Nova Luna 20°.

Ad Diem vicesimum quintum Julii Tempestas rigida, atque plerumque pluviosa, Vento ferè quotidie variante, Cauro nunc flante, nunc Africo; Aer fuit interim crassus ac multò humidior.

Pluvia ^{II} 1. 2. 3. 5. ^{II} 7. 9. 10. — 13. ^I 17. ^I 18. 19.
Dig. Dec.
— 21. ^{III} 23. 24. 25. = 2. 106.

Altitud. maxim. 27. 30. 1. E N E 1. } media 29. ¹⁷/₃₀
minim. 19. 29. 2. S V V b S 2. }
Dies frigid. 26. 38. N V V 2. }
calid. 31. 22. E 1x. } media 31 ¹⁶/₃₇

Iidem ferè grassantur Morbi, Tusses tamen sunt vehementiores, haud rarò Sanguinem exantlant. Haud pauci jam Ictero & Hydrope laborant: per siccas valdè & calidas Tempestates biliosum Sanguinis Principium augetur, mobilissima dissipantur, restant crassiora; hinc Obstructio & Icterus, hinc Hydrops, ruptis nimirum Vasis Lymphaticis; adeoque Ascites sæpe consequitur Morbos arquatos.

Sub Finem hujus Mensis Conjux mea dilectissima occidit hydropica, lugentibus Amicis

Vicinis, Bonis omnibus: Mulier sanè pia, prudens, venusta! — Erat illa quadragenaria, graci-
lis, agilis, temperans maximè; atqui paulò in-
firma, heu & hydropica Stirpe nata! nunquam
verò antehac vel levissima habuit Signa Hydro-
pis; nisi quòd, undecim circiter abhinc Menses,
dum Curru agitata velociùs per octo, decemve
Milliaria Domum peteret, intumescere Crura Pe-
desque plurimùm — Hujus autem brevissima
Mora, nam postridiè evanuit omninò Tumor —
Vere tamen elapso, post acerbum Colicum Do-
lorem, icterico Colore scedatà elanguit, emacuit,
perparcam reddidit Urinam, eamque crassam ac
fulviam maximè, imò vel subatram — Tandem
Tumor aquosus Pedes, Crura, etiamque Abdo-
men invasit. Mox Ruri se recipiebat, equitabat
quotidiè, *Emeticis*, *Catharticis*, *Diureticis*, *Sapo-
naceis*, *Deobstruentibus*, *Chalybeatis*, breviter op-
tima & idonea Medicina (quippe duos, tresve
Medicos perdoctos consultabam) utebatur dili-
gentissimè — Multò hinc melius quod ad omnia
ferè se habebat, ni quòd Urinam parcam valdè,
turbidam & subnigram redderet usque. At per
breves hæ Induciæ! paulò enim post recrudescen-
bant Mala, adeò ut sub Finem *Maii* redirent &
Icterus & Ventrìs Crurumque Tumor: augeba-
tur porrò *Ascites* indiès, in tantum utiquè ut
Medio *Junio* decumbentem penè suffocaret Mo-
les Aquarum, sursùm nempè compulso Septo
transverso — Protinùs ideò ad *Paracenthesim* con-
fugimus, quam firmo admodùm Animo perfert:
detractus est Seri subviridis, ad Ignem concre-
scentis Congius quasi cum Dimidio — Post duos,
tresve Dies se mirè resectam percipit, imò redit
brevi & Stomachi & Corporis Vigor. Rus pe-
tit

tit iterum, equitat alacriter, evanescit Cutis Flavedo, vividi sunt oculi, Spiritus facilis.—Lætissima jam mihi Spes Salutis effulsit; sed enim quam vana, nam vix tribus exactis Hebdomadis increvit rursus Abdominis Tumor ad Molem enormem: iterum ergo emissæ sunt Aquæ ad eandem ferè Quantitatem, sed ichorosæ, sed fœtidæ, sed sanguinolentæ minimèque ad Flammam coagulantes—Perstabat ex Foramine Trochære factò, Fluxus prælargus Humoris subalbidi, purulenti, olidi, quo consumpta peribat optima Matrona Die Julii 27º.—Sed quò me rapit dulcissimæ Uxoris Amor?—Ast! *Quis Desiderio sit Pudor aut Modus tam cari Capitis?*
Ὀλύμπια Δώματα ναίει—persequar ad Astra.

Nova Luna 5º. AUGUSTO. Plena Luna 19º.

Per totum hunc Mensem lætissima Tempestas, prospera Messis, optimum Frumentum; Aer fuit siccus admodum ac purissimus: Ventus plerumque ab Oriente venit, sæpe haud parum calidus: maxima subinde Roratio.
 Innumerabiles Vespæ, Cicadæ, Eruçæ: Multi Canes rabiosi.

Dig. Dec.

Pluvia 16. ¹³17. 26. 27. = 0. 434.

Altitud. maxim. 9. 30. 1. E b N 1. } media 29. ²⁵7 ₃₁
 ——— minim. 16. 29. 5. S 2x. }
 Dies frigid. 19. 34. E 2x. }
 ——— fervid. 3. 18. E 1. } media 26. ²²7 ₃₁

Morbilli adhuc Epidemici, Variolæ passim, Cholera frequens: Febres quædam intermittentes,

90 De Aere. (1742
 res, quotidianæ ut plurimum: perpauci aliter
 Morbi.

Plena Luna 30. SEPTEMBRI. Nova Luna 17.

Hic quoque Mensis fuit plerumque ficcus, sed
 pro Anni Tempore valdè frigidus, imò duode-
 cimo Mane Glacies super plurima Stagna, atque
 Pruina maxima per Agros, Ventus ab Occiden-
 te sæpe vergens ad Austrum, sæpius tamen ad
 Septentrionem; à xvi. ad Finem Orientem inter
 & Septentrionem perflavit. Ob magnam Siccita-
 tem omnes ferè Fontes arescunt: maximæ Rora-
 tiones sæpe ac Pruinæ.

Pluvia 2. $\frac{1}{4}$. 6. 7. $\frac{1}{8}$. 9. $\frac{11}{10}$. 11. 14. 27. $\frac{11}{28}$.
 Dig. Dec.
 29. = 1. 402.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 0. E N E 1. } media 29. $6\frac{24}{30}$
 ——— minim. 29. 29. 1. N 2x. }
 Dies frigid. 12. 55. N b E 1x. }
 — tepid. 1. 29. S VV 2. } media $41\frac{1}{3}$

Cholera, Ophthalmia, Variolæ, necnon Febres
 putridæ passim; Juniores Vermibus infestantur
 maximè.

Febriculæ quædam levi cum Angina quasi,
 Tussi, Dolore Dentium Fauciumque Tumore
 frequentes valdè; ex facili leni Sudore discutitur,
 aut breviter mitiore Cathartico fugatur. Haud Du-
 bio repentinum Autumni Frigus fuit in Causa
 hujus Febriculæ, imminuta scilicet plurimum
 Perspiratione Sanctoriana.

Morbilli epidemici, ac sæpe lethales, veh-
 mentissima Tussis ut plurimum comitatur, unde
 haud

haud rarò Peripneumonia suffocans sub Finem, interdum spumosum atque sincerum Sanguinem expuunt; hinc frequenter nimis cita Mors aut certa *Phthisis*.—*Diarrhœa* mucosa, perliquida, enormis *Morbillos* sæpe subsequitur; inde Abdomen durum & maximè tensum, at reliqui Corporis summa Macies, tandemque Tabes funesta; idque semper ferè si atra dejiciuntur & valdè foetida.

Optimum & Tussis & Peripneumoniæ Remedium est opportuna Sanguinis Missio, ducta mox leni Clystere Alvo, imò blandè purgata; *Diaconio* intereà licet compescere Tussis Sæviriā, acremque avertere Distillationem admoto inter Scapulas *Epispastico*; *Diatam* verò diluentem, mollem, omni Carne vacuam instituere oportet. Sive derepentè recedunt pustulosæ Maculæ, sive lividæ aut plumbeæ quasi evadunt, mox oritur summa Præcordiorum Oppressio, Anxiety, Delirium, &c.; tali in Casu Linteis, aut Pannis calidis protinùs, confricandum est totum Corpus, porrò ad *Cardiaca* idonea confugiendum est, quæ sunt *Lap. de Goa*, *Crocus Anglicus*, *Moschus*, *Camphora*, ex *Jalapio* temperato, aut *Vino tepido*; nec utiquè novi meliora, nedum tutiora ubi *Morbilli* evanescunt, aut minùs vividi spectantur. Erumpentibus *Morbillis* ab Aere frigido madidæque Sudore Indusiis summoperè cavendum est, his enim creberrimè reperiuntur *Exanthemata*; neque intereà æstuoso in Aere continendus est Æger, nec Stragulis nimium onerandus, nam & Spirandi Difficultatem adaugent, & Sudores immodicos eliciunt, præcipuè in Adultis, quo nihil pejus—Faceffentibus porrò *Morbillis* *Diarrhœa* ingruit sapissimè: hinc summa opus est Cau-

Cautela, nec sanè præproperè sistenda est; por-
rige subinde modicam *Rhabarbari Dosis* cum
Nuce Moschata tosta, Decoct. C. C. C. C. — *Oryzæ*
— *Fracastorii*; & *Misturam* absorbentem aliquam
ex *Corall. rubr. lævig.* *Bolo Armena* & *Aq.*
Cinnam. tenui confectam exhiberi jubeo.

Plena Luna 3°. *OCTOBRI.* *Nova Luna* 17°.

Magna jam incipit *Cœli Mutatio*, plurima
nempe ruente *Pluvia*, furente quoquè *Procella*,
& per *Initia*, atque *Menfis Exitum*: medio ta-
men *Apricitas*, *Borea* plerumque flante à xv. ad
xxii. *Atmosphæra* multò fit crassior ac humidior.

Pluvia $\frac{11}{2}$. $\frac{1}{3}$. 4. $\frac{11}{5}$. 6. $\frac{11}{7}$. $\frac{11}{8}$. 9. 10. $\frac{11}{13}$. 14.
16. $\frac{1}{17}$. 25. $\frac{11}{26}$. 27.—29. $\frac{111}{30}$. $\frac{111}{31}$. *Grando* 3.
Dig. Dec.
 $\frac{1}{27}$. 31.—4. 960.

Maximus Maris Æstus & *Procella Vesperis* 2.
w S w 4. *Procella* 3. primo *Mane* & a. m. N w
4. *Nox procellosa* 5. w S w 4^x. item 7. S S w 4^x.
— porrò 26. w N w 4. *Procella cum Fulgure*
27. primo *Mane*—29. *Nocte* S w b w 4. — 30. S
w b w 4. — 31. p. m. S S w 4. *Glacies* 20. 21. 29.

8 *Altitud. maxim.* 22. 30. 2. E N E 1^x. } *media* 29. $6\frac{4}{31}$
— *minim.* 3. 28. 8. N V V 4. }
Dies frigid. 28. 59. N N V V 2. } *media* $47\frac{12}{31}$
— *tepid.* 10. 40. S V V 3. }

Rheumatismus & *Diarrhœa* frequens, *Dysente-
ria* quædam; *Rauedines*, *Faucium Asperitates*
ac *Tumores* plurimos vexant. *Variolæ* passim
multæ adhuc, exque sæpe malæ admodum *In-
dolis*,

1742) & Morbis Epidemicis. 93
 dolis, Petechiis scilicet lividis haud rarò comitan-
 tibus: imò ipsi Morbilli livescentes, jam multò
 plures jugulant quam Variolæ, præsertim Adul-
 tos qui universa quasi Necrosi pereunt anhelì,
 suffocati, stupidi prorsus. — Nil lætius evenit a-
 beuntibus Morbillis, quam rupta & aspera valdè
 Cuticula.

Plena Luna 1^o NOVEMBRI. Plena Luna 30^o
 Nova 16^o.

Pluviosus fuit admodum & frigidus hic Men-
 sis, crebrò etiam nimbosus: incipiente Novembri
 Ventus ab Occidente venit, à decimo autem ad
 Finem usque ab Oriente, flectens plerumque ad
 Septentrionem, aliquando tamen interfuit Vul-
 turnus — Aer per totum gelidus, caliginosus, hu-
 midus — Barometri Statio humilis.

Pluvia $\frac{111}{1}$ 1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{2}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{11}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{111}{11}$ 11. $\frac{111}{13}$ 13. $\frac{111}{20}$ 20.

$\frac{1}{21}$ 21. $\frac{111}{22}$ 22. $\frac{111}{23}$ 23. $\frac{111}{25}$ 25. 26. $\frac{111}{29}$ 29. 30. Grando vehemens
 Dig. Dec.

1. Nix 16. = 5. 267.

Procella 1. p. m. & insequente Nocte S w 4^x
 ————— 10. Nocte E 4^x. — 25. Nocte S E 4^x,
 — vehemens 30. primo Mane E S E 4^x.

Rigidum Gelu 15. 16. 29.

Altitud. maxim. 28. 30. 0. NE 1. } media 29. $3\frac{14}{30}$
 ——— minim. 23. 28. 7. E S E 3. }
 Dies frigid. 29. 68. N N E 1. }
 — tepid. 1. 53. S VV 4^x. } media 59 $\frac{1}{2}$

Iidem usque dominantur Morbi, atqui Distil-
 lationes, Coryzæ, Tussis, Rheumatismi multò sunt
 severiores.

DECEM-

D E C E M B R I.

Sæpe Boreas, sæpe hoc Mense perflavit Vulcanus, unde *Baroscopii* Statio fuit præalta, à xviii. ad xxii. intervenit Libs decidente Pluvia — nec tamen hoc detruxit *Mercurium*, altior quini-
mò surrexit, adeò ut xxii. Gradum 30. 4. attigerit; quod quidem haud parùm mirabar, sed *Atmosphæra* erat crassissima, & Eurus mox præ-
valebat per Dies aliquot — Sub Finem tamen Libs recurrit. Acre sæpe Gelu incipiente Men-
se, à xii. ad xvii. asperrimum.

Pluvia 18. ¹¹19. 20. 23. 27. ¹¹28. 29. ¹31.
Dig. Dec.

Nix 3. 7. = 1. 342.

Ventus vehemens 14. 16. E N E 4^x. Procella
28. Mane S w 4^x. Circius furens 30. p. m.

☿ Altitud. maxim. 22. 30. 4. S S V V 1^x. } media 30. 0⁹/₃₁
—— minim. 29. 29. 6. S V V 3^x. }
Dies frigid. 15. 76. E N E 2^x. } media 63¹²/₃₁
— tepid. 31. 51. S V V 3^x. }

Cita ac torminosa Alvus multos adhuc exercet, imò interdum etiam cruenta: *Asthma* grave plu-
res premit — Tusses, Raucedines, Colli Tumores
& levis Angina plurimos. *Variolæ* passim, *Rheu-*
matismi multi. *Peripneumoniæ* aliquæ; & Fe-
bres lentæ putridæ.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLII.

Dig. Dec.

= 25. 783.

Nova Luna 14°. *JANUARIO. Plena Luna* 28°.

Densa fuit admodum ac humida; toto ferè Mense, *Atmosphæra*, plerumque etiam frigida, *Barometri* Statio interdum præalta, a magna partim Aeris densitate. Ventus Initio ab Occidente spiravit, a nono autem ad decimum octavum ab Oriente, declinans ad Septentrionem, isque frigidus & glacialis; inde Libs multò tepidior.

Pluvia $\frac{11}{1}$. 2.—4. $\frac{11}{5}$. 7. 8. 10. 19. 24. $\frac{11}{25}$.
Dig. Dec.
26. 28. 31. Grando 6. = 1. 5 12.

Magna *AB.* 12. H. 8. p. m. Nebula valdè foetida 22. Malacia. Procella 5. tota ferè Die
w S w 4.—26. p. m. & per Noctem S w 4^r.

Altitud. maxim. 11. 30. 7. E N E 1. } media 29. $9\frac{20}{25}$
— minim. 26. 29. 3. S V V 4^r. }
Dies frigid. 21. 69. N N E 1. }
— tepid. 7. 52. S V V 3. } media 59 $\frac{22}{29}$

Variolæ adhuc passim: *Rheumatismi*, *Pleuritides*, *Tusses* plurimæ; *Angina mucosa*, *Tumores Faucium Dentiumque Dolores* frequentes; *Febres* aliquæ lentæ—*Cervi* perplurimi pereunt undique.

Nova Luna 13°. *FEBRUARIO. Plena Luna* 27°.

Crassa perstat & humida *Atmosphære* Constitutio; est autem paulò tepidior, Ventus incertus valdè, variat ferè quotidie; Corus tamen prævaluit!

Pluvia

Pluvia 1. 2. ^{II} 3. ^I 4. 6. 9. ^{II} 11. 13. 14. ^I 15. 22.
Dig. Dec.

23. 25. 27. = 1. 584.

Procella & Fulgura 3. p. m. S w b w 4.

8 Altitud. maxim. 8. 30. 2. N VV b VV 1. } media 29. 8¹/₂
—— minim. 3. 29. 3.

Dies frigid. 20. 64. N E 1. } media 54²⁰/₂₈
— tepid. 9. 51. VV 1.

Febris *Catarrhalis* & *Variolæ* passim; Tussis innumeros infestat cum Tumore Faucium, Tonfillarum, & lævi sæpe Angina; Febres aliquæ tertianæ. Tempestas sanè est parùm morbosa; atqui plurimi etiam Seniores Lumbricis rotundis vexantur.

Fœtidissima Scabies adhuc inter Equos, quæ diu jam duravit.

Nova Luna 14°. MARTIO. *Plena Luna* 28°.

Frigidus succedit *Martius* Aerisque Temperie multò ficcior; ineunte Mense Malacia crebra exeunte verò nimbosa Tempestas *Barometrum* depressum primens plurimùm; à vii. ad xxi. Ventus aquiloni & Gelu subinde.

Pluvia 1. 3. 6. ^{II} 11. 15. 22. ^{III} 25. 26. ^{III} 27. 28.
29. 30. Nix & Grando 7. ^I 10. 11. 23. 25. 30.
Dig. Dec.

= 2. 946.

Maxima AB. 8. Vesperis N N E. 1. Nubeculae lucidissimæ sequi videntur Venti Cursum.

Procella 25. S w 4. — 26. à primo Mane per totam

1743)

& Morbis Epidemicis.

97

totam Diem S w b S 4. at Vesperl & durante
Nocte Circius vehementissimus — Turbo gravissi-
mus 28. ab Hora 5. p. m. ad 9. w N w 4^x.

8 Altitud. maxim. 15. 30. 2. N b E 1. } media 29. 6²/₃
 ——— min m. 26. 28. 8.
 Dies frigida 8. 66. N N E 1x. }
 — tepid. 5. 51. Malacia. } media 55²²/₃₀

Variolæ frequentes, *Febres intermittentes* plu-
res & *quotidianæ* & *tertianæ*. *Rheumatismus*,
necnon *Tormina* passim; *Tusses* ubiquè. *Gra-*
vedines, *Dolor Dentium*, *Capitis* & *Tonsilla-*
rum Tumores cum *Asperitate Faucium* multos
molestant.

Scabies foëdat. *Equos* maximè, extrema *Ma-*
cie confecti plures pereunt, aliqui *Angina* atque
Tussi suffocantur.

Nova Luna 13^o. *APRILIS*. *Plena Luna* 27^o.

Pars prior Aprilis fuit valdè frigida, posterior
tepidata satis; *Ventus* ab *Septentrione* undecimum
Diem adusque, sæpe cum *Nive*, *Grandine*, *Ge-*
lu: à xiii. ad xvii. *orientalis*, post varius; ple-
rumque tamen è *Plagis australibus*.

Pluvia 1. 4. 5. 8. 11. 13. 14. 18. — 21. 23.

25. 26. 27. 28. *Grando* 1. 4. 5. *Nix* 2. 5. 6.
Dig. Dec.

= 1. 662.

Levis AB. 1. *H.* 8. p. m. N b E 2. *Fulgur* &
Tonitru 21. *Nocte*, *Circius* vehemens 22.

* H

8 Alti-

8 Altitud. maxim. 6. 30. 1. N 1. } media 29. $7\frac{5}{29}$
 ——— minim. 26. 29. 3. S S V V 3.
 Dies frigid. 2. 64. N 2x. } media 49 $\frac{21}{29}$
 ——— tepid. 30. 35. S S V V 2x.

Variolæ adhuc; multæ Febres intermittentes*,
 tertianæ potissimum; Pleuritides & Peripneu-
 moniæ plurimæ: Febris putrida passim cum
 Eruptione *miliari* rubra plerumque; omnes ferè
 levi Angina per Initia corripuntur, sub Finem
 Cuticula multum desquamatur. — Plures tabidi
 moriuntur.

Dysenteria cruenta multos, inter Popellum
 præcipue, perimit, Vermes teretes ferè semper
 ejciuntur, etiam ab Adultis, imò & à Seniori-
 bus — Nescio pol unde, sed per plures jam Menses
 juniores, necnon Ætate proventus, longè magis
 infestaverunt Vermes quàm memini unquam.
 An ab immensa Copia Fructuum omnigenorum,
 quæ undique per Æstatem & Autumnum Anni
 1742. maximè scatebat? his certè utitur nimium
 Vulgus semper cum abundat, imò & abutitur:
 quippe Cerasa, Pruna, Poma perpetuò devorat.

Maximè sævit hæc *Dysenteria* in Oppido *Plim-*
ton, ejusque Vicinia, Solo scilicet pingui & uligi-
 noso, Morbisque plus satis obnoxio, Febribus
 lentis præsertim & intermittentibus: duravit au-
 tem ab Initio *Aprilis* ad *Maii* Finem. Huic ple-
 rumque accessit Febris, rectius fortasse dicerem
 hæc fuit ipsius Febris *Symptoma*; nam ab ipso
 sæpe Principio, atque ante ulla Tormina, haud
 levis urgebat febriculosus Ardor cum Pulsu inci-
 tatiore,

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 20.

tatiore, ac Lingua scabra; quid quod & sæpissime cum manifesto satis Horrore ingruerat Morbus, & non rarò utique More *Hemitritæ* Cursum tenebat — Haud certè scio an fuerit Febris *epidémica*, mox describenda, ad Intestina translata: hoc sanè mihi compertum est, *Dysenteriam epidemicam* non esse frequentem Veris Solentem *.

Ut ut fuerit, aderat semper Febris plùs minùsve, Sanguinem ideò plerumque incipiente Morbo detrahi curabam, ne gravior foret Intestinatorum Inflammatio, indeque acerbiora Tormina, certiorque demùm Gangræna — Urgebant semper per Morbi Initia Nausea & Vomitus; Monitis adeò Naturæ obsecundans nunquam non Venter elui jubebam, dato *Ipecacuanhæ* Decocto aut Infusione, epoto mox affatim Oryzæ aut Pulli Jusculo. Hoc peracto porrigendum est *Rhabarbarum* subinde cum liberali, diluente & demulcente Potione, qua lenitur Acrimonia Humorum & in Sanguine & in Visceribus, dum *Rheum* acrem expellit Colluviem. Ita sanè necessaria est lenis Alvi Purgatio Initio omnis *Dysenteria*, ut si hæc omittatur, Astringentia verò & *Opiata* præproperè dantur, mox gravissima accedunt Tormina, Stomachi Ægritudo, Singultus, *Apthæ*, tandemque Intestinatorum *Sphacelus*, quem cita Mors excipit — Hoc equidem Monitum in *Dysenteriiis* curandis perpetuò observari debet; in hac autem, de qua nunc agitur, pernecessarium est utiquè, quia procedente Mor-

H 2

bo

* (Δυσεντερὴν γίνεσθαι Θέρους ὥρη, δεύτερον φθινόπωτον, ἢ ὅσον ἥρος, ἢ καὶ χειμῶνος. Aret. Cappad. Cap. de Dysenteria ad Finem.

bo Lumbrici ferè semper ejiciuntur: Quid sperandum Hoste in imis Visceribus hærente? Quid si hostem Calomelano expugnes? Hoc feci hercle sæpius, nec pœnitendo certè Eventu, quinimò læta sæpe reportata Victoria.

Non ita tamen Purgantibus insistendum est, quasi Nil ultra desiderat Morbus; Tormina namque *Anodynis* subinde sopienda sunt, nimiusque porrò Fluxus Humorum est cohibendus; intereà corroboranda sunt etiam Intestina — facit ad hæc omnia commodè satis *Confectio*, ut dicitur *Erasastorii* (præcipuè Nuce *Myristica* tosta, aut Cinnamomo adjecto) si debita exhibeatur *Dosi*, & si sit necesse, *Extracto Thebaico* adjuncta. Decoct. C. C. aut Lac dulce cum Aquæ fontanæ Duplo & Cinnamomi paululo coctum, aut Serum Lactis tenuissimum, in quo Ferrum ignitum sit extinctum, sorbenda sunt subinde. Si Bilis acris abundet, si *Dysenteria* sit valdè cruenta, & sinceri Sanguinis plurimum dejiciatur *Tinctura Rosar. rubr.* probè acidula juvat, aut Vinum rubrum austerrum dilutius — Plerumque, sub Morbi Finem, excruciat maximè gravissimus quasi Intestinorum Descensus, & perpetuus desidendi Conatus; hoc nihil æquè levat ac *Diascordium*, aut *Theriaca Andromachi*, ex Lacte dulci, aut Decocto albo, Clystere data. Sed de Morbo *dysenterico* mox plura.

Sub Finem *Aprilis* per omnem hanc Regionem grassata est Febris quædam levis plerumque, interdum verò haud parùm truculenta, Senibus & Pueris pulmonariis. — Simul & semel innumeros corripuit Horrore quodam vagante, & Gravitate Capitis, mox quoquè Dolor ejus accessit, Artuumque porrò & Dorsi, plurimos tamen universa quasi Lassitudo molestavit. Protinus maxi-
ma.

ima fuit Distillatio acris per Oculos; Nares, Fauces, sæpiissimè etiam in Pulmonem; unde Sternutamenta ferè perpetua, ac vehemens plerumque Tussis: Omnibus adfuit Pectoris quædam Strictura, & Gravitas permolesta. Secundo adeò Die invaluit Febris, Pulsusque multò citatior factus est, aucta quoque spirandi Difficultate, præcipuè si Sanguinis Missio fuerat neglecta. Sitis utiquè non admodùm urgebat, at Lingua erat peralba, veluti Cremore Lactis suffusa: Oculi leviter inflammati, atque in ima Orbita dolentes, Lumina refugiebant.

Non uno Tenore processit Febricula, sed nunc Algor, mox Ardor incessit, nullo prorsus servato Ordine; cum eo tamen ut haud rarò tandem in Tertianam aut Semitertianam* facesserit. Erat autem ominis multò peioris *Peripneumonia** seu *Pleuropneumonia* quæ quidem ob Sanguinis Abundantiam, atque Tussis Vehementiam accedebant interdum, his præsertim, qui calidioris Regimine & Medicina usi fuerant; nec infrequens, eandem ob Causam, erat *Pleuritis** aut *Rheumatismus* acutus, præcipuè neglecti Sanguinis Missione, ineunte Morbo.

Sanguis extractus fuit nonnumquam valdè glutinosus, plerumque tamen floridus, at non multo Sero scatens; varius autem fuit in variis, quo magis ardebat Febris utiquè eo tenacior: qualiscunque verò visus est Sanguinis Status, haud magnum ejus Dispendium ferebat hic Morbus; imò, si vel *Peripneumoniæ* aliquid subesset minimè largam sine maxima Virium Ruina, rarò

H 3

plus

* Vid. *Essay on Fevers*; P. 20.

plus Vice simplici Venæ Sectionem tolerabat : nec in hac solùm, sed in omni Febre *Catarrhali epidemica*, hoc ferè perpetuum notavi ; namque minuendo Naturæ Vires nimiùm *Perspirationem* inhibet, indèque acrem auget Colluviem. — Aliqua tamen Sanguinis Missio, ipso Morbi Initio, in robustis adultis, lautè viventibus, *plethoricis* juvat semper.

Per totum Febriculæ Decursum sputabant largissimè, quod Pectori Levamen erat maximum ; Tussis autem Importunitas haud leviter *Tracheam* atque Pulmones exasperabat ; Oleum ideò *Amigdalinum*, *Sperma Ceti*, imò & *Papaveris* aliquid, *Diacodium* putà, *Tinctur. Thebaic.* aut *Elixir Purgatorium* desiderabat ; Ultimum hoc porro utiles blandosque Sudores movebat, nec intereà gravabat Pectus. Frequenter equidem Pulmonum Gravitas & Præcordiorum Oppressio *Oximel Scillitic.* *Lac Ammoniac. Syrup. Croci*, aut tale quid, deposcebat — atqui, hoc in Casu fuit instar omnium ferè lene *Emeticum* ; quod quidem, mox post Venæ Sectionem, totum hoc sæpissimè discussit, & non uno solùm Nomine Opem tulit.

Pars Ægrotantium longè major faciles, æquales, benignos habuere Sudores secundo, vel tertio Die, qui una comitante Expuitione larga, Febrem quinto profligarunt, sæpe etiam citiùs, manente tamen ut plurimùm haud parvo Virium Langore — Hæcce autem Nihil promovit feliciùs quàm diluens, demulcens, tepidus Potus ; Serum nempe Lactis dilutissimum, Hordei, aut Avenæ, aut conditi Eryngii Decoctum ; Hederæ terrestris, Tussilaginis, *Glycyrrhizæ*, Infusio ; imò per plurimis Coffee Potus profuit maximè cum Lactis dulcis pauxillo — Apage verò Sales Spiritusque,

ut

ut vocant, *volatiles*, calida *Alexipharmaca*, & id Genus alia, quæ turbant certè plurimùm, parùm verò utiliter expurgant Morbum. — Cæterùm Febrē, acrius atque diutiùs inhærentem, *Hauftu Salino communi** moderabar.

Crebrò autem sub Febriculæ Finem multæ rubræ, urentes Pustulæ erumpebant, sæpe repentina, imò & profusa Diarrhœa accedebat sævis interdum cum Torminibus, facta nimirùm morbosæ Materiei ad Intestina *Metastasi* — Hinc fortè & *Dysenteria* plurimæ, quæ & hic quoquē tunc Temporis passim grassabantur; mucosæ fateor, rarè cruentæ — Adeò tamen parùm cohibendus erat hic sese levandi Naturæ Conatus, ut per Alvum sæpius Sponte facesseret Morbus; atque ideò Manna, *Rhabarbaro*, *Tartaro solubili*, *Tamarindis*, &c. promovendus: fortiora tamen Purgantia horrenda plerumque excitabant Tormina. Viresque penitùs disjiciebant.

Febris hæcce, utcunque longè latèque maxime vulgaris, paucis fuit Exitio; quandoquidem tertio ut plurimùm quartove Die evanuit, modò se reciperent maturè ea correpti — Res fuit herclè *Diætæ* potiùs accuratæ, ac debiti Regiminis, plerumque quàm Medicinæ elaboratæ; non quòd non interdum multò plus Curæ atque Diligentia poposcit. Sudores æquales, at moderati, Sputa multa, facilia, Urinæ largæ, lutulentæ facile sublevabant Morbum: mirabar sæpissimè immensam Urinæ subsidentiam; qua tamen Nil auspiciatius.

H 4

Eadem

* Vid. supra Mense Junio 1740.

Eadem prorsus videtur hæc Febris, quæ per totam Europam, hoc Vere, sub Nomine *Influenza* grassata est: apud Gentes tamen Australes longè magis quàm hìc fuit pestifera; quinetiam & apud Londinenses ipsos Funera auxit maximè, imò una duntaxat Hebdomade ad Mille saltem.

Nova Luna 12°. *MAIO.* *Plena Luna* 27°.

Sicca fuit admodum, perpulchra & calida *Atmosphæra* Diem adusque vicesimum secundum; Boreas perpetuus ad xvii. indè Vulturnus, pòst xx. Libs pluviosus.

Pluvia 16. 20. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29.
Dig. Dec.
30. = 0.866.

Fulgur & Tonitru è Longinquo 20. p. m. levis
Procella 27. Nocte S w b S 4^r. Grando 30. — &
& h conjunctissimi sexto Die H. 11. p. m. aded
ut unum tantum Planetam quasi exhibeant.

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|----------|--|---|----|---|
| 8 | Altitud. maxim. | 8. | 30. | 1. | N | E | 1. | } media 29. 6 ²⁴ / ₂₇ |
| — | minim. | 21. | 29. | 2. | S | S | VV | |
| Dies | frigid. | 1. | 36. | Malacia. | } media 30 ¹³ / ₂₇ | | | |
| — | fervid. | 7. | 22. | N | | | | |

Plurimi *Apoplexia* correpti sunt, & plures crepti, nec hìc tantum sed & aliis in Locis: an ab enormi, ac intempestivo *Æstu* Sanguinem subito nimis expandente? Febres quotidianæ & tertianæ creberrimæ longè latèque; *Variolæ* & *Morbilli* passim. — Tussis ferina * frequens & pertinax maximè;

* Consule quæ dixi de Pertussi Puerorum, Vol. 10.

1743) & Morbis Epidemicis. 105
maximè , sæpe post Morbillos funesta — Fugat
hanc optimè modica Sanguinis Detractio, & lenis
Alvi Purgatio, confert Rusticatio, frequens E-
quitatio, atque accurata & lenis Diæta: ubi pa-
rum hæc proficiunt Medicamenta ex Argento
vivo præparata & Cortice Peruviano rarò fallunt,
quoniam Lentorem attenuant Sanguinis, & Ver-
mes pellunt, qui jam diu perplurimis maximè
sunt infesti, nec cedit plerumque Tussis nisi his
jectis: — Haud rarò prodest Balneum frigidum,
ubi omnia incassum exhibita fuere: cave tamen
ne adsit Febricula, vel Hæmoptoe.

Dysenteria cruenta, aut mucosa, sævit maxi-
mè apud Plimton & Vicinitatem: Perplures
lumbricos dejiciunt, nec tamen indè multum
evantur; imò sæpe haud multò post frigido Su-
ore correpti mox Animam agunt: credo quòd
angrænosa Sanies fœdos hos Inquilinos expellit:
naque cum his exeunt interdum Carunculæ li-
idæ, foetidissimæ, haud dubia utiquè Signa
phateli Intestinorum*.

Venæ Sectionem, quam superiore Mense ad
dysenteriam consului, jam etiam magis necessariam
venio ipso protinus Morbi Initio, ob ma-
num sanè & insolitum Tempestatis Calorem:
urgescit enim indè quamplurimum rarefactus
Sanguis, atquè majorem excitat Inflammationem.
— Vix unquam utiquè datur Dysenteria epidemica
ubi Intestina non sunt, aliquo saltem Gradu, in-
flammata — Ubi autem viget Inflammatio, ibi
etè semper mittitur Sanguis quamprimùm;
Vires,

* ἢν ὑπὸ Δυσεντερίης ἐχόμενω οἶον Σάρκες ὑποχωρήσωσι,
γασίμων. Hippocr. Aph. 26. Sect. 4.

Vires, Ætas, Pulsus, Constitutio & Anni & ipsius Ægrotantis Modum statuunt. — Movenda dein est leniter Alvus (deterfo prius Ventriculo si Nausea & Vomitus urgent) blandis tamen semper Purgantibus utendum est, quæ namque ex Aloe, Scammonio, aut Colocynthide confecta sunt, in hoc Morbo Toxica sunt prorsus, non Remedia. — Omnium sanè optimum est Rhabarbarum, quod exhibendum est sæpius (tostum id semper si ab Indiis venit Orientalibus) cum Nucis moschatae aut Cinnamomi pauxillo. — Tinctura hujus ex Vini Spiritu, utpotè resinosa nimis, parùm proficit; longè melior est quæ Vino rubro extrahitur.

“ Adeonè verò purgandum est si cruenta sit
 “ Alvus & perliquida? ” etiam; acris etenim Intestinorum Colluvies fit longiore Mora acrior longè, vellicatque multò magis, unde majorem excitat Inflammationem, ipsumque adeò auget Morbum. — “ At Sanguine tincta est Alvi Pro-
 “ luvies — sit ita; ” nocetne modica Sanguinis Expuitio in Pulmonum Inflammatione; nonne hæc sæpissimè, sub certis Conditionibus, Morbum expedit? — Si alterutrius *Mesentericæ*, aut *Cæliacæ*, Arteriæ Ramusculi, Intestinorum Tunicas perreptantes, obstruuntur, facta Resolutione, facta Coctione, obstruens Materia sæpissimè in Cavo Intestinorum funditur; solvitur adeò Obstructio, solvitur Inflammatio, solvitur Morbus — Dolentes, inflammatae *Hæmmoroides* internæ Sanguinem frequentissimè emittunt: an Periculo est hoc Ægrotanti an Levamento? — Si sit igitur Alvus moderatè tantùm cruenta Nihil horresco; leni eluo Potione irritantem Acrimoniam, imo & corruptam blandè expurgo Colluviem, quæ citò

ali-

aliter exulcerata facit Intestina, tandemque *sphacelata*, cujus Signa sunt certissima Ventrīs Proluvies atra, oleosa, foetidissima cum lividis Carunculis, Sudores frigidi, Singultus, Delirium. Porro singulare quoddam in hoc Casu nonnumquam observavi, *Symptoma*, semper lethale, Urinam nempe limpidam, at parcam valdè; id præcipuè in perbono quodam hujus Oppidi Sacerdote, cui primò Nausea, Vomitus, Alvus torminosa, atquè cruenta valdè levi cum Febre, Lingua perarida, Urina ferè nigra: Die quinto omnia magis pacata, sexto tamen recrudescebant Tormina, Dejectio atra, saniosa cum Grumis quasi carnosus horrendi Fœtoris, Urina perparca, frequens autem, at prorsus limpida, etsi *Rhabarbarum* assumpserat quotidie: mox adeò Singultus, leve Delirium, Sopor nimius, tandemque nono, Finis omnium Malorum, Mors. Hic utiquè Intestina ita *sphacelata* videbantur ut Nil omninò ad Sanguinem transmitterent.

In nullo sanè Morbo magis necessaria est diluens & demulcens Potio quàm in *Dysenteria*— in hac utiquè pura puta Aqua fontana haud parùm Pauperculos juvabat, qui ad Fontem quandam sacrum, si Diis placet, & *antidysentericum*, confugere—innocuus saltem erat & purissimus, multòque magis Nomen *Aquæ Vitæ* meruit quàm *Spiritus Vini ardens*, hoc Titulo celebratus, quo se nimium sæpe in hoc Morbo Popellus abutebatur. Aquæ bene frigidaë Potionem commendat vel ipse *Celsus**, si vetus Vitium est; atqui inter Initia egelidam suadeo; quippe quæ & Intestina

* *Cels.* Lib. 4. C. 15.

tina eluit melius', & per *Meseraica* Vasa & *Lactea* ad Sanguinem diluendum transit facilius : cum verò elota sit acris Viscerum Colluvies, ea sanè firmanda sunt, adeoque tunc haud perperam exhibetur frigida — hac sola utiquè, Opii pauxillo adjecto, nonnumquam *Dysenteria* Curationem consummavi, probè purgatis prius Intestinis — Non multum equidem probo oleosa & glutinosa; si horum aliquid, derasis ac Mucō naturali privatis Intestinis, desideratur *Decoct. alb. Emulsio Amygdalina* cum *Gum. Arabic. Mucilago Semin. Cydonior.* exhibeantur; in Victu porrò *Gelatina C.C.* cum *Icthyocolla, Salop, Panatella*, aut id Genus alia.

Sed hæc de *Dysenteria* obiter. — Nunc quid *Febris epidemica* facit videndum est — Sanè grassatur usque plurimum, jamque frequenter plus habet *Peripneumonicae* Indolis, interdum magis ad putridæ Naturam accedit; in alterutro Casu Sanguis emissus parum videtur viscosus, etiam licet Pectus haud parum opprimatur — hanc porrò *Febrē* nunc comitantur magna *Faucium Asperitas*, quandoque ipsa *Angina* — Statu Morbi frequentes *Pustulae* urentes erumpunt, faustæ semper; sequiturque permagna *Cuticulæ Desquamatio*: rarior autem jam adest *Diarrhœa*; multoque si accedit, levior est; calida namque *Tempesta* magis nunc ad extra evocat Humores, adeoque Pars longè major *Ægrotantium* blando, at universali, oborto Sudore mox facilè liberatur; atqui plures *Febre* quadam intermittente corripiuntur* — *Quotidianæ* certè & *tertianæ Febres* jam

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 20.

1743) & Morbis Epidemicis. 109
jam ubique regnant; exeunte attamen Mense Cæ-
tarrhalis epidemica ferè penitus facessit.

Nova Luna 11°. JUNIO, Plena Luna 25°.

Siccus quoque, & calidus ut plurimum, fuit
hic Mensis, medio tamen inter fuere duo, tresve
Dies perfrigidi; spiravit Aquilo frequenter, Sub-
solanus interdum, Auster rarò, aliquando Ventus
siluit prorsus: exeunte Mense Rorationes maxi-
mæ — Stupenda Pruina, imò ipsa Glacies xiii. pri-
mo Manè, idque per totam ferè Angliam.

Pluvia 3. 5. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 26.
Grando 13. Meridie cum Fulgure & Tonitru.
Dig. Dec.
= 0. 838.

Procella, Fulgur, & Tonitru 14. Nocte — Ful-
gur & Tonitru primo Mane 26. — Levis AB. 28.
Nocte N 1.

Altitud. maxim. 6. 29. 8. Nb E 1. } media 29. 6⁶/₂₆
minim. 3. 29. 3. S 1. }
Dies frigid. 13. 46. Nb E 1. } media 28.
fervid. 7. 20. E 2. }

Variolæ adhuc & Morbilli, Tussis convulsivæ
plurimæ: Febres putridæ & Peripneumonice pas-
sim, intermittentes verò, tertianæ potissimum;
epidemicæ*; Tussis, Tumor, ac Faucium Aspe-
ritas permultos molestat.

Nova

* Essay on Fevers. P. 21.

Nova Luna 10°. *JULIO*. *Plena Luna* 25°.

Frigidus insequitur *Julius*, atque ideò, quòd solet plerumque, pluviosus; sæpe Libs turbidus fremuit, haud rarò *Vulturnus*, *Atmosphæra* hinc valde spissata est ac humidata.

Pluvia $\frac{ii}{i}$. 4. 5. $\frac{ii}{i}$. 7. 8. $\frac{i}{i}$. $\frac{iii}{ii}$. 11. 15. 17. 18. — 20. $\frac{i}{i}$. 21. 22. 23. $\frac{ii}{i}$. 25. 30. 31. — 2. 866. Dig. Dec.

Altitud. maxim. 29. 29. 8. NVVbVV 1. } media 29. 4
 ——— minim. 7. 29. 0. SVV 3x.
 Dies frigid. 10. 38. S E b E 2. } media 32 $\frac{5}{28}$
 — fervid. 21. 25. S VV 1x.

Variolæ passim adhucdum. *Febres* intermitteres plurimæ, præcipuè tertianæ*; perpauci cæteroquin Morbi.

Frigida fortassè crassaquæ *Atmosphære* Intemperies Hyemis, ac Veris elapsi, plurimum congesterat serosi Litoris, qui pro variis Hominum Temperamentis, nunc *Febrem* intermitterem, nunc *catarrhalem*, nunc putridam induxi

Nova Luna 8°. *AUGUSTO*. *Plena Luna* 24°.

Favente Deo longè felicior eluxit *Augustus*, la tamque produxit Messem: Tempestas fuit sæp fervida valdè, atqui dum Agros torret Canicula Herbæ uberrimo Rore fovetur: Ventus ab Oriente plerumque spiravit, sæpe verò deflexit a *Arctum*, Libs rarus, Malacia frequens.

Pluvia

* *Essay on Fevers*, P. 21.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 2. $\frac{11}{5}$ 6. 15. 19. 20. 29. 30.
Dig. Dec.

= 0. 700.

Fulgur, Tonitru, & gravissima Pluvia apud
Launceston 17. p. m. — hic etiam Fulgur, Toni-
tru, & Pluvia 29. Nocte.

Altitud. maxim. 23. 29. 9. NN E 1. } media 29. $6\frac{17}{28}$
minim. 5. 29. 3. S VV 2x. }
Dies frigid. 29. 34. E S E 2x. } media 27 $\frac{6}{28}$
— fervid. 9. 19. E 1. }

Variola ac Morbilli passim, multae adhuc Fe-
bres intermittentes Ruri: Apoplexiae aliquae, &
Cholerae: Pauci admodum aegrotant.

Nova Luna 7^o. SEPTEMBRI. Plena Luna 22^o.

Durat usque perpulchra & maximè sicca Tem-
pestas, quin & saluberrima*: Fontes & Rivuli
penè exarescunt penitus, at immensa Vis Roris
decidit quotidie. Ventus ferè perpetuus ex Orien-
te, intercurren- tamen nonnunquam Aquilone,
Austro rarissimè.

Dig. Dec.

Pluvia 2. 5. 6. 8. 16. 17. = 0. 250.

Altitud. maxim. 24. 30. 0. E N E 1. } media 29. 8.
minim. 5. 29. 6. S 1. }
Dies frigid. 30. 48. N E 1. } media 36.
— calid. 19. 30. E b N 1. }

Ineunte Mense haud pauci Febre quadam an-
inosa correpti sunt, quae paulò post Mòre peri-
pneumo-

* — οἱ Ἀυχμοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσὶν ὑγιεινότεροι. Aph.
Sect. 3.

pneumonic Pulmones invadebat, magno interdum cum Ægrotantium Periculo. *Asthma* frequens. Scabies undiquè, paucissimi aliter Morbi.

Nova Luna 6°. *OCTOBRI*. *Plena Luna* 22°.

Pluviosa Tempestas ingruit, citoque Pede ingruit Hyems, crassus hinc fit Aer & humidus. Initio Mensis Corus prævaluit, à x. ad xiv. frigidus Boreas, tunc Vulturnus, paulòque post nimbosus Auster.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 4. $\frac{111}{6}$. 7. — 9. 15. — 17. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. 22. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{11}{25}$. 26. $\frac{111}{27}$. 29. $\frac{11}{31}$. — 3. 638. Dig. Dec.

Levis Procella 16. S E b S 4^x. — 23. Vesperis S w 4^x. — Vehemens 23. media Nocte S E b 4^x. — gravis tota Die 25. S 4. Amplissimus & subluteus Halo circa Lunam 19. H. 8. p. m.

Altitud. maxim. 1. 30. 0. N 1. } media 29. $5\frac{16}{18}$
 ——— minim. 25. 29. 0. S 4. }
 Dies frigid. 14. 55. N E 1. } media 44. $\frac{15}{18}$
 — tepid. 27. 39. Malacia. }

Febris quædam *Sporadica*, quæ & Fauces & Pulmones graviter afficit. Tusses, Dolores, Tumores Faucium frequentes; *Rheumatismi* graves passim.

Nova Luna 5°. *NOVEMBRI*. *Plena Luna* 20°.

Ineunte *Novembri* Corus plerumque spiravit Medio Boreas, à xix. autem nunc Libs, nunc Auster, nihilominus altam satis Stationem retinuit. *Baro.*

1743) & Morbis Epidemicis. 113.
 Barometer ; Atmosphaera verò crassa fuit valdè ac-
 tepida.

Pluvia $\frac{11}{1}$ 2. $\frac{1}{3}$ 4. $\frac{1}{5}$ 6. 11. 16. $\frac{11}{17}$ 18.
 Dig. Dec. $\frac{11}{19}$ 20. 25. $\frac{11}{28}$ 29. = 2. 512.
 Fulgur & Tonitru 2. H. 4. a. m. Prujna &
 Gelu 9. 14. N.E 1^x.

Altitud. maxim. 24. 30. 2. S b E 1. } media 29. 9.
 ——— minim. 18. 29. 4. S VV b VV 3. }
 Dies frigid. 14. 62. N E 1^x. }
 — tepid. 6. 42. VV S VV 2. } media 49 $\frac{25}{18}$

Blanda admodum Tempestas ; pauci Morbi ;
 Febres tamen quædam anginosæ , scarlatinae &
 pustulosæ ; Tusses crebræ.

Nova Luna 5°. DECEMBRI. Plena Luna 20°.

A primo ad Diem septimum Decembris perfla-
 vit Eurus, pòst Corus , aut Libs, interdum A-
 quilo : à xxiv. ad Finem usque Ventus perpetuus
 ex Oriente , isque sæpe perfrigidus : præalta fuit
 ut plurimum Baroscopii Statio.

Pluvia 1. 8. $\frac{11}{9}$ 14. $\frac{1}{15}$ 16. $\frac{11}{17}$ 18. 19.
 Dig. Dec. $\frac{11}{14}$ = L. 514.
 Grando 14. = L. 514.
 Maximæ Pruinæ sæpissimè hoc Mense , Gelu
 rigidum frequens.

Altitud. maxim. 21. 30. 6. N E 1. } media 30. 0 $\frac{11}{19}$
 ——— minim. 17. 29. 1. S VV 2. }
 Dies frigid. 31. 73. E N E 2^x. }
 — tepid. 8. 46. S VV 3^x. } media 59 $\frac{22}{12}$

* I Tem-

Tempestas est adhuc maximè salubris, Morbi multò rariores solito: Tusles, frequentes, etiam *convulsivæ* plurimæ inter Pueros, Pleuritides, & Anginæ aliquæ, *Rheumatismus* passim.

Tota Pluviæ Quantitas, Anno MDCCXLIII.
Dig. Dec.
= 20. 908.

Nova Luna 3°. *JANUARIO.* *Plena Luna* 18°.

Constans ab Oriente Ventus, toto ferè Mense; *Mercurium barometricum* in alto sustinuit Loco, flectens verò plerumque ad Septentrionem Aerem fecit siccum & frigidum valdè, hinc Gelu sæpe asperrimum; imò 28°. 29°. vel ipsum Mare ad Littora congelatum erat.

Pluvia $\frac{iii}{7}$. $\frac{i}{11}$. $\frac{2}{15}$. 30. Nix 27. = 1. 068. Dig. Dec.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 6. E N E 1. } media 30. $\frac{0^{12}}{30}$
— — — minim. 7. 29. 6. S 2.
Dies frigidissim. 29. 76. N E 1. } media 64 $\frac{1}{3}$
— tepid. 11. 56. S b E 2. }

Tussis inter omnes ferè vehemens & laboriosa; sævissimi *Asthmatis Paroxysmi*: Dolores Dentium, Raucedo, Fauciumque Asperitas plures molestant; Pleuritis, vel Peripneumonia, corripit multos, *Ophthalmia* aliquos — Tussis *convulsiva* inter Pueros *epidemica*, ad quam profligandam magis fuit necessaria Sanguinis Missio quàm memini unquam, etiam in Puerulis tenerrimis, quorum Sanguis haud rarò non levi obductus erat Glutine: porrò non ita feliciter successit *Corticis Peruviani* Decoct. quod sanè perpetuum est ubi Sanguis est densus admodùm ac tenax, atque In-
flam-

1744) & Morbis Epidemicis: 115
 inflammationibus aptus; unde pessimè Pleuriticis
 & Peripneumonicis exhibetur.

| Nova Luna 2°. FEBRUARIO. Plena Luna 16°.

Varia fuit Tempesta variusque Ventus hoc
 Mense, frequens autem ab Oriente *Barometrum*
 tenuit ad altum satis Gradum, Malacia subinde
 per Initia; per totum *Atmosphæra* densa, ac sæpe
 frigida, haud multum tamen Gelu.

Pluvia $\frac{1}{7}$. $\frac{2}{8}$. 9. 11. 17. $\frac{11}{19}$. $\frac{a}{20}$. 21. — 23.
 $\frac{1}{24}$. 26. 28. 29. Grando 9. N b w 1^x. — 24. N
 w 3. — 1. 722.

Circius vehemens 24. p. m. — vehementissimus
 28. Noctu.

—— 29. a. m. Maximus & lucidus Halo
 circa Lunam 18.

& Altitud. maxim. 13. 30. 3. E S E 2.
 ——— minim. 29. 29. 2. N VV b VV 4. } media 29. 8;
 Dies frigid. 6. 67. E 2.
 — tepid. 23. 49. VV S VV 2x. } media 56 $\frac{15}{27}$

Variolæ aliquæ, rubra miliaris Eruptio cum
 Febricula passim & Febres rheumaticæ. — Tussis
 violenta inter omnes ferè, pluribus *catarrhalis*
 est prorsus, multis tamen *asthmatica*; hinc Pe-
 ripneumonia frequenter oritur, haud rarò Spu-
 rum Sanguinis, quod quidem aliquos in Tabem
 pulmonariam præcipitat. — Tussis convulsiva et-
 am Adultos quosdam corripit, qui solummodò
 repetita Sanguinis Missione levantur, & Vomi-
 u leni.

Nova Luna 3°. *MARTIO*. *Plena Luna* 17°.

Incipiente *Martio* perplurima Grando, Cauro
sepe perflante: à xii. ad xxiii. Ventus Orientem
inter & Septentrionem constitit, inde Libs; ad
ipsum Finem Aquilo: Aer fuit siccus plerum-
que & frigidus.

Pluvia $\frac{111}{1}$. 2. $\frac{8}{3}$. 4. $\frac{11}{5}$. 6. $\frac{1}{7}$. $\frac{11}{9}$. 11. 23. 25.
 $\frac{1}{26}$. $\frac{11}{27}$. 28. 30. Grando 2. 3. 6. 7. 8. $\frac{1}{10}$.
Dig. Dec.
Nix: 8. $\frac{1}{31}$. = 2. 632.

Procella 2. N w b w 4^x. — 5. S w b w 4. —
11. N w b N 4^x. Lumen boreale fulgidum valdè
22. H. 9. p. m. E N E 2^x.

⌘ Altitud. maxim. 15. 30. 1. E N E 2. } media 29. $5\frac{2}{3}$
—— minim. 5. 29. 2.
Dies frigid. 14. 62. N N E 2. } media $55\frac{26}{30}$
—— tepid. 28. 46. V V S V V 2.

Febres aliquæ tertianæ, & semitertianæ: Tuf-
fis molestissima & pertinax admodum undique,
quæ ex Naribus sæpe, sæpe de Pulmone, San-
guinem erumpere facit, accedit interdum Peri-
pneumonia — hinc *Phthisici* plures, præsertim qui
antea fuerant *Asthmatici*. Pleuritis & *Rheumatif-*
mus passim, sub Mensis Finem *Pleuroperipneu-*
monia frequens valdè — Cruor extractus est per
quàm crassus atque maximè tenaci & flavo ob-
ductus Glutine.

Nova Luna 1°. APRILI. Plena Luna 15°.

Ineunte Mense Nix & Grando multa flante Aquilone, mox turbidus Auster; à xii. ad xvi. Eurus, indè Aquilo rursùm; Corus sub Finem. Aer fuit sæpe gelidus valdè; maximæ Pruinæ sæpissimè per medium Mensẽ, imò & interdum Gelu.

Pluvia $\frac{i}{1}$. $\frac{iii}{4}$. $\frac{iii}{6}$. $\frac{iii}{7}$. $\frac{i}{8}$. $\frac{ii}{9}$. $\frac{iii}{10}$. $\frac{ii}{12}$. $\frac{ii}{15}$. 22.
 $\frac{ii}{28}$. 30. Nix & Grando $\frac{i}{1}$. $\frac{i}{2}$. 3. 4. 9. 26.
 Dig. Dec.
 = 3. 390.

Procella 7. p. m. S 4^r. Gelu 14. 15.

Altitud. maxim. 19. 30. 1. N N E 1. } media 29. 6.
 ——— minim. 5. 29. 0. S S V V 3^r. }
 Dies frigid. 3. 65. N N E 3. }
 ——— tepid. 24. 41. N V V b V V 1. } media 50. $\frac{6}{29}$

Pleuritides & Peripneumoniæ valdè frequentes, sæpe conjunctæ sæviunt: Multi *Asthmate*, multi *Rheumatismo*, multi Pleuritide spuria, laborant, plurimi Tussi gravissima. *Morbilli* passim, *Variolæ* quamplurimæ per Viciniam, necnon in citeriore *Cornubia*; haud paucæ Febres tertianæ* — *Paraphrenitis* solito frequentior.

Vix sanè observavi unquam Cruorem, ab Ægrotantibus detractum, magis densum atque glutinosum quàm hoc Tempore, idque sæpe post quartam, imò & sextam Sanguinis Missionem — hoc profectò notavi præcipuè in primario Noso-

I 3

comit

* *Essay on Fevers*, P. 20.

comii nautici Chirurgo, qui ineunte Mense *Paraphrenitide* fuit peremptus.

Bonus hic & ingeniosus certè Vir Mane, tertio *Aprilis*, inhorruit, mox Rigore maximo correptus, inter visitandum *Ægrotos*, se recepit, protinùs sævissimo Dolori Dorsi ac imi Pectoris dextri percitus succubuit, febricitavit vehementer — Missus est extemplò Sanguis ad \mathfrak{z} xvi. me dein arcessiri voluit — Fotum emollientem, & laxans *Enema*, præcipio, Nitrique plurimum & *Spermatis Ceti*, Potum diluentem, porrò & subtepidum, liberalem; furente tamen usque Dolori, sub Noctem alteram Sanguinis Missionem ad \mathfrak{z} xvi. Fotumque iterùm, & *Enema* è Lacte dulci cum Sale marino plurimo, quo bis, terve deiecit Alvus; mox *Diacodii* \mathfrak{z} ss. sumpsit ac *Tinct. Thebaic.* gut. xxiv. — Tota Nocte ejulavit, difficillimè spiravit, Tussicula arida vexatus Nil expuit — bene Mane adeo, Die quarto, \mathfrak{z} xiv. Sanguinis detractæ sunt, Fomenta etiam & *Cataplasmata* demulcentia admota, paulòque post injectum est emolliens *Enema*, quo rejecto epotus est *Haustus Anodynus*: pacata hinc omnia per oras aliquot, accessit Vesperis Somnus — Infidæ autem hæ Induciæ! Nox maximis in Molestiis acta; Febris vehemens, Spiritus brevis, interruptus, difficillimus, Dolor acerrimus, Sitis ingens, Lingua arida — Ergo V^o. *Aprilis* H. 9. a. m. repetitur V. S. ad \mathfrak{z} xii. saltem, *Mannæ* porrò \mathfrak{z} x. cum *Sale Mirabil. Glauber.* \mathfrak{z} ss. ex Jusculo avenaceo assumptæ sunt; ter hinc, quaterve, respondit Venter, sævissimus tamen usque urget Dolor, Pulsusque celerimè vibrat, exilis quidem, sed durus admodum: bis Noctu repetita sunt *Anodyna*, unde Sopor aliquis, at perturbatus valdè — Cum parum

rūm hæc omnia proficere viderim *Camphoram* cum *Nitro*, &c. exhibui, *Haususque Salinos* ex *Sal. C. C. Succo Limonum*, &c. ut nimirū per Sudores forsan Morbum elicerem; Femoribus porrò atque Dorso *Vesicatoria* applicari jussi — Sudavit paululū inæqualiter, mox autem Rigor invasit, Dolorque Dorfi & Lateris immanis re-
crudit, adeò ut jam non modò exclamaret, sed & fureret planè — quinta adeò Vice, Die 6. nempe, post Meridiem, Sanguis emittitur ad zxxv . circiter: ad Fomentum dein & *Clyisma*, necnon *Anodyna* confugimus, hinc Quies aliqua, sed Languor magnus, obrepfit denique Somnus. Post sex vel octo Horas inalgescens horruit, ejulavit, deliravit, se Flammis atque Ferro excruciatum intūs, dextro è Latere, exclamavit; (durum valdè, sed retractum, persensit Hypochondrium dolens*) anhelavit quasi ex citissimo Cursu interim maximo Nisu, at summo Angore, quasi Gladio perfossus, Suspirium edere anxie desideravit — Dubius omninò quid facerem ultra sextam Sanguinis Missionem suadeo ad zxii . circiter, Fomenta iterū *Cataplasmata* & *Anodyna* — Super-
venit Sopor, Tremor, Tendinum Subsultus. Singultus: atqui se relevatum prædicat; quievit utiquè plurimū, sed aliena murmurans & incondita — Frigidulus occupat Sudor Frontem, dum Genæ intenso Rubore flagrant, nigrescunt Ungues, frigescunt Manus; facilius verò movet, imò & se Sponte in Lecto erigit, meliūs se multò autumans, si modò Gravitas Spiritus immen-
I. 4. fa,

* Si Septum transversum percussum est, Præcordia fursū contrahuntur. *Cels. Lib. 5. C. 26.*

sa, & aliquantus usque Lateris Dolor ac Pondus abessent — At ego Hominem planè moribundum video, Septo transverso nempe *sphacelato*: tamen Sopores inter, Singultus & Deliria, atterit Noctem, Die 7^a. Mensis, paulò ante Meridiem, obiit Vir si quis alius, Vita dignus longiore. — Mox post Mortem lividum quasi à Contusione apparuit totum Latus Dextrum, Os *Ilium* adusque. Hic Casus fuit verè *paraphreniticus**, cujus perpaucæ extant apud Scriptores Medicos Historiæ: credo equidem longè sæpiùs occurrit quàm vulgò putatur.

Ab hoc Ægroto intra Quatriduum detractæ sunt Sanguinis Unciæ ferè centum, cujus singula Portio erat quàm maximè viscida, etiam ultima, licet Sero permulto tenuissimo limpidò innatabat Crassamentum (parvula velut Insula globosa, penè tamen prorsùs submersa) quod firmissimo quasi Corio erat obductum, vix utiquè Scalpello penetrandum†.

Nova Luna 1^o. —

Plena 15^o.

MAIO. Nova Luna 30^o.

Ventus Orientalis hoc Mense prævaluit, à xix. ad xxiv. Zephyrus: Aer fuit siccissimus, sub Finem valdè calidus — blandissima plerumque Tempestas.

Pluvia $\frac{11}{3}$. 8. $\frac{1}{10}$. 11. 12. $\frac{11}{13}$. 18. 21. $\frac{1}{22}$.
Dig. Dec.

Grando 13. = 1. 236.

Ful-

* *Essay on Eevers*, P. 240. † *Ibid.* P. 188.

1744) & Morbis Epidemicis 121
Fulgur & Tonitru 3. Nocte.

Altitud. maxim. 15. 30. 1. E N E 1. } media 29. $6\frac{26}{28}$
 ——— minim. 22. 29. 2. S VV 3. }
 Dies frigid. 14. 47. E N E 2. } media $36\frac{6}{28}$
 — fervid. 30. 20. E N E 1. }

Febres intermittentes *epidemicæ*; Pleuritis & Peripneumonia frequens, *Morbilli* passim: *Varicellæ* plurimæ, quarum haud paucæ mali admodum Moris: forsan à profusis Sudoribus; quibus Adulti, præcipuè incunte Morbo, sæpe corripiuntur — Sed & Puerulis non multò minùs sunt exitiales, qui nimirum Confluentibus, nigris, cruentis non rarò obruuntur.

Plena Luna 13°. JUNIO. Nova Luna 29°.

Sicca duravit & calida Tempestas ad Diem Mensis vicesimum, Eurus intereà spiravit frequenter, postea verò Ventus ab Oris australibus multam invexit Pluviam, Aeremque fecit multò frigidior.

Pluvia 4. 5. 8. 10. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
 ——— Dig. Dec.
 27. 28. 29. 30. = 2. 786.

Fulgur & Tonitru 5. Vesperis — 22. Hora 9. p. m. — 23. p. m. Nebula valdè foetida 26. p. m. Malacia.

Altitud. maxim. 14. 29. 8. E b N i. } media 29. $5\frac{5}{29}$
 ——— minim. 28. 29. 0. S S E 2. }
 Dies frigid. 24. 36. S b VV 2. } media $27\frac{25}{29}$
 — fervid. 17. 16. N N VV 1. }

Febres

Febres intermittentes sparsim, tertianæ ac *Hæmitritæ* potissimum; Pleuritides, Peripneumonia; & Anginæ aliquæ. *Variolæ epidemicæ*, interdum valdè malignæ, utpotè *Petechiæ* & *Hæmorrhagia* aliquando stipatæ.

Plena Luna 13°. JULIO. Nova Luna 28°.

Per Initia Mensis Pluvia frequens, parca post
Aer plerumque crassus, Ventusque varius, Malacia interdum; à xvi. ad xxii. spirabat Eurus

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 4. 6. $\frac{1}{8}$. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{11}{22}$. 24. 30
Dig. Dec.

= 1. 3. 24.

Levis Procella 3. p. m. S. w b w 4°.

8 Altitud. maxim. 7. 30. 0. NN VV 1. } media 29. $6\frac{20}{29}$
minim. 3. 29. 2.
Dies frigid. 4. 36. VV N VV 1. } media 29 $\frac{4}{29}$
calid. 20. 22. E 1x.

Variolæ epidemicæ, sanè sunt haud parùm funestæ; sæpe parvæ, atræ, sessiles cum Foveola in Pustularum medio livida aut nigra — interdum crudo diffuunt *Ichore*, qui subjectam Carnem erodit, imò & nonnunquam ipsa Gangræna afficit — Linguae, Faucesque sub Morbi Declinationem sunt valdè squallidæ, ac frequenter scabræ admodum & atræ; accedit porrò sæpissimè *Diarrhæa* profusa; aliquando Tragedia clauditur More peripneumonico: — largissimè tamen plerumque expuunt Ægri, præsertim per Initia. Si quid in his *Variolis* malignis possit Medicina, id utiquè faciunt *Alexipharmaca* subaustera cum aci-

acido plurimo *: *Tinctura* utor sæpissimè *Corticis Peruviani Alexipharmaca* cum multo *Elixire* aut *Spiritu Vitrioli*, sæpe *Vino rubro Gallico* his acidis adjectis, præsertim sub *Febris* Decessu, intereà *Potionem* liberalem, acidulam, demulcentem suadeo atque *Victum* idoneum — Proficiunt hæc interdum maximè, sed utplurimùm atra *Variolas* atra *Mors* sequitur.

Ubi ingruente Morbo *Variolæ* luridæ, lividæ, aut parùm acuminatæ visuntur, *Febrisque* adest lentior, generosa quædam *Cardiaca* exhibenda sunt, *Epispastica* porrò applicari debent, quicquid contrà reclamatione *Sydenhamius*, ejusque *Sequaces* (quos inter, in plurimis, etiam & ego sum) — *Crocus* hic & *Pulv. Contrayerv. C. Moschus* & *The-riaca Androm.* imò & dulce *Vinum* *Locum* habent — Miram sanè *Vim* habet *Moschus* per *Cutim* expellendi, nec tamen intereà calefacit nimium: Si crudæ sunt *Pustulæ*, si prorsus aquosæ, *Myrram* adjicio, cui inest *Coctioni* fovendæ plurimum — Atqui quando turgent *Sanguis*, furit *Febris*, ardent omnia, porrigere talia bacchantis est *Medici*, non *prudentis*, qui *Diis Manibus* devovet *Ægrotos* — utinam non talia vidissem! — Adeo *Nihil* in hoc Morbo perpetuum est, nedùm utiquè in ullo.

Plena Luna 12°. AUGUSTO. Nova Luna 26°.

Incipiente *Augusto* benigna satîs fuit *Tempestas*, ab xi. autem ad *Finem* usque *pluviosa* plerumque & frigida *Vento* mutante subindè; *Initio* *Mensis* *Ros* perplurimus.

Pluvia

* *Essay on Fevers* (Cap. de *Variolis*) P. 151.

Pluvia 1. 3. 11. — 14. ²/₁₅. 16. ^{III}/₁₇. 19. 22.

^{III}/_{Dig. Dec.}

23. 25. 26. 27. 29. 31. = 2. 074.

Procella 17. Nocte S w 4. — 28. w S w 4^x. —

31. primo Mane S w 4.

Fulgur & Tonitru 13. Vesperis.

8 Altitud. maxim. 4. 30. 0. N VV b VV 1. } media 29. ⁶/₂₉
 ——— minim. 18. 29. 1. S VV 3^x.
 Dies frigid. 30. 41. N VV 2.
 — calid. 5. 25. N VV b VV 1. } media 31 ²⁸/₂₉

Plurimæ Variolæ, Febres intermittentes paucissimæ,
 Tussis frequentes, sub Finem Mensis Anginæ
 aliquæ: Nisi à Variolis paucissima Funera.

Plena Luna 10. SEPTEMBRI. Nova Luna 25^o.

Et frigidus fuit & valdè humidus hic Mensis;
 Libs sæpe perfremuit; à xvii. ad xxiv. Vulturnus
 furens, hinc humilis Baroscopii Statio, at Maris
 Æstus tumidi, ac inordinati admodum — xxvi.
 vehemens Procella Mane ESE 4^x. Meridie S S
 E 4. Vesperis S S w 4^x. vastissimos concitavit
 Fluctus atque Maris Æstum immensum, qui
 longè latèque inundavit Littora; multò sanè
 magis quàm fuit visum antehàc unquam*.

Pluvia 1. ^{II}/₃. 4. 5. ^{III}/₆. ^I/₇. ^{III}/₉. ^{II}/₁₀. 11. ^{II}/₁₂. ^I/₁₃.
 Dig. Dec.

15. ^I/₁₇. 18. ^I/₂₀. 21. ^{II}/₂₄. 26. 27. 30. = 4. 470.

Halo amplissimus circa Lunam 8. H. 8 p. m.
 8 Alti-

* Vid. Vol. I. P. 18.

8 Altitud. maxim. 2. 29. 9. VV NVV 2. } media 29. $3\frac{4}{29}$
 ——— minim. 26. 28. 9.
 Dies frigid. 30. 48. N VV 1. }
 — tepid. 9. 34. S S VV 3. } media 39 $\frac{19}{29}$

Variolæ multæ ; jam verò paulò mitiores ;
Morbilli passim : perpauci certè hìc Morbi ; *Co-*
lice tamen , *Rheumatismus* , ac *Tussis* quosdam
 vexant ; *Alvi Fluxus* plurimos.

Plena Luna 9°. OCTOBRI. Nova Luna 23°.

Nimbosa Tempestas hoc Mense & valdè squa-
 lida , Pluvia ferè perpetua , immensa undique Di-
 luvia ; infremuit Libs sæpissimè , intervenit au-
 tem Caurus frequenter , haud rarò Vulturnus , xii.
 ac xiii. Boreas frigidus

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|
| Pluvia | $\frac{1}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{8}$ | 10. | 11. | $\frac{1}{14}$ | 15. |
| | $\frac{1}{19}$ | $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{21}$ | $\frac{1}{22}$ | $\frac{1}{23}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{1}{28}$ | 30. | 31. | |

Dig. Dec.
= 5. 608.

Procella levis 2. S w 4^r. — vehemens admo-
dum 3. Nocte w S w 4^r.

—— 4. a. m. w b. N 4. — 8. Vesperis S w
4^r. — 9. S w 4. — 22. primo Mane w S w 4^r.

Fulgur & Tonitru 3. Nocte — perpetua Fulgu-
ra & Tonitrua Nocte 22. S w 4. — Maximus
Maris Æstus 9°.

8 Altitud. maxim. 13. 30. 2. N E 1. } media 29. $4\frac{2}{5}$
 ——— minim. 4. 28. 6.
 Dies frigid. 13. 60. Gelu. }
 — tepid. 19. 42. S VV b VV 3. } media 48.

Varie.

Variolæ passim; *Tormina* & *Alvi Fluxus* plurimos exercent: oriuntur hæc credo majore ex Parte à *Pomaceo* novello — *Poma* namque ob nimium Madorem citissimè putrescunt, hinc fortè magis ad *Diarrhæam* disponant quàm si firmiora fuerant & generosiore Succo prædita. — *Tussēs* sævæ & creberrimæ, hinc aliquando *Peripneumonia*, aut *Pleuritis* — *Peripneumonix* nothæ quoquè haud sunt raræ. *Febres* putridæ nonnullæ. In Genere tamen multò pauciores sunt *Morbi acuti* quàm quis crederet, habita scilicet *Ratione Tempestatis* infaustæ — frequentes forsan *Procellæ* dirimunt pravæ ac morbosas *Atmosphæræ* *Congestiones*, vehemens veluti *Motus Oceani* *Aquarum Putrescentiæ* obstat.

Plena Luna 9°. *NOVEMBRI*. *Nova Luna* 23°.

Per Initia *Novembris* pluvia *Tempestas* & interdum *nimbosa*, *Corus* sæpe, haud rarò *Africus*: à x. ad xxi. *Aquilo*, subinde *Malacia*, *Libs* dein *furens* ad xxv. *Boreas* pòst & *Apricitas* pulchra.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | $\frac{iii}{2}$ | $\frac{ii}{3}$ | $\frac{i}{4}$ | | | $\frac{iii}{7}$ | $\frac{i}{8}$ | $\frac{ii}{9}$ | | |
| Pluvia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. 13. |
| | $\frac{i}{16}$ | $\frac{iii}{22}$ | $\frac{i}{23}$ | $\frac{i}{24}$ | $\frac{i}{25}$ | Nix & Grando | | 9. | $\frac{i}{17}$ | |
| Dig. Dec. | | | | | | | | | | |

Pluvia nivosa 20. Nocte = 3. 740.

Procella 2. Meridie S w 4°. — 6. Nocte S w 4°. — 22. Nocte S b w 4. *Circius* vehemens 17. — *Acre Gelu* a 17. ad 21.

8 Altitud. maxim. 29. 30. 5. ENE 1. } media 29. $7\frac{6}{28}$
 ——— minim. 23. 28. 7. Sb VV 3x. }

Dies

1744) & Morbis Epidemicis.

127

Dies frigid. 20. 69. E b N 1. } media $56\frac{11}{28}$
— tepid. 7. 44. S VV 1x. }

Pleuriticæ & Peripneumonicæ Febres intermittentes porrò ac *Variolæ* passim; *Rheumatismi* plurimi: Tusses, Dentium Dolores, Faucium, Auriumque, cum Tumore Glandularum, valdè frequentes—Colica quamplurimos infestat, partim à *Pomaceo* novello, partim etiam ab abundante & acriore Bile; Tormina sæpe sunt admodum sæva magno cum Ardore Urinæ.

Plena Luna 8°. DECEMBRI. Nova Luna 22°.

Altam tenuit Stationem *Barometer* hoc Mense; Aer autem fuit plerumque crassus valdè, sæpe perfrigidus, sub Finem multò lenior—incunte Decembri Aquilo persæpe flabat, exeunte Corus atque Libs, Vento interdum omninò silente.

Pluvia $\frac{1}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{1}{10}$. 11. 17. $\frac{1}{20}$. 21. $\frac{11}{22}$. 23.
Dig. Dec.

25. 28. Grando 12. Nix 13. = 1. 394.

Procella 11. p. m. ad mediam Noctem durans
N w b N 4.

AB. 14. H. 9. p. m. N E b N 1. — 24. Vespe.
i N w 2x.

Altitud. maxim. 14. 30. 6. N E 1. } media $30.0\frac{2}{3}$
— minim. 11. 29. 3. }
Dies frigid. 14. 70. valdè rigidum Gelu } media $57\frac{25}{3}$
— tepid. 23. 50. S VV b S 3. }

Morbi colici plurimi, ab Acrimonia Bilis aliqui, plures longè tamen à *Pomaceo* impuro, nec bene defæcato—in his Alvus est plerumque cita,

cita, sæpe accedit *Dysenteria* mucosa, sæpe biliosa, aliquando cruenta.

Tusses innumeræ cum Tumore Faucium Maxillarum, *Parotidum* — *Peripneumonia* passim — *Febris catarrhalis* valdè frequens; solvitur sæpe multa effluente crassa ac ardente Urina.

Gallos inter & Hispanos Captivos sævit admodum *Febris* quædam *catarrhalis* maligna, jugulatque per plurimos: accedunt sæpe *Petechiæ* haud rarò *Parotides*, sæpe *Pustulæ* urentes aquosæ: Dolet Initio maximè Caput, Dorsum, ac Regio Præcordiorum, protinùs supervenit *Phrenitis*, anhelosa *Respiratio*, Tremor, Subsultus brevè Mors.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLIV
Dig. Dec.

= 31.444.

Plena Luna 7^o. JANUARIO. Nova Luna 21^o.

Incipiente Anno altum fuit *Baroscopium*, sæpe *Boreas*, sæpe perflavit frigidus admodum *Vulturnus*, hinc Gelu acre frequenter: post vicissimum Mensis Diem nunc Libs, nunc *Caurus*. Aer erat plerumque maximè humidus præsertim Gelu liquante atque Nive.

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|
| | | | ²¹¹ | ¹¹ | ¹¹ | | | ¹¹ |
| Pluvia | 3. | 4. | 10. | 11. | 12. | 13. | 20. | 21. |
| | ¹¹ | ¹ | ¹² | | ¹¹ | | | |
| 23. | 25. | 27. | 28. | 30. | Nix | 9. | 17. | Grando 2 |
| Dig. Dec. | | | | | | | | |

31. = 2.910.

Gravis procella cum Nive perpetua 9^o. S E

8 Altitud. maxim. 1. 30. 4. N 2. } media 29. 6²³
 ——— minim. 26. 28. 7. S VV 3. }
 Dies

Dies frigid. 9. 69. S E 4. }
 — tepid. 25. 54. S VV 3. } media $61\frac{2}{3}$

Morbi colici adhuc passim; Rheumatismi, Pleuritides ac Peripneumoniæ, & veræ & nothæ, sparsim. Plurimi Faucium, Maxillarum, Parotidum, imò & Capitis sæpe Tumore laborant, accedente Tussi plerumque & Ceryza: Ophthalmiæ frequentes.

Febris catarrhalis maligna jam grassatur maximè, & perplurimos Captivorum mittit ad Inferos; etiam nunc haud rarò Nostrates, qui cum his multum versantur — Plures sæpe diutissimè trahit, sæpiùs autem magis est acuta & More Peripneumoniæ, aut Anginæ suffocantis, jugulat — accedunt sæpe Petechiæ, sæpe Dysenteria cruenta — hæc tamen nec certo Ordine, nec Tempore — Horum multi Gangræna Pedum corripuntur à Frigore forsan & Sordibus.

Plena Luna 5°. FEBRUARIO. Nova Luna 20°.

Frigidus admodum fuit hic Mensis, Borcas persæpè flavit, interdum Vulturnus, Libs rarissimè: Aer siccus semper & tenuis, Gelu subindè asperrimum: præalta erat Medio Februario Barometri Statio.

Pluvia $\frac{6}{5}$. $\frac{1}{9}$. 14. 19. 22. Grando 2. 6. 23.

Dig. Dec.

Nix $\frac{1}{26}$. 28. = 0. 838.

Nix plurima 26. ctsi Ventus erat w S w 3. Therm. 70.

Magna AB. 9. H. 10. Noctis N N E 1. — Levis H. 7. p. m. E N E 2.

* K

8 Alti-

8 Altitud. maxim. 18. 30. 6. E N E 2x. } media 29. $8\frac{23}{28}$
 ——— minim. 5. 29. 2. S E 1x.
 Dies frigid. 25. 75. N E b N 1x. } media 65 $\frac{13}{28}$
 — repid. 15. 58. E S E 2.

Asthma sævissimum plures premit; Tusses, Pleuritides & Peripneumoniæ valdè sunt frequentes; imò & sæpe graves admodum, quippe difficulter & parcè expuitur—Sanguis extractus est perquàm tenax, & crassissimo Glutine obductus, Serum autem viride, aut subflavum, at perliquidum—hoc quoquè in *Rheumatismo* notatur, qui jam haud paucos graviter & diu torquet.

Inter Captivos sævit usque Febris maligna *cæ-tarrhalis*, immensamque Stragem edit; ministrantes Aniculas, imò & quosdam Chirurgos nunc invadit, etiam & occidit.—Sæpe in summo Febris Incremento, sæpe sub Finem, erumpunt Pustulæ aquosæ, urentes, crebrò Papulæ livescentes, interdum luridæ, aut subatræ Maculæ, *Apthæ* frequenter—Nihil horum autem multum juvare videtur, longè magis enim est ex Re Ægrotantium Sputum abundans (modò non sit lividum, saniosum, foetidum, quòd frequenter nimis evenit) blandusque & equaliter diffusus Sudor.—profusum verò extimesco semper, qui sæpe oleosus, mox frigidus, tandem fit lethalis; idque certò certiùs obrepente Horrore—Nil in tali Casu magis est ex Usu quàm Vinum rubrum cum Aromaticis coctum—præcipuè si urget *Diarrhæa*, sive mucosa, sive cruenta: quod frequenter accidit.

Plena Luna 6°. MARTIO. Nova Luna 22°.

Per Initia Martii pluviosa fuit valdè & squallida Tempestas, Aer inde crassus admodum & humidus; spiravit sæpissime Libanotus, Corus, crebrò, Vulturnus interdum.

Pluvia $\frac{III}{4}$ $\frac{I}{5}$ $\frac{I}{6}$ $\frac{I}{7}$ $\frac{III}{8}$ $\frac{III}{9}$ $\frac{II}{10}$ $\frac{II}{11}$ $\frac{II}{13}$ $\frac{II}{15}$ —

17. $\frac{II}{24}$ 25. 27. $\frac{I}{28}$ $\frac{I}{29}$ Grando & Nix $\frac{I}{1}$ 2.
Dig. Dec.

3. = 4. 694.

Procella primo Mane 1. w S w 4. — 9. Nocte S w b S 4^x. — 29. Nocte N w permagnæ Nebulæ à 24. ad 27.

Altitud. maxim. 25. 30. 0. N VV 1. } media 29. $5\frac{2}{3}$
— minim. 10. 29. 1. VV 3.
Dies frigid. 2. 64. S VV b VV 2. Nix. } media $51\frac{4}{30}$
— tepid. 21. 42. N 1.

Tusses valdè frequentes, Tumores Colli, Maxillarum, Capitis undiquè; plurimæ Febriculæ catarrhales — maligna sævit adhuc maximè inter Captivos, necnon inter Nautas nostros. — Pleuritides ac Peripneumonix haud paucæ & veræ & spurix.

Plena Luna 5°. APRILI. Nova Luna 20°.

Pluvius quoquè erat hic Mensis & algidus Corus Initio spirabat, à xiv. ad xxviii. Boreas ferè perpetuus, Pluvia tamen decidente frequenter ea verò valdè frigida.

Pluvia 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
 17. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 28. 29. Grando
 Dig. Dec.

gravis 7. 11. = 3. 9 12.

Circius vehemens tota Nocte 3. — prælargus
 Halo circa Lunam 2. H. 10. Noctis — foetidissi-
 ma Nebula per totam Diem 13. S 1^x. — Glacies
 ubiquè 27. Mane E N E 2.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 1. E N E 2^x. } media 29. 5.
 ——— minim. 21. 28. 8. N 2^x. }
 Dies frigid. 27. 35. }
 — tepid. 14. 40. E 1. } media 48 $\frac{10}{30}$

Rheumatismus passim, *Ischias* solito frequentior,
 eaque certè acerbissima: *Pleuritides* & *Peripneu-*
monia, tam veræ quàm nothæ, haud paucos
 corripunt: *Tusses*, *Tumores Faucium*, atque
Dentium Dolores cum *Gutturis Asperitate* plu-
 rimos: quædam *Febres intermittentes*, inter ju-
 niores *Morbillosæ* & *Scarlatina* aliquæ.

Catarrhalis *Febris* usque grassatur, diu inter-
 dum trahit *Ægrotos*, citò sæpiùs *Cursum* absol-
 vit, sub *Finem* plerumque expuunt largissimè
 lentam fassamque *Pituitam*, crebrò sine ulla
Tussi, cum importuna sæpe *Tussicula*, id porrò
 multo cum *Levamine*; *Urina* est tenuis utpluri-
 mùm, rarò valdè rubra; *Lingua* subalbida, vix
 unquam nigra aut scabra, leve tamen *Delirium*,
 seu *Desipientia* ferè semper adest *Morbi Statu*. —
 Plures etiamnum jugulat *catarrhalis* maligna.

Plena Luna 4°. MAIO. Nova Luna 20°.

Blanda satis Tempestas ineunte Mense, Euro afflante; post Diem autem decimum uda, frigidaque, Libs ferè perpetuus.

Pluvia 2. 11. — 15. $\frac{1}{16}$. 17. $\frac{1}{18}$. 19. $\frac{11}{20}$. — —
Dig. Dec.

31. Grando 16. — 19. a. m. = 1. 732.

Procella 16. primo Mane S w 4^x. Fulgur & Tonitru 19. a. m.

8 Altitud. maxim. 5. 30. 0. E N E 1. } media 29. $4\frac{26}{31}$
— minim. 16. 28. 9.
Dies frigid. 20. 48. VV b N 1x. }
— tepid. 6. 33. E 2. } media 40 $\frac{8}{31}$

Morbilli, ac Febres Scarlatina hic & per Viciniam epidemica, gravis sæpissimè accedit Tussis & Affectio peripneumonica: queis Nil magis occurrat quàm opportuna Sanguinis Missio.

Multæ Febres Catarrhales adhuc, quædam pravæ admodum & diu durantes: Urina plerumque cruda est valdè, subindè quasi lactea, Nihil prorsus deponens per totum Morbum; Lingua est humida utplurimum, at squallida & sublutea; atque expuunt affatim, idque fausto semper Omine — contrà ubi Lingua fit nigra & arida, parcèque prodeunt Sputamina, rarò evadunt; mox enim anhelii, delirantes, tremantes; palpantes facti Fato tandem succumbunt, nisi obstant Vesicatoria, ac Sudor liberalis, qui fanè (nescio unde) jam haud ita facilis erumpit: Alvus etiam fusa largiter Ægrotantibus frequenter succurrit maximè. — Capitis Gravitas & Vertigo

per Initia Febris ferè semper adsunt, leve Delirium verò & Surditas procedente Morbo; toto Decursu Sreatus maximus, etsi Tussis interdum abest omninò. — Usque adeò per Salivæ Ductus molitur Natura Crisin.

Variolæ, Febres *miliæres* & pustulosæ passim; Scabies frequens, *Ophthalmiæ*, necnon Anginæ aliquæ.

Haud infrequens est Peripneumonia quædam notha, quæ diutissimè sæpe perdurat, demùmque instar Febris lentæ *nervosæ* opprimit Ægrotos, etsi Initio haud parùm exarserat — Horum Sanguis extractus tenuis utplurimùm & floridus spectatur, quod mala inter Signa semper est, nec largam hujus Effusionem patiuntur tales sine summo Vitæ Discrimine, quamvis valdè difficilis videatur Spiritus ac magna Pectoris Oppressio: Mirum est utiquè quantum detractò Cruore mox debilitantur* — Sæviit hæc præcipuè per Australes Provinciæ Oras; nec fuit alia forsan quàm *Catarrhalis epidemica* in Pulmones maximè conversa — *Camphora*, *Crocus*, *Lap. Contrayerv.* *Gum. Ammoniac.* *Oximel.* *Scillitic.* cum Sero Sinapino tenuissimo aptissima fuere Remedia; *Vesicatoria* porrò perquàm utilia. — Pustulis sub Finem erumpentibus, ac Sudore, rarò pereunt.

Plena Luna 3^o. JUNIO. Nova Luna 18^o.

Fuit & hic Mensis frigidus admodùm & pluvius, Africo sæpissimè perflante, Coro sæpe, interfuit autem Vulturnus à xxi. ad xxiv. — Aer fuit maxi-

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 225.

maximè crassus ac humidus, tristisque Tempe-
stas; hyemalem potiùs quàm æstivam putares,
adeò omnia sunt uda & squalida: rarò vides Pa-
pilionem, imò vix Muscam; torpent omnia.

Pluvia 1. ¹/₅ 6. ¹/₆ 7. ¹¹/₈ 8. 9. — 13. ¹¹/₁₄ 15. ¹¹/₁₉
Dig. Dec.
22. 23. ¹¹/₂₄ 25. ¹¹/₂₇ 28. = 2. 760.

Tonitru & Fulgura gravissima 22. Nocte in-
ter Horam x. & xii. longè latèque perfremuit
hæc Procella.

Altitud. maxim. 18. 29. 8. VV N VV 1. } media 29. $5\frac{5}{30}$
— minim. 25. 29. 2. S VV 3x. }
Dies frigid. 12. 48. VV N VV 2. }
— calid. 22. 24. S E 2x. } media $37\frac{11}{30}$

Crebri adhuc valdè sunt *Morbilli*, quibus sæpe
etiam Adulti corripuntur: *Rheumatismus*, Tu-
mor Faucium, Angina, Tussis frequens: Fe-
bres intermittentes passim.

Febris putrida maligna jam grassatur multùm,
sæpe cum Pustulis rubellis, sæpe cum *Petechiis* —
enormes interdum *Hæmorrhagiæ* ex Ore, Nari-
bus, Utero accedunt; præcipuè ubi Maculæ præ-
largæ sunt ac lividæ, aut nigræ, aut violaceæ*
— Levis adest Horror Initio, mox Dolor Capitis
& Gravedo cum Vertigine, in plurimis Nausea &
Vomitio; protinùs in omnibus magna Præcordio-
rum Oppressio & Anxietas permolesta, adeò ut
perpetuæ urgeant Vigiliæ, unde certò certius ob-
repat Delirium, tandemque aliquando Veternus.
Urina plerumque est maximè cruda ac tenuis,
rarò aliquid deponens, sub Morbi Finem verò

K 4

inter-

* *Essay on Fevers*. P. 96.

interdum livida quædam aut fursurosa quasi ; nonnunquam etiam nigra prorsus. Lingua, Dentes, Faucesque nigræ, aridæ, squalidæ sunt, ex Ore foedus admodum exspirat Halitus : Pluribus accidit *Diarrhœa* mucosa, aut subnigra, cum Strigmentis interdum sanguinolentis. — Multi diu conflictant Morbo, haud pauci intra Dies octo succumbunt ; nec desunt plures, qui prorsus evadunt.

Maxime sæviit hic Morbus inter Captivos, Nautas atque nostros, multos etiam jam per Viciniam attigit — An ex Contagione, an ab ipsa *Atmosphæra* Constitutione haud certè scio ; parùm namque contagiosus videtur nisi in ipsis *Nosocomiis* : magna utiquè est undique Virium ac Animi Dejectio apud omnes, etiamque sanos.

Plena Luna 20. JULIO. Nova Luna 18.

Jam tandem *Æthas* affulget, Pluviæ parùm nisi ipso Initio & sub Finem Mensis, afflavit plerumque Ventus septentrionalis, australis rarissimè. Sol fuit fervidus sæpe, multò hinc tenuior facta est *Atmosphæra*, & sicciior longè, maximæ subindè Rorationes, interdum Nebulæ lenissimè spirante Vento.

Pluvia $\overset{II}{I}$. 2. 3. 18. 19. $\overset{I}{27}$. $\overset{III}{28}$. = 1. 208. Dig. Dec.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 30. 30. 0. N b VV 2. } \\ \text{minim. 1. 29. 2. S VV b S 2. } \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 30. 30. 0. N b VV 2. } \\ \text{minim. 1. 29. 2. S VV b S 2. } \end{array}} \right\} \text{media } 29. 7 \frac{6}{30}$
 Dies frigid. 30. 36. $\left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Dies frigid. 30. 36. } \\ \text{fervid. 13. 22. N 1. } \end{array}} \right\} \text{media } 28 \frac{12}{30}$
 — fervid. 13. 22. N 1.

Febres quædam intermittentes ; quædam *Petripneumoniæ*, *Ophthalmiæ* plurimæ — *Morbilli* *epide.*

epidemicæ, iique sæpe funesti; Tussis vehemens;
ac hectica Febris, plerumque accedunt, durant
 que diu; sæpe Alvi Fluxus colliquans evane-
 centibus *Morbillis*, haud rarò *Ophthalmia*, An-
 gina, & Ulcera Faucium succedunt, aliquandò
Parotis cum *Erysipelate* Capitis; plus semel
 hoc Mense notavi Faucium & Oris Gangrænam,
 Maxillæ porrò & Vomeris Ossis Cariem, unde
 Mortem miserrimam; post *Morbillos* scilicet.

Febris putrida maligna quæ dudum sæviit;
 dominatur usque, maximè inter Nautas atque
 Captivos; sæpe cum Maculis parvis, obscuris
 vel subatris, cum luridis interdum Papulis per
 totum Corporis habitum; sæpe Pustulæ largæ,
 erodentes erumpunt: Jam insuper magis urget
 Vomitus quàm antehàc, quem *Diarrhæa* gravis
 nox excipit: porrò haud rarò multò magis dif-
 fluunt Sudoribus: adeò tamen parùm hæc ju-
 vare videntur, ut potiùs Vires pessudent pluri-
 mùm — Atqui si Fluxus Alvi citò nimis sistitur,
 Delirium obrepit certissimè, aut Sopor profun-
 dus, cum duro Abdominis Tumore, ac Singul-
 u; quo non aliud magis pestiferum *Symptoma*.
 Omnes ferè Morbi Statu plùs minùsve delirant,
 & surdescunt semper — Quicquid fuit emissum
 sanguinis vel rutilantem & speciosam habuit Fa-
 ciem, aut lividam, aut atram, & Muco viridi
 vel livescente obductum, semperque solutum ni-
 mīs*. — Proximè mihi accedere videtur hæc Fe-
 bris ad Naturam istius malignæ quàm Anno 1740.
 descripsi, adeòque Medicina utor eadem ferè,
 Deo dante, satìs feliciter.

Plena

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 108.

Plena Luna 1^o —

Nova 16.

AUGUSTO. Plena Luna 30^o

A tertio Die Mensis ad decimum septimum Pluvia multa, & triste Cœlum: flavit Initio Vulturus, postea Libs — hinc vero ad Finem usque Apricitas pulchra, longè grata Messoribus maximæ nunc Rorationes; jamque tandem lætè garriunt Cicadæ innumeræ, porro Muscæ, modò quasi reviviscentes, volitant ubiquè, valdè que sunt molestæ.

Pluvia ^{III}4. ^{II}5. ^{II}6. ^{III}8. ^{II}9. ^I10. ^I11. ^I12. ^I13. ^{II}14. ^{III}15.
Dig. Dec.
^I16. 20. 21. 23. = 3. 5 16.

Multa Fulgura & Procella 8. Nocte S S w 4^r
— 9. Mane Procella S w b w 4. — 15. Nocte S S w 4^r. Nebulæ magnæ 24. 27. 28.

8 Altitud. maxim. 28. 30. 0. N N V V 1. } media 29. 5 ⁶/₃₁
— minim. 9. 29. 0. S V V b V V 4. }
Dies frigid. 17. 40. V V b S 3. }
— calid. 3. 25. E S E 1. } media 32 ²³/₃₁

Morbilli frequentes, Variolæ sparsæ, at mitiores: Ophthalmiæ plurimæ, Dysenteria passim. — Sævit adhuc Febris maligna inter Nautas atque Captivos, rarior tamen multò est alibi, nec ita frequenter Petechiis fœdata.

Nova Luna 14^o. SEPTEMBRI. Plena Luna 29^o.

Ineunte Septembri Pluvia frequens, ab octavo autem Die ad vicissimum octavum, nisi decimo sexto, nulla prorsus, Nebulæ interim sæpissimè, & Ro.

745) *de Morbis Epidemicis.* 139
 Rorationes maximæ: Sol fervidus medio
 Mense, at maxima Pruina xx. Ventus ab Orien-
 te spiravit toto ferè Mense, à xx^o. ad xxviii. ve-
 rox admodùm.

Pluvia $\frac{11}{2}$. 3. 4. $\frac{1}{5}$. 7. 8. $\frac{1}{16}$. 28. 29. $\frac{1}{30}$.
 Dig. Dec.

— 1. 078.

Fulgur & Tonitru Mane 2^o. Procella 22. E.
 E 4^o.

Maximus Halo circa Lunam 26. Nocte.

Altitud. maxim. 11. 30. 1. E 1. } media 29. $6\frac{24}{35}$
 ——— minim. 2. 29. 2. S E b E 2. }
 — frigid. 24. 46. E 3. } media $35\frac{8}{35}$
 — calid. 15. 26. E S E 1. }

Variolæ frequentes, *Diarrhææ* & Morbi colici
 assim; aliquæ *Dysenteria* cruentæ. — Plures ad-
 uc Febre putrida, maligna laborant cum ete-
 nis, Delirio, Singultu, &c. — *Asthma* sævissimum
 ultos opprimit; plurimique Tumore Faucium,
 Maxillarum, *Parotidum* vexantur; *Ophthalmiæ*
 ultæ.

Morbilli epidemici etiam inter Adultos, ac plures
 gulant, sæpe More peripneumonico, sæpe lenta
Etica Tabe; haud rarò *Dysenteria* cruenta ac-
 dit, sæpiùs verò enormis mucosa *Diarrhæa*,
 onnumquam accidunt dirissima Oris Ulcera, at-
 què indè Maxillarum Caries.

Nova Luna 14^o. OCTOBRI. Plena Luna 29^o.

Tristis fuit admodùm & maximè pluvius hic
 mensis, vix Dies unus & alter aprius, Aer val-
 crassus & humidus; Corus perflavit Initio,
 st Libs furens sæpissimè, Auster subindè, non
 rò sub Finem Vulturnus.

Pluvia

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{11}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{11}{8}$ $\frac{11}{9}$ $\frac{11}{10}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{11}{15}$
 $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{11}{26}$ $\frac{11}{28}$
 $\frac{11}{29}$ $\frac{11}{30}$ $\frac{11}{31}$ Dig. Dec.
 Grando 3. 22. = 5. 896.

Circius vehemens 1°. Mane. Procella 5°. Mane
 S 4. — 8. S w 4^r. p. m. Iris vivida lunaris 1. H. 7^r.
 p. m.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 2. E 1. } media 29. $3\frac{25}{29}$
 ——— minim. 5. 28. 7. S 4. }
 Dies frigid. 30. 54. S S E 2x. } media 46 $\frac{11}{29}$
 — tepid. 11. 38. S S VV 2. }

Morbilli adhuc plurimi: Variolæ epidemicæ &
 Morbi colici & Rheumatismi passim Ophthalmiæ
 multæ: quidam Peripneumonia notha laborant,
 aliqui Apoplexia perculsi sunt. Tusses, Coryzæ,
 Gravedines, ac Febriculæ catarrhales permultæ;
 Febres lentæ & nervosæ haud raræ.

Nova Luna 12°. NOVEMBRI. Plena Luna 28°.

Venit ab Oriente Ventus ad Diem xiv. ad Sep-
 tentrionem vergens plerumque, tunc Aquilo, mox
 Auster furens Pluviam demisit plurimam, paulò
 tamen post rursùm frigidus Aquilo; ad ipsum
 Finem Libs. Atmosphæra fuit ut plurimùm geli-
 da, crassa admodùm ac humida.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{11}{14}$ $\frac{11}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$
 $\frac{11}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{30}$ Nix 15. 16. = 3. 522.
 Dig. Dec.

Fulgura multa sine Tonitru 1. Nocte S E 1^x
 Procella 18. S b w 4. — 19. p. m. S w 4^x. Cir-
 cius

745) *de Morbis Epidemicis.* 141
 us vehemens 19. Nocte. Subitus admodum &
 maximus *Baroscopii* Descensus 18. a 29. 7. scili-
 et ad 28. 8. intra sex vel octo Horas. Gelu ri-
 dum 16. 17. 21. 25. Densissima & valdè foeti-
 Nebula 23. p. m.

Altitud. maxim. 6. 30. 3. E N E 1x. } media 29. $7\frac{2}{3}$
 ——— minim. 19. 28. 7. N VV 4x. }
 ——— frigid. 16. 71. N b VV 1. } media 57 $\frac{16}{30}$
 ——— tepid. 1. 46. S E 1x. }

Variola undiquè *epidemicæ* ; jamque quædam
 malæ admodum sunt Indolis; utcunque per to-
 tum Autumnum fuerant benignæ . *Ophthalmiæ*
 purimæ, ac *Epiphoræ* pertinaces admodum. Pleu-
 ritides aliquæ & *Peripneumoniæ*.

Ineunte Mense Febris quædam *catarrhalis* re-
 currit, seu potius ingruit; vehemens Dolor Ca-
 pitis atque Pectoris Oppressio urgent , Nausea
 perpetua ac Vomitio pituitosa, Pulsus valdè ve-
 x, at mollis, rarò tensus; Lingua sordida, fu-
 cinea, vix unquam *arida* ; Urina turbida ad-
 modum pallidam , at flavescentem , prælargam,
 per totum Morbi Decursum, deponens Subsiden-
 tiam . Expuunt omnes largissimè.—Sanguis ra-
 tissimè valdè tenax est, interdum verò nonnihil
 glutinosus , omnes Vertigine & Somnolentia ni-
 tia laborant . Quosdam *Diarrhæa* lenis liberat ;
 quosdam Sudor blandus æqualis , plures liberri-
 ma Sputamina maximè secta prius Vena & pro-
 statata Vomitione ; ubi nimirum Artis est Subsidi-
 um adhibere Naturæ.

Nova Luna 12°. *DECEMBRI*. *Plena Luna* 27°.

Incipiente *Decembri* flavit Boreas, consequente frigida & sicca Tempestate: ab xi. ad xv. pluvius Vulturnus, paulòque pòst turbidus Auster; sub Finem Mensis Eurus: Aer fuit crassus valdè, & medio Mense humidus maximè.

Pluvia 1. 11. 12. ⁱⁱⁱ13. ⁱⁱⁱ14. 15. ⁱ16. 17. 19.
ⁱⁱⁱ20. ⁱ21. 22. ⁱ23. — 25. 26. ⁱⁱ30. = 3. 4 10.
 Dig. Dec.

Procella 13. p. m. S E b S 4^x. — 19. tota No-
 cte S 4. — 20. Mane S w 4.

———— 23. Nocte S w 4. — 24. tota ferè Die
 S w b w 4.

⌘ Altitud. maxim. 2. 30. 4. E N E 1^x. } media 29. 5 ²/₃
 ———— minim. 14. 29. 0. S S E 3^x. }
 Dies frigid. 7. 70. N E 2^x. } media 59 ²³/₃₀
 — tepid. 19. 50. S 4. }

Tussis vehemens, *Asthmatica*, frequens; *Vario-*
la maximè *epidemicæ* longè latèque; quædam
 confluentes sunt, parvæ, sessiles, nigræ, quædam
 tamen valdè benignæ. — Febriculæ pustulosæ
 (*the Chicken and Swines Pox*) plurimæ inter Pue-
 ros: Pustulas has subrubras & aquosas pro Va-
 riolis sæpe agnoscunt Mulierculæ (nam & Vesti-
 gia crebrò diù relinquunt) haud rarò tamen pau-
 lò pòst tristi Eventu vident Errorem, dum Va-
 riolæ, cæque malignæ, reverà invadunt.

Jam increbescunt valdè Febres peripneumoni-
 cæ, periculosæ quidem & haud rarò lethales.
 Aliqui parùm aut nil expuunt plures biliosa ad-
 modùm sincera & perliquida aut spumosa &
 mini-

minimè cocta, nonnulli Saniem ferè subatram :
phelant maximè & summa Pectoris Gravitate
remuntur — Majus mihi videtur impendere Pe-
culum Peripneumonicis ubi permagna urget
ectoris Oppressio, & grave quoddam Præcor-
orum Pondus, etsi levis tantùm & obtusus ad-
Dolor, quàm si Pectore, aut Latere magis a-
tè torquentur: hìc enim Sanguinis Missio cer-
m plerumque adfert Levamen: in priore Casu,
a sæpe non juvat ut etiam haud parùm sit no-
a. Jam utiquè plures occurrunt Peripneumo-
æ, ubi immensa est Pectoris Gravitas, & Spi-
ndi Difficultas magna, & Tussis haud levis, &
ultus in Pulmone Strepitus, quæ vix tamen ad-
ittunt Venæ Sectionem* — Sperares forsan ma-
um à repetita Sanguinis Missione Auxilium, ac-
dit è contra Debilitas maxima, Sputi Suppres-
o, Anxiety gravissima, Vigiliæ perpetuæ, mœx
elirium, Tremores, frigidi Sudores, tandem-
e nimis frequenter Mors inopinata; sæpe e-
am inter Gemitus & Colloquia. — Atqui hunc
anguinem inspicere diligenter; nimiùm semper
paret solutus, quamvis floridus plerumque,
speciosus, & diu Seri tenax: aspice altera Vice
tractum Cruorem, Crassamentum lividum vi-
s, & laxum maximè, plurimo fulvo, turbido
ut subviridi, aut subrubicundo innatans Sero:
rtia, nigrum ferè & saniosum, vix ullo Modo
phærens — Pessimi hoc semper Ominis notavi in
eripneumonia, & plerumque lethale*.
Sunt autem & nunc multi *Pleuroperipneumonia*
borantes, præsertim Ruricolæ, quibus Dolor
est

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 108. 211.

est Pectoris aut Lateris vehemens, Tussis violenta, Spiritus ex Ore fervens, interruptus, difficilissimus, Pulsus plenus, durus, atque velox, rubicunda ac turgida Facies — Postulant hæc citam & largam Sanguinis Missionem, imò & repetitam, unde mox relevantur plurimum — Horum autem Sanguis densus admodum & viscosus est ac dum frigescit Pellicula obductus albida, & coriacea quasi — Porro Sanguine misso, Diluentia subacida, nitrosa, & quæ Sputo movendæ sunt, Morbum ut plurimum brevi solvunt.

At prior Peripneumonix Species, hoc Mense hic magis sæviebat, in qua Urina plerumque Initio erat cruda prorsus, sæpe tenuis, subindè autem quasi lactea, sub Finem verò parca, turbida, subnigra. Lingua atro veluti Mucos oblita vel ficca admodum & prærubra, Colore Corticis Granati æmula, sæpe tamen glabra valdè livescens, & splendida quasi, at aridissima, cum Bulla nigra interdum ad Lingux Apicem — Pestifera hæc & funesta sunt; potissimum si saniosa nigra, & valdè foetida Sputamina ejiciuntur.

Res est herclè non levis Momenti duas hæc Peripneumonix Species probè distinguere, maxime per Initia Morbi; cum & ingens Pectoris Oppressio & Spirandi Difficultas, Febris Ardor & Sævitia Tussis, utramque comitentur, & æque postulare videantur Sanguinis Missionem. Prior attamen, & jam frequentior, Peripneumonia vix quartam Sanguinis Partem adimi patitur sine summa Virium Ruina, quam posterior & fert facilè, imò & sæpissimè poscit. — Unde igitur petenda Distinctio est?

Si Pulsus celer valdè, exilis & contractus est aut mollis, inæqualis & vacillans, si Anima du-

citur

citur laboriosè & cùm frequente Suspirio, potiùs quàm cum Anhelatione æstuante, si urget magis Pectoris Gravitas quàm Dolor, si Urina cruda est, tenuis, & vapida, si profusi aut inæquales, frigiduli Sudores erumpunt, si Languor magnus & Manus tremulæ, cautissimè profectò mittendus est Sanguis & perparcè; si modò liceat omninò secare Venam. At si frigefactus Cruor nimis apparet solutus, & parùm firmè cohærens, utcunque floridus sit, protinùs siste Manum, ni jugulare vis ægrotantem. Si de mittendo Sanguine dubitas, an scilicet conveniat necne, hoc certè cognosces. Signo; nunquam igitur dubio in Casu, prima Vice, esto Laticis vitalis prodigus; qui sæpe corrigendus est utiquè, non profundendus: — At si plenus, velox,ensus, aut durus Pulsus validè vibrat, ardetque Febris, si fervidus expirat Spiritus atque densus, si Pectus dolet admodùm, rubetque Vultus & turgēt, mittendus semper est Sanguis pleno & Flumine & Modo: etiam bis, terve, repetenda est Venæ Sectio si urget usque spirandi Difficultas atque Dolor, maximè si extracto Cruori inhæret Crusta subflava & glutinosa valdè.

Nunc grassatur plurimùm Febris quædam putrida, diu admodùm sæpe detinens Ægrotos, multisque certè lethalis: haud rarò ad vicesimum Diem, imò aliquando ad tricesimum usque protenditur.

Levis Rigor Initio totum pererrat Corpus, subito mox Calore incertoque exceptus; sic Vicibus alternis: Lassitudo insuper & vagus Dolor omnia fatigat Membra; nunquam non protinùs accedit Capitis Dolor, sæpe acutus admodùm in Fronte, in Temporibus, in Sincipite,
* I. inter.

interdum in imis Oculis : Pulsus intereà celer , tremulus, inæqualis est, etiam & haud rarò intermittens planè , ac fortiore Digiti Pressu interruptus prorsùs.— Urina verò tenuis est ac mera quasi Vappa, aut Jumentorum instar turbida*, sed nihil omninò deponens*—haud multùm inarescit Lingua , nec sitiunt valdè, sordescunt tamen semper Fauces—Vomitùs interim biliosus, viridis, aut fuscus urget vehementer, sæpe haud Parùm foetidus; Anxietas enormis, Jactatio perpetua, ac Pervigilium contumax, semper, accedente Morbi Statu, Delirium inferunt & Tremores, Tendinumque Subsultus: Sub Finem Lingua Labiaque tremula fiunt, nigra & aridissima, Dentes atrii & sordidissimi. Singultus, Oculi vitrei, Sudores frigidi, Ungues lividi, Pulsusque deficiens, instantem denunciant Mortem; licèt interdum stupidi sine Sensu, Motu, aut Loquela jacent per Dies aliquot integros priusquam extremam agunt Animam, Coxis intereà Natibusque Necrosi affectis.

Hoc modo huic Febri succumbunt multi; at sæpiùs multò magis effera sævit—Premittit ipso Morbi *Insultu* Anxietas, & Præcordiorum Pondus immane, acerbissimus Capitis atque Dorsi Dolor, Vomitus perpetua, viridis, atra, horrenda, Singultus continuus, nigrescit Lingua, Dentesque protinùs, furit mox Phrenitis, toto Corpore tremunt, tandemque frequenter *Caro* premuntur, nec evigilant unquam—Sextum inter Diem ut plurimùm & nonum erumpunt *Petachia*, sæpe lividæ, sæpe etiam aterrimæ, quæ interdum repen-

* Οὖρον ἀνατεταραλμένον, οἷον ὑποζυγίου. Aph. 70. Sect. 4. Vide *Holler.* in Aphorismum.

repentè evanescunt, profuso fluente Sudore, vel *Diarrhœa*; quibus *Ægri* sæpissimè laborant. Crebrò Sanguinem stillant Nares, aliquando profundunt, unde Delirium sæpe mitescit; sed indè Vi-res deprimuntur maximè — quod idem de Fluxu Alvi dicendum est, qui multò sæpius accidit — Citiùs equidem tardiùsve semper ferè, durante Febre, per Alvum molita est Natura *Crisis*, at frequenter nimis Morbus tantùm Morti cessit; haud rarò autem successit Victrix Natura — Si Dejectiones nigræ, perliquidæ, aut saniosæ sunt, & maximæ foetidæ, utiquè nihil spero; præcipuè si absque Voluntate descendunt: nec multò sanè melioris est Ominis inflatum atque durum Abdomen, perdurante Ventris Cursu, præsertim si singultus advenit, & perpauca redditur Urina: quam subatram penè notavi, imò & nonnunquam lanè nigram.

Hanc habes hujus Febris Historiam, Lector; quam sive *scorbuticam*, sive malignam, sive pestilentem dices, nihil moror; est sanè valdè furens, atque haud pauca prodit magnæ Putrescentiæ, etiam & Contagii, Signa. Quicquid est, erparcam, si modò ullam, admittit Sanguinis Dejectionem, ex majore Vena saltem, sine stupen-
Virium Jactura — Vomitum autem plerumque moveo, seu promoveo potiùs: quia Sponte ferè regit semper; Alvumque *Clysmate* duco, si sit stricta. Mitioribus postea utor *Alexipharmacis*, que subausteris, & Acido imbutis, inter quæ & meliora, nedum tutiora, probo quàm Vinum cum rubrum cum Aquæ fermè Dimidio, in quo porrò Macis & Cinnamomi paululum sit coctum, adjecto Malo *Aurantio* Hispalensi toto, ac deinde contuso & infuso: jucundus admo-

dùm est hic Potus & Morbo percommodus. Si vis alia, *Tinct. Rosar. Decoct. Lusitan.* cum *Aq. Cinnamon.* & *Sp. Lavend. C.* paululo, Serum & Lactis vinosum tenuissimum, Locum habent: nec sufficientibus, atque avidè desiderantibus, nego subindè Vinum *Pomaceum* subtepidum: Sales *Alcalinos volatiles* & *Spiritus*, ut dicuntur, respuo prorsùs*, nisi cum *Salinis* utor *Haustibus*. Hæc, vel similia, præcipio ad Febris usque Statum; intereà verò si vehemens sit Infania, Cucurbitulas scarificatas Humeris Cervicibusque applicari jubeo, sæpe deinde *Epispastica*, maximè si Languor opprimit. Blanda porrò *Eccoprotica* exhibeo tertiis quartisque Diebus, si Alvus est dura nimis — in ipsa Febris *Apex* parùm certè moveo, perspicuens diligenter quid Natura faciat, aut ferat.

Si perficca Cutis est & aspera, *Camphoram* cum *Theriac.* aut *Mithridat.* necnon *Haust. salinos volatiles*, aut *Julap. Camphorat.* cum *Aceto*, *Sp. Lavend. C.* & *Syrupo Crocino* præscribo; idque ut plurimum bonis Avibus si blandi Sudores erumpunt, & floridæ Pustulæ urentes — Si parùm hæc proficiunt alia tentanda est Via, per Alvum nempe ac Urinam; adeòque *Rhabarbari* paululùm cum *Sale Succino* & *Nuce Myristica* alternis saltem Diebus ministro, aut *Mannam Calabrinam*, *Crema* *Tartari* & *Tartar. solubil.* — Si liquidus nimium sit Venter, compesco Fluxum paulatim *Tinct. Rosar. Decoct. alb. Confect. Fracastor.* fortiter *Opiata* suadeo rarissimè; si *Theriacam* excipias — Jam summa mihi Cura est sustentandæ Naturæ molli restaurante Victu, & Medicina idonea; *Panatellam*, Juscula leniora, Panem bisco-

tum

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 118.

Dies frigid. 31. 70. N E 1. } = $59\frac{8}{28}$
 — tepid. 25. 50.

Variolæ adhuc *epidemicæ*, plerumque autem satis benignæ; inter Nautas tamen & Milites haud paucos occidunt: An quòd à pravo Victu & pessima *Spirituum Ardentium* Ingluvie horum Sanguis sit magis acris & putridus? an quòd à *Scorbutica* Lue, imò &c. sæpissimè *venerea*, polluitur? — Hoc sanè perpetuum est, quòd omnis *Febris epidemica* magis est inter hos pestifera quàm vel Oppidanos inter aut Ruricolos. Faucium Tumores, & Tusse undiquè, *Morbilli* plures & *Rheumatismi*.

Febri putrida, *nervosa*, maligna usque grassatur, pluresque opprimit, atque multos diu admodum trahit.

Peripneumoniæ multæ mali admodum Moris cum Spirandi Difficultate & Anxietate maxima, Dolore in imo Pectoris, atque Tussicula perpetua, perpauca sæpe exantlante, sæpe saniosa prorsus. Hæ post tres, quatuorve Dies in malignam *nervosam*, aut *petechialem* degenerant, Viresque summoperè deprimunt — Vix Sanguinis Missionem adeò admittunt, multò minus repetitam aut largam*.

Nova Luna 9°. FEBRUARIO. Plena Luna 24°.

Boreas perflavit sæpissimè durante *Februario*, Aeremque fecit ficcum & valdè rigidum, acri admodum sæviante Gelu; altam intereà tenuit Stationem *Barometer* — interdum verò Libs procello-

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 184. — 186.

1746). & Morbis Epidemicis. 151
 cellosus Mercurium depressit maximè, multamque demisit Pluviam.

Pluvia $\frac{1}{7}$. $\frac{11}{8}$. 15. $\frac{11}{17}$. $\frac{11}{18}$. $\frac{11}{19}$. $\frac{11}{20}$. 21. $\frac{1}{24}$.

26. 27. Nix multa $\frac{1}{14}$. — 28. Grando gravis 18.

Dig. Dec.

Nocte = 2. 680.

Procella 18. Nocte S w b w 4^r. AB. 9. H. 8. N E 1. — 27. N E 2^r.

Altitud. maxim. 2. 30. 6. E N E 1. }
 ——— minim. 20. 28. 4. S V V b V V 3^r. } media 29. 7 $\frac{27}{28}$
 Dies frigid. 13. 76. N N E 2. }
 — tepid. 26. 52. N V V 1. } media 64.

Plurimæ adhuc *Variolæ*, ut plurimum mitiores, Nautis tamen, Militibus, atque Captivis adhuc valdè funestæ, qui quidem evadunt, Furunculis & Ulceribus maximè vexantur, sæpe *hectica* Febre.

Tussis sævissima, *Asthma* pertinax, Anginæ, Fauciumque Tumores permultos cruciant. — *Rheumatismi*, Pleuritides, ac *Pleuroperipneumoniæ* sunt valdè frequentes.

Dominatur usque Febris quædam peripneumonica, pestilens admodum, pluresque opprimit: magna semper adest Pectoris Oppressio & Præcordiorum, vehemens plerumque accedit Capitis Dolor, vel ipso Initio cum gravi Vertigine, cui mox Delirium: tenuia, cruda, spumosa sæpe expuunt, interdum biliosa valdè, satis liberaliter, at parum aut Nil plerumque juvantia, aliquando foeda, subnigra, & saniosa — intereà haud multum urgere Febris videtur, aut Sitis, nec est Lingua admodum sicca, Muco attamen subatro.

frequentè perfusa. Si, adveniente Morbi Statu, Urina (fulva priùs & turbida) derepentè tenuis mingitur & aquosa, sequitur mox semper Delirium, brevique pòst crebrò Singultus, atque lethalis Nervorum Distentio — Haud rarò hanc Febrem solvit *Diarrhœa critica*, utcunque in aliis Pulmonariis sit pertimescendus (nimius saltem) Alvi Fluxus. Læti plerumque etiam est Ominis Pustularum & Ulcusculorum Eruptio circa Labia, licèt molesta est admodùm — Papulæ porrò rubræ, urentes per totum ferè Corpus, olido succedentes Sudori, Morbum, præcipuè sub Declinationem, prorsùs judicant tota ferè pòst desquamante Cuticula* — Hoc adeò notans Judicium, quibusdam *Vesicatoria* a Capite penè ad Calcem usque applicari jussi; verùm enim verò Opinione minus jam successit Experimentum.

Nova Luna 11°. MARTIO. Plena Luna 26°

Prior Martii pars fuit sicca valdè & frigida; Borea flante cum rigido sæpe Gelu; a xii. ad xxi. Vulturnus plerumque, Pluvia frequenter cadente, Libs interdum; ad Finem recurrit Boreas.

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|---------|
| | | [•] | ¹ | ^{III} | | | ^{II} | ^{II} | |
| Pluvia | 6. | 7. | 14. | 16. | 17. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| ^{II} | ^{II} | ¹ | ¹ | ¹ | | | ^{II} | | |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 29. | 30. | 31. | Nix | 8. | 10. 11. |
| Dig. Dec. | | | | | | | | | |

= 3. 072.

AB. 14. Vesperis & Noctè w N w 1. Peramplus Halo circa Lunam 15. Vesperis w S w 1^x maxima Nebula Mane, Vento silente.

8 Alti-

Altitud. maxim. 3. 30. 5. N E 1. }
 ——— minim. 23. 28. 8. S S VV 3. } media 29. 5 $\frac{27}{3}$
 ——— frigid. 1. 69. N E b E 1. }
 ——— tepid. 18. 48. S E b E 2. } media 56 $\frac{2}{3}$

Variola Sporadica; *Morbilli* jam iterum sunt valde frequentes, sæpe etiam malæ prorsus Naturæ; quippe qui, haud facilè erumpentes, luridi sunt, aut lividi, quibus semper accedit Tussis gravissima, interdum Peripneumonia gravis, aliquando Tormina dira — Tusses, laboriosæ admodum, creberrimæ; Angina & *Asthma* frequens valdè. Plures Sanguinis Sputo corripuntur: Tardi & Pulmonarii jam pessimè se habent.

Ubiquè nunc sæviunt Peripneumoniæ & *Pleuris*. Peripneumoniæ, æque sæpe valdè periculosæ: sunt qui nihil omninò expuunt aut difficillimè, sunt qui cruda & tenuia, parùm aut nil juvantia, sunt etiam qui saniosa prorsus ac valdè olida: qui verò cocta, liberalia Sputa, pauxillo Sanguine tincta extussiunt facilè, intra perpaucos dies Morbo liberantur — atqui priora mali semper sunt Ominis, nec Pectus, nec Præcordia: nam Oppressionem, nec Anxietatem levant, nec febrem — Sed mox ab Initio ferè delirant, aut enormi debilitante Alvi Fluxu corripiuntur; qui mox omninò Sputa supprimit, pessimo semper Eventu — at longè melioris Tessera datur: Urina copiosa, turbida, plurimùm sub gravi Sedimenti deponens; cruda verò & aquosa est admodum perniciofa, prærubra autem & parca Nihil Boni denunciat* — Quibus, ingruente Morbo, Sanguis extractus est, eique supersternitur Pel-

Pellicula tenax, pallidè flavescent, citò plerumque revelantur; contrà verò ubi solutior est debito Cruor, ac vel rutilans valdè, vel lividus* — Pluribus erumpunt Pustulæ magnæ, urentes, præcipuè circa Labia; frequenter etiam per Humeros, Brachia Cruraque; idque ferè semper bonis cum Ægroti Rebus.

Nova Luna 9°. APRILI. Plena Luna 24°.

Initio *Aprilis* frigida Tempestas & sicca Euro spirante, Die quarto rigidum Gelu; post septimum Ventus inconstans, plerumque tamen Vulturus flavit, aut Aquilo; à xix. ad xxii. Auster nimbosus; maximæ Nebulæ exeunte Mense.

Pluvia $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{7}$. 8. 11. 16. 17. $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{21}$.
Dig. Dec.
22. 24. 26. = 1. 960.

Procella 19. Nocte S S E 4^r. — 20. a. m. S 4^r.
gravis autem media Nocte S 4^r.

8 Altitud. maxim. 27. 30. 2. N b E 1. } media 29. $5\frac{28}{29}$
— minim. 20. 28. 9. S 4.
Dies frigid. 4. 62. E b N 1. } media 48 $\frac{18}{29}$
— tepid. 29. 36. VV N VV 1.

Variolæ plurimæ, Morbilli epidemici; Morbilli decedentibus sæpiùs accedit sævissima Tussis & Affectio peripneumonica, haud rarò Hamoptoe, interdum Diarrhœa profusa & obstinata valdè multos hinc enecant Pueros, imò & nonnunquam Adultos.

Angi-

* *Essay on Fevers*, P. 186.

Angina frequens valdè, necnon Pleuritis, Pneumoniæ veræ; & Pleuropneumonia permul-
 e, cæque sanæ haud rarò lethales, maximè cum
 Angina subitò in *Pulmoniam* mutatur — est etiam
 jam passim insolita quædam Pleuritis (si sit ita
 ominanda) ubi inter Scutula operta acerrimus
 evit Dolor, qui ad Sternum * usque protendi-
 ur, maxima cum Gravitate Pectoris & Spirandi
 labore, interdum & per totam Dorfi Spinam &
 Hypochondrium immaniter cruciat, adeò ut vix
 respirare aut tussire valeant, imò omni Molimine
 Tussim aliquando suppressere nituntur ob Dolo-
 ris Vehementiam; volunt se subindè in Lecto esse
 rectos, mox vero ejulantes, impatientes, atque
 rorsus impotentes recumbunt; urget adeò Ja-
 catio perpetua, Anxietas horrenda, Tormentum
 intollerabile, Verbo *Hippocratico*, *Δυσφορία* gra-
 vissima; continua vexantur Tussicula, at parùm
 ut Nil expuunt, vel spumosa & cruda penitus;
 accedit interdum Singultus, quem paulò pòst se-
 quitur inæqualis, frigidus, oleosus Sudor, brevì-
 ue Mors. Est profectò acutissima Febris, &
 intra perpaucos Dies jugulat: robustum queni-
 am Juvenem quarto Die inter tussendum vio-
 lenta Nervorum Distensione correptum atque
 breptum novi. — Estne Morbus, quem *Hippo-
 crates* πλευρίτιν ἐν ῥῶτῳ, seu ρωτιάδα † vocat, Inflam-
 mationem nempè vel *Diaphragmatis*, vel *Media-*
stini

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 239. † Sic describitur, Lib. 2.
 de Morb. Sect. 54. Edit. *Linden*. Ρίγος ἢ πυρετός ἢ βίξις ἢ
 ἰσπνοία λαμβάνει — πόνει μάλιστα τὸ μετὰ φρενον ἢ τοὺς
 βουβῶνας — rursum Lib. 3. Sect. 21. τὸν ῥῶτον ὀδυνᾶται ὡς
 ληγῆς ἢ τένει ἢ ἀναπνεῖ ἄθρόον — Ὀδύναι δὲ ὀξείαι διὰ τῆς
 ἀχίος ἐς τὸ στῆθος ἢ εἰς τὸν βουβῶνα τείνουσι.

Lini — Vox *Paraphrenitis*, qua denotatur inter Recentiores Inflammatio *Diaphragmatis*, nusquam apud *Hippocratem* legitur.

Summum hic Præsidium est in opportuna Sanguinis Missione, Nitrum mox & *Sperma Ceti* cum *Camphoræ* paululo opitulantur; porro *Oleum Lini recens*, sive *Amygdalinum* cum *Elixire Asthmatico* & *Diacodio*, post *Venæ Sectionem* admodum juvare videtur, ad relaxanda nimirum Vascula nimis constricta, & ad Dolorem sedandum — Quibus autem *Pleuriticis*, aut *Peripneumoniacis*, Sputa copiosa, subflava, & modico Sanguine tincta ejiciuntur facile, in Vado brevi sunt, idque sæpe intra perpaucos Dies — Horum sanè vix aliquis perit — Non ita tamen si cruda, tenuia, spumosa, aut merè sanguinea, aut saniosa, aut atra, extussuntur: Hi namque Perpetua vexati Tussi parum, aut Nil levantur, tandemque vix undecim elapsis Diebus Morbo succumbunt, vel purulenti fiunt & tabidi Pedum Tumores aquosi, Febricula sub Noctem, Tussicula sicca & Spiritus difficilis, hoc denunciant, quæ profectò jam post Febres pulmonarias, multò sunt frequentiora solito.

Alia igitur atque alia in Morbis, nunc Vulgaribus, tractandis, datur Erroris Ansa; plures enim ab ipso Febrium Initio profusis Sudoribus corripuntur, alii *Diarrhæa* serosa prælarga — crederes hæc forsan Morbi Solutionem — minimè verò; quid quòd, exhausta liquidiore Sanguinis Parte, restant Humores magis crassi, confusi, acres — Fateor me nuperrimè vidisse duas, tresve Febres *Mesentericas* (ut cum *Baglivio* loquar) per Alvi Fluxum judicatas, sed erat sub *Diaphragmate* Tensio, Dolor, Gravitas; perperam verò pro Peri.

Peripneumonicis epidemicis habitæ fuerunt; atque in harum una curanda mirabatur maximè Chirurgo Pharmacopæus me Potionem Catharticam imperasse, omissa Venæ Sectione; at id ego satis feliciter.

Summa porrò Opus est Cautela in Pulmonaria quadam notha medenda, quæ jam etiam subindè occurrit; ita lento incedit Pede, ita parùm Doloris urget, dum maxima interim adest Oppressio, ut vix de Ægitudine querantur priusquàm de Ægrotis actum est penitus, quos servassent ex facili matura Auxilia, scilicet *Epispastica* frequentia, lenis Alvi Ductio, & *Emetica* blanda, Diuentia insuper idonea, ac Detergentia modica; hæc inter Serum Lactis *Sinapinum* primum fortasse obtinet Locum — Adjiciam verò & hoc obiter, quod perrarò Sanguis in hoc Morbo, nisi Cucurbitulis scarificatis, atque ipso Initio, detrahatur commodè.

Nova Luna 9°. MAIO. Plena Luna 23°.

Incipiente Mense perpulchra & valdè calida Tempestas, post autem frigidior, aliqua cadente Pluvia: ab undecimo ad decimum octavum secundum rursus & fervidum Cælum, aspirante Subsolanio, maximæ interim Rorationes — inde verò Pluvia frequens ad Finem usque, Africo flante à xxvi. ad xxxi.

Pluvia 4. 5. 7. 12. 17. 19. 20. 21. 25. 27.
 1. 4. Dig. Dec.
 29. 30. 31. = 1. 760.

Fulgur sine Tonitru 16. 17. Nocte — Fulgur
 & To.

& Tonitru 19. p. m. Fulgura ac Tonitrua sæva
25. p. m.

8 Altitud. maxim. 5. 29. 9. N VV b N 1. } media 29. $4\frac{25}{29}$
 ——— minim. 31. 29. 0. S VV 2.
 Dies frigid. 6. 43. S E b E 2. }
 — fervid. 15. 19. N N E 1. } media 30 $\frac{24}{29}$

Variolæ epidemicæ, *Morbilli* plurimi — Febres
aliquæ biliosæ, valdè periculosæ; scædatur inter-
dum Facies etiam in Peripneumonicis — *Dysente-*
ria frequens, imò & aliquando cruenta, Pleuri-
tides & Peripneumoniæ multæ adhuc, at jam
bene instituta Sanguinis Missio, Sputaque sub-
cruenta aut subflava brevè Morbum solvunt.
Arthritides sævæ, & pertinaces admodum etiam
hac Tempestate — Plures à *Phthisi* pulmonaria
pereunt.

Nova Luna 8°. *JUNIO*. *Plena Luna* 22°.

Per Initia Mensis pluviosa valdè & frigida
Tempestas, ab octavo autem ad decimum quin-
tum Apricitas, Cauro spirante aut Aquilone;
indè ad Finem usque horrida, squalida, frigida
Tempestas, algido Libanoto ferè semper furen-
te, qui *Atmosphæram* fecit crassam valdè & ma-
ximè humidam.

Pluvia $\frac{i}{1}$. 2. $\frac{ii}{3}$. $\frac{ii}{4}$. $\frac{iii}{5}$. 6. 7. 16. $\frac{iii}{18}$. 19.
 Dig. Dec.
 $\frac{ii}{20}$. $\frac{ii}{21}$. 24. 25. $\frac{ii}{26}$. 27. 28. 30. = 3. 070.
 Procella 4. 5. S w 4^x. — 25. Nocte S S w 4^x

8 Altitud. maxim. 11. 29. 8. N 1. } media 29. 5.
 ——— minim. 4. 18. 8. S VV 4^x. }
 Dies

Dies frigid. 7. 42. S VV b VV 2. }
 — calid. 15. 26. Malacia. } $34\frac{8}{25}$

Morbilli usque valdè frequentes, sed jam multo magis eminentes ac pustulosi sunt quam neunte Vere, nihilominus tamen sævissima *Tus.* is, interdum *Peripneumonia* vehemens, hostiam comitatur.

Variolæ quoque plurimæ, eæ autem benignæ sunt ut plurimum, utcunque exitiales sunt pustulosi *Morbilli* — *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* passim; *Dysenteria* aliquæ. *Ophthalmia* & *Lippitudines* jam sunt frequentes admodum.

Nova Luna 7^o. *JULIO*. *Plena Luna* 21^o.

Pluvius, algidus & tristis fuit hic Mensis, *Decembrem* potius quam *Julium* adesse crederes; venit plerumque ab Occidente Ventus, vergens ad Austrum, & sæpe nimbosus; Aer interim nebulosus & maximè humidus — omnes Fructus crudunt prorsus & planè fatui — Myriades *Limacum* erreptant undiquè, vix autem volitat *Papilio* — Omnium Arborum Frondes Foliaque, Mare spectantia, nigra sunt & veluti combusta.

Pluvia $\frac{III}{I}$. 2. $\frac{III}{5}$. 6. 9. $\frac{II}{10}$. 14. — 16. $\frac{II}{18}$. 19.
 $\frac{II}{0}$. $\frac{I}{21}$. 22. 23. — $\frac{I}{24}$. 25. $\frac{I}{26}$. 28. 29. 30.
 Dig. Dec.
 = 3.604.

Fulgur & Tonitru 5. p. m. plurima Fulgura 8. Nocte, levis *Procella* 18. Nocte SS E 4^x. Dies festuosi 15. 16. 17. 18.

Altitud. maxim. 8. 29. 9. VV 1. }
 — minim. 19. 29. 2. S VV 3. } media 29. $5\frac{12}{10}$

Dies

Dies frigid. 24. 38. VV b S. 3. } media 31 ¹⁸/₂₈
 — fervid. 17. 18. S. 1.

Variolæ Modò valdè *epidemicæ*, magisque etiam *funestæ*; utpotè sæpe confluentes, fessiles & atræ, sæpe crudæ, aquosæ, diffuentes; dira interdum excitant in *Faucibus* *Ulceræ*, & enormem *Salivæ* acris *Fluxum*. — *Morbilli* adhuc grassantur.

Ophthalmiæ perplurimæ cum *Epiphora* maxima atque acerrima, *Dolor Dentium* porrò plurimos torquet: in utrisque crebra *Catharsis* juvat magis quàm *Missio Sanguinis* — Gravis in *Pulmonibus* *Distillatio* plures infestat, unde haud pauci in *Phthisin* pulmonariam incidunt. — Multi *Rheumatismi* & *Pleuritides* incipiente Mense, necnon *Peripneumoniæ* aliquando cum *Petechiis*.

Non solùm *Variolæ*, sed & omnes penè *Morbi*, jam peioris, sunt *Indolis* quàm regnante Vere — An ab algida udaeque *Tempestate* *Cutis* *Meatus* occludente, ac perspirantes *Humores* reprimente unde serosa genita est *Colluvies*, eòque forsan acrior, quò magis *Bilem* *Sanguinemque* adusse rat *Fervor Solis* immodicus durante *Maiò*; quiporrò è *Terra* immensam *Vaporum Copiam* excitavit, quam & *Junio* & *Julio* Mense, sub *Forma Pluviæ*, ruentem vidimus?

Terribilis jam sævit *Scorbutus* inter *Nautas* præcipuè quos secum reduxit *Martin*, *Classis* occidentalis *Præfectus*; excruciantur perplurimi *Ulceribus* fœdis, lividis, sordidis ac valdè fungosis: mirum est profectò, & insolitum, quàm brevi *Tempore* spongiosa *Caro*, *Fungi* ad instar, his *Ulceribus* succrescit, etsi paulò ante Scalpello derasa, eaque interdum ad *Magnitudinem* enormem. — Non solùm miseris his, at verè uti-

libus

1746) & Morbis Epidemicis: 161
 libus Hominibus, per se infensa est maximè Scor-
 butica Lues, sed & illos etiam omni penè Mor-
 bo, qui ab Humorū Corruptione pendet, ob-
 noxios admodum reddit; Febris nempè pu-
 tridis, malignis, petechialibus, pessimo Variolarum
 Generi, Dysenteriae cruentæ, Hamorrhagiis, &c.
 — multò magis adeò bonis his fuit Exitio quàm
 bellicum Fulmen.

Nova Luna 5°. AUGUSTO. Plena Luna 19°.

Favente tandem ter optimo Numine effulget
 Apricitas, exoptata diu; læta hinc Messis, opti-
 mæ Segetes. Ventus per Initia Septentrionalis,
 post undecimum deflexit ad Occidentem, ac à
 vicesimo tertio spiravit rursus ab Arcto ad Finem
 usque ferè: intervenit sæpe Malacia, Libs rarò,
 Aer verò frequenter nebulosus & humidus: ma-
 ximæ sæpissimè Rorationes.

Pluvia 8. 14. 15. 16. 18. 24. 25. 26. 30.
 Dig. Dec.

R. = 0. 846.

Fulgur & Tonitru 24. primo Mane.

Altitud. maxim. 28. 30. 0. NNE 1. } media 29. 7 $\frac{1}{2}$
 ——— minim. 16. 29. 5. S VV 3x. }
 Dies frigid. 27. 36. N 1. }
 — calid. 3. 24. N 1. } media 30 $\frac{13}{30}$

Variolæ adhuc epidemicæ, quædam parvæ, atræ,
 malignæ, jam sæpe cum enormi Alvi Fluxu suba-
 ro. Ophthalmiæ & Dentium Dolores acerbis-
 simæque frequentes. Perpauci aliter Morbi.

Lætè jam tandem canunt Cicadæ, reviviscunt
 semum Papiliones. Noces avellanæ copiosissimæ.

* M

Nova

Nova Luna 4°. *SEPTEMBRI.* *Plena Luna* 18°.

Atmosphæra fuit admodum humida, imò & interdum algida hoc Mense; Libs sæpe Initio, sæpe Corus, medio Mense Aquilo, qui paulò ficciorem & rigidiorẽ fecit Aerem, adeò ut xiv. & xxi. gelaret.

Pluvia $\frac{11}{2}$. $\frac{2}{4}$. $\frac{3}{5}$. 7. $\frac{2}{9}$. 10. $\frac{1}{12}$. 15. 16. 18.
Dig. Dec.
19. 22. — $\frac{11}{23}$. 24. $\frac{111}{26}$. 27. $\frac{1}{29}$. 30. = 3. 178.
Procella 5. p. m. S w 4^r. — 29. p. m. S w b
S 4.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 1. N b E 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$.
—— minim. 29. 29. 0. S VV b S 4. }
Dies frigid. 21. 54. N b E 2. } media 39 $\frac{22}{30}$.
— tepid. 9. 33. VV 2. }

Variolæ usque grassantur: *Ophthalmiæ* frequentes, ut plurimum humidæ. — Tumores Fau-
cium, Capitis, Colli cum sævo Dentium Dolo-
re innumeros vexant; Destillationes ac Tus-
ses plurimæ — Febres miliares compositæ, (nempe
ubi cum Papulis subalbidis commisceantur Pu-
stulæ rubræ) crebræ sunt valdè apud *Totness*, &
in australi *Devonia*.

Nova Luna 3°. *OCTOBRI.* *Plena Luna* 18°.

Frigidus insequitur *October* oriens nimirum
Boreas Die quarto, ad vicesimum tertium usque
duravit, si decimum nonum excipias; siccus hinc
Aer, at frigidus ut plurimum, imò interdum Ge-
lu haud leve; sub Finem prævalebat Vultur-
nus.
Pluvia

1746) & Morbis Epidemicis: 163

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{28}$.

Dig. Dec. $\frac{1}{22} = 2. 238$.

Procella i. p. m. S w 4. — 23. ab Hora i i. a. m. ad 4. p. m. S w 4. etsi Mane acre Gelu Ventusque N E i. — 26. a. m. S w 4. Circius vehemens 25. p. m. Fulgura 23. Nocte. AB. 7. N N E i.

Altitud. maxim. 6. 30. 4. N E i. } media 29. $8\frac{10}{28}$
 ——— minim. 24. 28. 8. S S V V 3. }

Dies frigid. 23. 64. N E i. } media $51\frac{12}{28}$
 — tepid. 1. 42. S V V 4x. }

Variolæ adhuc epidemicæ, sed paulò mitiores; plures etiamnum Ophthalmia vexantur; per multi acutissimo Dolore Dentium atque Aurium, cum Faucium ac Glandularum Colli Tumore: Tusses vehementissimæ passim, imò haud pauci jam Morbis peripneumonicis & rheumaticis laborant.

Nova Luna 2º. NOVEMBRI. Plena Luna 17º.

Ab ipso Mensis Initio ad xviii. aut Boreas flatur, aut Eurus, isque sæpe perfrigidus, Cœlum it intereà frequenter caliginosum, decidente tandem Pluvia; post xix. interdum turbidus Auster, Septentrio interdum.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{18}$.

$\frac{1}{21}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{29}$. $\frac{1}{30}$. Nix & Dig. Dec.

ando 19. 22. = 3. 306.

M 2

Pro

Procella 20. Nocte S 4. — 21. Mane S 4. — 22.
 Vesperi N W 4.
 ——— 30 p. m. S S E 4. Nebula densissima
 18. Malacia.

8. Altitud. maxim. 4. 30. 2. E N E 2x. } media 29. $5\frac{26}{28}$
 ——— minim. 21. 28. 6. S S VV 3x. }
 Dies frigid. 7. 68. E N E 2x. } media 58 $\frac{4}{28}$
 — tepid. 21. 50. }

Variolæ nunc sunt Moris plerumque benigni ;
Tusses convulsivæ sævissimæ inter Pueros undi-
 què, plurimæ admodum & vehementes etiam
 inter Adultos cum Tumore Capitis, Colli, Fau-
 cium, sæpe & cum acerbo Dentium Dolore :
Ophthalmiæ passim, necnon Anginæ mucosæ :
 Multi *Rheumatismo* pertinace atque *Arthritide*
 laborant.

Gignit plerumque gelidum humidumque Au-
 tumni Cælum Colluviem serosam, quæ nunc ad
 Caput Pectusque ruit, nuuc ad Artus, frequenter
 ad Intestina defluit, unde *Catarrhi*, *Tusses*, *Rheu-*
matismi, *Arthritis*, *Diarrhœa*, *Dysenteria* tunc
 Temporis ita sunt communes — Quòd si *Æstas*
 fuerit calidior solito, subitoque excipitur Frigore,
 gravissima sæpe Mala incautis accidunt.

Nova Luna 1^o. — DECEMBRI. *Nova Luna* 31^o.
Plena 16^o.

Pluit, quod solet, frequenter hoc Mense, Aer
 verò fuit crassissimus ac humidus maximè : Libs
 ferè perpetuus ad vicesimum secundum, postea
 Vulturus, aut Boreas frigidissimus ad Finem
 usque. *Densitas Atmosphære Barometrum* susti-
 nuit ad altam satis *Stationem*.

Pluvia

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{1}{3}$ — 5. 7. — 9. $\frac{1}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{1}{13}$ 14.
 — 16. $\frac{1}{17}$ 19. 21. $\frac{1}{24}$ $\frac{11}{26}$ 27. = 2. 780.
 Dig. Dec.
 Gravis Procella 12. Vesperi S w b w 4^x. AB.
 28. H. 7. p. m. E N E 2.

8 Altitud. maxim. 22. 30. 3. N N VV 1. } media 29. $7\frac{25}{32}$
 ——— minim. 12. 29. 0. }
 Dies frigidiss. 31. 76. N E b E 2. } media 56 $\frac{13}{31}$
 — tepid. 5. 50. S VV 2. }

Peripneumonix passim, Ophthalmix plurimæ,
 Tusse undiquè, cæque sævissimæ, quibus tamen
 vexantur maximè Pueri, quos non rarò Disten-
 tio etiam Nervorum corripit. Arthritidis pertinax
 ac Rheumatismus multos cruciant.

Variolæ adhuc sæviunt plurimùm, multòque
 magis jam funestæ sunt, confluentes quippe, cru-
 dæ, luridæ, aquosæ; quædam diffluunt valdè ac
 nigrescunt. — Per Salivæ Ductus & Alvi quærit
 plerumque Natura Morbi Exitum — Urinæ copio-
 sa hypostatica nunquam non juvat — Lenia adeò
 Eccoprotica cum Diureticis semper ferè exhibeò
 declinante Febre: Morbo autem incrementum, seu
 potius ad Statum procedente, quæ Concoctio-
 nem Humorū promovent; qualia sunt Lap.
 Contrayerv. Myrrh. Mosch. Mithridat. Theriac. An-
 romach. &c. — Nec verum tacere debeo exi-
 nias Ficum & Cicerum Dotes ad Variolas matu-
 andas, quas tanti fecerunt Arabes; apud quos
 anè prima Variolarum Historia — Imò & ipsa
 Potione Coffee hunc ad Finem utor sæpissimè
 eliciter.

Totius Pluviae Quantitas, Anno MDCCXLVI.
Dig. Dec.

fruit = 31.990.

Plena Luna 15°. JANUARIO. Nova Luna 29°.

Incipiente Anno asperissimum Gelu Ventusque borealis, post Diem quintum Vulturus Pluviaque aliqua, mox Libs. perpetuus, atque tristis ac uda Tempestas: Aer maximè humidus, Sol ferè nullus, Pluviæ plùs satìs.

Pluvia $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. $\frac{11}{16}$.
 $\frac{11}{18}$. $\frac{11}{19}$. $\frac{1}{20}$. — $\frac{11}{21}$. $\frac{11}{22}$. $\frac{11}{23}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{26}$. $\frac{11}{27}$. $\frac{11}{28}$. $\frac{11}{30}$.
 Dig. Dec.

31. Nix 5. Grando 20. = 4. 616.

Procella 15. Nocte S 4. Levis AB. 2. H. 10.
p. m. E N E 2.

♂ Altitud. maxim. 1. 30. 2. E N E 3^x. } media 29. 4.
 ——— minim. 16. 28. 8. S S V V 3^x. }
 Dies frigidissim. 1. 78. } media 57.
 ——— tepid. 30. 50. S b E 3. }

Multi *Variolis*, plures *Febre catarrhali* laborant; Tussis innumeræ, sæpe vehementes; *Rheumatismi* valdè frequentes, necnon *Dentium sævi Dolores cum Tumore Capitis, Colli, Faucium.* que. — Tussis *convulsiva* pessima inter Pueros grassatur pluresque strangulat; Sanguinem per sæpè expuunt, & haud levis interdum accedit Febris: His Sanguinem mittere necesse est prorsùs, imò aliquando bis, terve, etiam bimulis trimulisve; accurata dein instituenda est *Dieta*, blanda porrò *Ventriculi & Intestinorum Purgatio*; quibus per-

1747) *Q Morbis Epidemicis.* 167
 actis Corticis Peruviani Decoctum cum Tussita-
 gine & Balsamo Tolutano, uno alterove appposito
Vesicatorio, Morbum fugat; sed commodum est
 omninò Respirationem expedire & *Anacatharsin*
 Solutione Gum. Ammoniac. in Expressione Milo-
 leped. ex Aq. Hyssopi. Atqui profectò haud pau-
 ci exindè in *Rachitidem* incidunt — Scabies per-
 multos inter Popellum atque Nautas infestat.

Plena Luna 14°. FEBRUARIO. *Nova Luna* 28°.

Per Initia Mensis perflavit Notus, intercurrente
 subinde Coro; Pluvia autem quotidie ad deci-
 mum quintum usque, Aerque humidissimus:
 tunc Boreas siccus & gelidus valdè, sub Finem
 Vulturnus velox, ac pluviosus.

Pluvia $\frac{''' }{1.}$ $\frac{'}{2.}$ $\frac{'' }{3.}$ 4. $\frac{'}{5.}$ 6. $\frac{'}{7.}$ $\frac{'}{8.}$ 9. 10. $\frac{'}{11.}$
 $\frac{'}{13.}$ $\frac{'' }{14.}$ 15. 25. 26. 27. $\frac{'' }{28.}$ Nix 16. 17.
 Dig. Dec.
 = 2. 888.

Procella 5. p. m. w S w 4. — 8. a. m. S S w
 4. — 13. Nocte S w 4^r.

8 Altitud. maxim. 23. 30. 2. E N E 1x. } media 29. 6.
 — minim. 14. 29. 0. S V V 3x. }
 Dies frigid. 18. 73. E N E 2. }
 — tepid. 4. 50. S V V b V V 2x. } media 58 $\frac{8}{12}$

Variolæ adhuc frequentes: Febres aliquæ pu-
 tridæ, nervosæ, lentæ: Gravissimi passim *Asth-*
matis Paroxysmi, Tussis admodum sævit. Pleuri-
 tide plures aut *Pleuroperipneumonia* corripuntur,
 plurimi *Rheumatismo* cruciante: Scabies est per-
 frequens undiquè.

M 4

Colica

Colica quædam biliosa jam plurimos torquet; acerbissimus Stomachi Dolor, ac perpetuæ Vomitiones urgent, nunc Alvus est citissima, nunc astricta maximè; ne vel *Catharticis* fortissimis cedens priusquàm Missione Sanguinis, Fortuque amolliente, solvitur nimia Intestinorum Strictura:—hæret sæpissimè in ima Parte dextri Hypochondrii acutissimus Dolor & pertinax admodum, cujus Causa plerumque est à Stercoribus induratis ad Finem *Ilei* atque *Coli* Principium compactis—vix utiquè lenitur nisi laxante Fomento, & *Clysmate* frequente, quæ Fæces emolliunt: cave verò ne Fomenta sint calida nimium.

Plena Luna 15°. MARTIO. *Nova Luna* 29°.

Venit ab Oriente Ventus ab ipso *Martii* Initio ad Diem vigesimum tertium ferè, ad Septentrionem autem vergens plerumque: siccam hoc fecit *Atmosphæram* & frigidam, imò & pulcherrimam sæpe, Libs post, ad Finem Aquilo.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$ 9. 10. $\frac{11}{19}$ 23. $\frac{1}{24}$ 25. $\frac{1}{26}$ 27. Dig. Dec.

Nix 8. 9. Grando 10. 20. = 1. 700.

Procella 26. Noctu S w 4°. AB. 22. H. 9 p. m. N b E 1.

à 12°. ad 18. ad Solis occasum Nubes pulcherrimæ puniceæ quotidie.

Altitud. maxim. 14. 30. 4. E N E 1. } media 29. $7\frac{8}{29}$
 — minim. 10. 28. 9. N b E 1x. }
 Dies frigid. 8. 66. N N E 1x. } media 58 $\frac{10}{28}$
 — tepid. 30. 46. N 1. }

Variolæ passim; fœda *Scabies* est undiquè :
Asthma grave multos vehementer premit, *Tussis*
fœvissima plures.

Haud pauci *Apoplexia* *, vel *Hemiplegia*, cor-
repti occidunt—Hoc sæpe, notante *Cole de Apo-*
plexia, post diu durans *Frigus* accidit, cui suffra-
gatur *Experientia* : An à densato nimium San-
guine ? an ab imminuta *Perspiratione*, retentis
crassioribus ? an à magno *Atmosphæræ* Pondere
totum Corporis Habitum validè premente, unde
plus satis Sanguinis ad Cerebrum ruit, *Calvaria*
sustinente *Aeris Pressuram* ? Tali Tempestate
utiquè cavendum est Hominibus, Capite largo,
Corpore quadrato, Collo breviorè : parcè viven-
dum est, leniter purgandum : venienti occurrere
Morbo.

Pleuritides & *Peripneumoniæ* admodum vul-
gares; Sanguis jam ferè semper densus est val-
dè, ac tenace obductus *Glutine*; *Tussis* effera,
Sputa tamen libera satis & plerumque modico
Sanguine tincta: ubi verò parum aut nihil exan-
tatur, pessimum; nec melius multò si parva,
rotunda, vel spumosa tantum. Quæ ex *Ficu*,
Melle, *Oleo*, *Nitro*, *Spermate Ceti* experior per-
quàm commoda, *Potionem* porrò emollientem,
liberalem, qualem præbet *Decoctum pectorale* di-
ctum, aut *Serum Lactis Herba Taraxaco* imbutum;
cui inest dissolvendi Lentorem Sanguinis Vis
maxima; præsertim si incoquitur simul *Radicis*
Grami-

* *Ramazzini* *Apoplexias* recenset inter Morbos grassan-
tes per valdè frigidam & siccam *Atmosphæram*. Vid.
Constitut. Epidem. 169. Sect. 3.

Graminis * plurimum & eryngii — Si vis alia ,
præstat *Hedera terrestris* , *Tussilago* , *Adiantum* ,
Helenium , *Hyssopus* , *Pulegium* , *Flos Papaveris er-*
ratici . — Utilia hæc sanè sunt & contemnenda
neutiquàm , Atavis utiquè Proavisque nostris
Medicina indigena . — Sed enim hodiè Homun-
ciones fastidiosi Herbas ab Indis *Theam* scilicet ,
Sarsam , *Chinam* , *Ginseng* , & nescio quid ultrà ex-
petunt — Ast ab itote tandem vos Delicatuli ne-
quioris Ævi pessima Progenies .

Plena Luna 14°. APRILI. Nova Luna 28°.

Hoc quoque Mense Ventus fuit plerumque
orientalis, nunc ad Austrum, nunc ad Arctum
flectens, Aer interim sæpe tenuis satis; à xii.
autem ad xvii. aut Libs, aut Auster maximæque
Nebulæ: Malacia xxii.

Pluvia 5. ⁱ8. ⁱⁱⁱ13. 14. 16. ⁱⁱ17. 18. ⁱⁱⁱ23. ⁱⁱ24.
ⁱⁱDig. Dec. 26. 28. = 3. 100.

♂ Altitud. maxim. 1. 30. 2. E 1. } media 29. 7 $\frac{8}{30}$
 ——— minim. 24. 29. 2. E b N 1. }
 Dies frigid. 11. 55. N E b N 1x. } media 43 $\frac{21}{30}$
 — tepid. 31. 36. S S E 1. }

Paucæ nunc *Variolæ* ; Pleuritis, & Peripneumonia, adhuc frequens admodùm, indèque quidam

* Vel ipsi Bubulci Vim Graminis detergentem noscunt. observando, enim Stercus bubulum, notant Obstructiones & Crustas, penè lapideas cum Stercore excretas, dum recentia Gramina carpunt Boves; qui in Stabulis detenti diu, languidi fuerunt admodum & icterici prorsus.

dam in Pulmonis Vomicam incidunt, unde facti
sunt tabidi: hoc his accidit præcipuè, qui pa-
rùm aut Nihil expuunt ante Diem quintum, aut
septimum*, dein cœnosa, subdulcia, vel fœtida.
Plurimæ Tusses, vehementes, *Asthmaticæ*, plures,
Phthisici pereunt.

Febris putrida lenta multum grassatur diuque
Egrotis inhæret; Pectus atque Præcordia vel
ab Initio valdè premuntur, adest Tussicula &
Faucium Asperitas, Vomitus frequens atque Ca-
pitis Dolor.

Plena Luna 13°. MAIO. Nova Luna 28°.

Incipiente Mense Ventus borealis, ab octavo
ad vicesimum Diem Corus sæpe, sæpius Africus,
indè Vulturnus ad xxiv. postea Corus rursùm :
Aer fuit Initio perficcus.

Pluvia 6. 10. ¹11. 12. ¹14. 15. ¹¹17. 19. ¹¹21.
¹¹22. ¹23. ¹¹25. 30. 31. = 2. 108.
 Dig. Dec.

8 Altitud. maxim. 7. 30. 1. N N E 1x. } media 29. $5\frac{18}{30}$
 — minim. 22. 29. 2. S S E 2x. }
 Dies frigid. 1. 42. E N E 1x. } media 35 $\frac{14}{30}$
 — calid. 24. 28. S S E 1. }

Principio Mensis Erucae innumeræ, omnia devorantes, jam Pluviis demersæ, perimuntur.

Febris lenta putrida adhuc dum haud paucos
invadit. Ophthalmiae, & Rheumatismi aliqui.
Morbi pulmonares passim: multi Phthisici

Plena

* Vid. *De Aere & Morbis Epidemicis*, V. I. p. 52.

Plena Luna 11^o. JUNIO. Nova Luna 26^o.

Humilis fuit *Barometri* Statio toto *Junio*, Pluvia multa, Aer humidus, Ventus prorsus inconstans, austrinus tamen prævaluit; interfuit Boreas à xvii. ad xxii.

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----|----------------|-----------------|------------------|---------------|----|----------------|------|-----------|-------------------|
| | $\frac{1}{1}$ | | | | $\frac{1111}{5}$ | $\frac{1}{6}$ | | | | | $\frac{1111}{24}$ |
| Pluvia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 9. | 11. | 14. | 16. | 24. |
| | $\frac{1}{25}$ | | $\frac{1}{26}$ | $\frac{11}{27}$ | | | | $\frac{1}{29}$ | | Dig. Dec. | |
| | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | Grando | 9. | = 3. | 372. | | |
| Fulgur & Tonitru | è longinquo 11. Noctu. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----|------|----|----------------------------|------------------------------|
| Altitud. | maxim. | 21. | 29. | 9. | NN E 1x. | } media 29. $4\frac{22}{38}$ |
| | minim. | 25. | 29. | 1. | SVVbVV 2. | |
| Dies frigid. | 1. | 42. | N 1. | | } media 32 $\frac{28}{30}$ | |
| — calid. | 12. | 24. | S 1. | | | |

Febris pulmonaria jam non ita frequens est; Tussi autem & Rheumatismo plures vexantur; pluviosa hæc & infausta Tempestas nocet plurimum Tabidis.

Febris putrida lenta * huc usque multum sævit, atque haud paucis funesta est — Dolet Initio Sinciput, Occiput, Dorsum, mox Præcordia; adestque foedus & amarus in Ore Sapor, Nausea, Vomitus, Lingua valde squallida, tandemque nigra est prorsus, accedit porrò sæpe Singultus; Statu Morbi, Die sexno, vel septimo putà, ferè semper delirant, paulòque post interdum veteranosi succumbunt: rarò absunt Tremores & Tendinum Subfultus — Urina nunc crassa, parca, rubra,

* Rectius hanc Febrem dixerim biliosam, seu mesentericam, nam etsi diu admodum plerumque trahit Ægrotautes, Bilis acris & abundantis valde prodit Indicia.

bra, vel subnigra est, nunc cruda valdè & aquo-
sa: sæpe flavescit Cutis, sæpius Oculi Album —
tument admodum aliquando & indurescit Abdo-
men, hoc in casu, sive Arte, sive Sponte fluit
Alvus Ægrotantibus Levamento est; biliosa
namque multa & interdum atra prorsus deji-
ciuntur — hoc verò his præcipuè accessit, quibus
per Initia nullum exhibitum fuit *Emeticum*, quod
certissimè hæc Febris desiderat — quid quòd post
Vomitum plerumque erumpit Sudor largus, æ-
qualis, ingens cum Pustulis Prurigo, recedente
ut plurimum Morbo; idque maximè si liberè de-
scendit Venter, paulòque pòst turbida, multa,
fulva, subsidens Urina. Profectò hanc Febrem
abigit interdum Sudor, interdum Alvi Fluxus:
utrum poscit, his Notis utor; si Pruritus urget
& in Cute quasi Morsus, potissimum si Papulæ
apparent, moderatis *Diaphoreticis* pugno; si Ru-
tus, si Flatus, si Abdominis Tumor, leni *Cathar-*
tico. — *Pulv. Contrayerv. C. Julep. Camphorat.* cum
Aceto, Theriacæ Andromach. pauxillum ad Sudor-
es eliciendos conferunt; ad Alvum movendam
Rhabarbar. Mann. Sal. Mirab. Glauber. Crem.
Tart. — Omnia ex *Aloe* nocent — intereà verò sive
per Alvum, sive per Cutim, moveo, multam
diluentem demulcentem Potionem præcipio, cui
admisceo insuper ad Urinam ciendam aliquid;
Sp. Nitri dulc. scilicet, *Sal. succin. Nitrum*, &c.
— vix sanè certius Signum Salutis occurrit quàm
plurima, lutea, *hypostatica* Urina, Die nempe
undecimo, aut decimo quarto.

Plena Luna 10°. JULIO. Nova Luna 26°.

Die Julii quinto cessere Pluviae, multoque laetior successit Tempestas, & Sol fervidus valdè, flante Coro primùm, dein Euro, mox Borea intercurrente, etiam subindè Malacia: Sub Finem Ventus aquilonius dominabat.

Pluvia 1. 2. 3. 5. 16. 28. 29. = 1. 142. Dig. Dec.

8. Altitud. maxim. 21. 29. 9. E N E 2x. } media 29. 6²²/₃₁
 ——— minim. 3. 29. 2. S VV 3. }
 Dies frigid. 4. 34. VV N VV 2x. } media 24.
 — fervidiss. 18. 13. E N E 1. }

Febres aliquæ putridæ lentæque adhuc: quædam Peripneumoniæ, præcipue nothæ; Rheumatismi passim, & Ophthalmiæ humidæ plurimæ — Ex quo autem pulchra calidaque Tempestas eluxit, paucissimi ut solet, apparent Morbi hoc Anni Tempore, modò nempè Cælum sit apertum *.

Plena Luna 9°. AUGUSTO. Nova Luna 24°.

Parùm elata fuit Barometri Statio hoc Mense; Atmosphæra autem persicca & fervida maximè; afflavit Eurus sæpissimè, Boreas frequenter, Corus sæpe, Libs rarissimè.

Pluvia 2. 3. 15. 16. 17. 25. 28. = 0. 564. Dig. Dec.

Maximæ Rorationes creberrimè: Fulgur & Tonitru è longinquo 25.

Inf.

* Hippocr. Aphorism. 15. Sect. 3.

1747) & Morbis Epidemicis: 175

Infinitæ Muscæ, Vespæ, & Papiliones omni
geni, Erucarum Vis immensa, Cicadæ undiquè
atissimè garriunt, Omnes Rivuli & omnes ferè
putei arescunt ob Aestum enormem.

Altitud. maxim. 30. 29. 9. NNE 1. } media 29. 6.
minim. 15. 29. 2. VV b S 2. }
Dies frigid. 16. 30. N VV 2. }
fervidiss. 23. 12. N N E 1. } media 21 $\frac{15}{31}$

Pauci jam Morbi, plures attamen *Diarrhæa*
corripiuntur, imò & sæpe valdè profusa: per-
lurimos *Ophthalmia* aut Lippitudo vexat. Ex
Ore aliqui, quidam ex Naribus, plures ab *Hæ-*
orrhoidalibus Venis fundunt Sanguinem: Mus-
eres largissimè Menstrua profundunt: totum
hoc à rarefacto admodum Sanguine.

Plena Luna 7°. SEPTEMBRI: Nova Luna 23°.

Per hunc Mensem Ventus fuit plerumque ab
occidente, nunc ad Austrum, nunc ad Septen-
tentrionem tendens; Aquilo etiam aliquando inter-
venit: Aer sæpe ficcus & tenuis, sæpe autem ne-
bulosus; Initio quidem calidus.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{6}$. 7. 10. 12. $\frac{2}{14}$. $\frac{11}{15}$. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{17}$. 20.

Dig. Dec.
1. 25. 27. 28. 30. = 2. 5 16.

Immensæ sæpe Rorationes, imò interdum
ruinæ.

Altitud. maxim. 24. 30. 1. N b E 1. } media 29. $5\frac{6}{28}$
minim. 16. 29. 0. VV 1x. }
Dies frigid. 19. 46. N N VV 1x. }
calid. 4. 24. Malacia. } media 38 $\frac{2}{28}$

Febris

Febris putrida lenta passim ; cui jam accedit frequenter Icterus , & magnus Virium Langor , interdum Tumor Abdominis atque Pedum . Alvus torminosa perplurimos ubique infestat , Cholera sævissima multos , plures autem *Dysenteria* mucosa ac biliosa , imò & aliquando cruenta , Febre haud rarò comitante ; sub Finem crebrò erumpunt Pustulæ mordentes per universum ferè Corpus . — Adeò penè in omnibus dominari videtur acris & biliosa Colluvies , quæ plerumque per Alvum felicissimè dejicitur : perpaucis nunc profectò Alvi Fluxus Exitio est , quam sæpe diu admodum durat , modò diluitur probè & temperatur Acrimonia , atque blandè dein expurgatur Saburra Intestinorum . Atqui alibi , præcipuè apud *Bristolenses* & *Bathonienses* multò magis fuit funesta *Dysenteria* .

Post fervidam Æstatem constanter ferè sequuntur Cholerae , *Dysenteriae* , Alvi Fluxus ; perdurante enim longo ac intenso Solis Ardore torretur Sanguis , exaltatur Bilis* , magis acres fiunt indies Animalium Sales (ipsum Viperæ Virus longè longèque magis veneficum est per Calores æstivos , quàm dum omnia torpent Hyeme frigida .) Quandoquidem verò huic succedit frigidus humidusque Autumnus , constipata Cute , ad interiora ruunt acres Humores , multos ideò gignit atque varios Morbos , quos inter suprà descriptos — cave igitur ne præposterè sistas eorum Exitum per Vias Cuti vicarias ; maximus nempe Consensus Cutim inter & Intestina datur certissimè .

Mon-

* Ideò *Hippocrat.* τὸ Θέρος χολοποιὸν vocat , Lib. de Humorib. Sect. 8. Edit. *Liden.*

Monstrat aliqua tenus, ideò, quod dixi supra, Viam, qua in Morbis autumnalibus curandis incedendum est: vernæ quippe Febres plus Sanguinis Missionem poscunt, autumnales verò magis leni Catharsi levantur — Magnus profectò ac diuturnus Æstatis Calor non tantum Vim Fibrarum enervat, sed & Sanguinis Compagem laxat nimis, Sales autem reddit acriores atque Olea animalia rancida; Verbo, Vasa facit debilia, Humores acres, Bilem abundantem & corruptam — adeòque magnus Medicinæ Parens dixit τοῦ δὲ Θέρεος ἡ χολὴ αἰρεται ἐν τῷ Σώματι, subjungit ἡ δὲ χολὴ τὴν Θερμὴν κατέχει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Φθινόπωρον, & paulò infra, ἡ δὲ μέλαινα χολὴ τοῦ φθινοπώρου πλείσθη, τε καὶ ἰσχυροτάτη ἐστίν. Lib. de Natur. Homin. Sect. 14. Edit. Lindeni. Ubi verò acris & biliosa Coluvies exundat, aut per Vomitum, aut per Alvum, rectissimè expurganda est; nam hujus præcipua Sedes est in primis Viis, Visceribus Abdominis, ac Vasis *meseraicis*. Fateor equidem quòd & tota Sanguinis Massa hac quoquè scatet sæpissimè, sed ne sic quidem indicatur Venæ Sectio, quæ nimiam Sanguinis Quantitatem utiquè minuere potest, Acrimoniam ejus corrigere non potest: Quod cum ita sit, detrahendo cum Sanguine Vires, non Acrimoniam, officit. Ideòque Hippocrates* Veteresque Medici, ubi Bilis abundat, Acrimonia scilicet biliosa, Sanguinis Missionem prohibent: nec video Ego utiquè cui Bono, hoc in Casu mittitur, nisi adsit *Plethora* aut Inflammatio vehemens: turpissimos sanè Errores atque immedicabiles hac in Re vidi; imò & plus Vice simplice perdolui.

N

Plena

* Lib. de Humoribus, ad Finem.

Plena Luna 7°. OCTOBRI. Nova Luna 22°.

Altam tenuit Stationem Barometer toto fere Octobri, flante sæpissimè Borea, vel Coro; Libs tamen interdum, nonnunquam Euro-notus spiravit; Atmosphæra fuit multò humidior, at plerumque satis tepida.

Pluvia 1. — 3. 4. 10. 14. 16. 26. 27. 28.

Dig. Dec.

29. 31. = 1.596.

Levis Procella 4. S w 4^r. — 3 i. p. m. S. w. 4^r.
Maximæ Pruinæ medio Mense.

8 Altitud. maxim. 6. 30. 3. E N E 1. } media 29. 9¹²/₃₀
— minim. 29. 29. 5. S V V b V V 3. }
Dies frigid. 20. 54. E N E 1. }
— tepid. 1. 38. V V S V V 1. } media 46⁴/₃₀.

Rheumatismus passim; Febres putridæ frequentes, quibus haud rarò, sub Finem, accedit Icterus—Coryzæ atque Dentium Dolores multos vexant, Tussis sævæ plures—Alvi Fluxus creber adhuc, Dysenteria tamen rarior—Variolæ jam de repente factæ sunt epidemicæ, eæque quidem malè moratæ & sæpe lethales; quippè quæ parvæ & nigræ, aut crudo prorsùs diffuentes Ichore ad Finem usque; sæpe cum ipsis Variolis erumpunt Petechiæ, quod pessimum: Interdum Cutis sub Vesiculis aquosis Necrosi afficitur.

Plena Luna 6°. NOVEMBRI. Nova Luna 21°.

Densa fuit admodùm ac humida Atmosphæra hoc Mense, quæ Mercurium baroscopicum in alto susti-

1747) & Morbis Epidemicis: 1779

sustinuit Loco, etsi multò rarior erat ab Oriente
Ventus quam Octobri elapso: Corus quidem ade-
rat sæpe, sed & Libs haud rarò — Ad ipsum Fi-
nem, gravis ab Austro Procella *Barometrum* de-
turbat maximè.

Pluvia ⁸1. ¹9. — ¹¹11. ¹15. ¹¹16. 17. 18. ¹20. 22.
Dig. Dec.
23. 24. 27. ¹¹29. ¹30. Grando 16. = 2. 678.
Procella 16. Nocte — 20. p. m. S w 4. — 29.
p. m. S S w 4^r.
Magna AB. 21. H. 9. p. m. N w 1^r.

& Altitud. maxim. 4. 30. 3. N 1. } media 29. 9.
— minim. 30. 18. 6. S VV 3. }
Dies frigid. 25. 62. N b E 1. } media 50 ⁶/₂₈
— tepid. 10. 42. S VV b VV 2x. }

Variolæ adhuc epidemica; sed jam majore ex
Parte paulò mitiores, sæpissimè tamen Fluxus Sa-
livæ prælargus profluit, etiam in Distinctis.

Diarrhæa serosa plures adhuc exercet — *Catarrhi*
& *Rheumatismi* plurimi, necnon Tusse acerbæ
— Morbi Pulmonum acuti haud pauci.

Plena Luna 30. DECEMBRI. Nova Luna 20°.

En tandem corruunt Vapores, per *Atmosphæ-*
ram congesti diu, delabente plurimùm *Baroscopio*:
per Initia Mensis Vulturus perflavit, dein Libs
furens, intercurrente subindè Cauro. — Duravit
pluviosa hæc & misera Tempestas ad xxi. usque;
tunc venit ab Oriente Ventus, qui ad Septentrio-
nem vergens rigidam valdè Brumam intulit, &
Barometrum crexit maximè.

N 2

Pluvia

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| | <u>III</u> | <u>II</u> | <u>I</u> | <u>III</u> | | <u>III</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>II</u> | <u>II</u> | |
| Pluvia | 1. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| | <u>I</u> | <u>I</u> | <u>III</u> | <u>I</u> | <u>I</u> | | | | | | |
| | 14. | 15. | 17. | 18. | 19. | 20. | 24. | Nix | 2. | =6. | 566. |

Dig. Dec.

Maxima Diluvia medio Mense. *Atmosphæra* fuit densissima & longè humidissima ante xxiv. Crassissimæ & valdè foetidæ Nebulæ à xx. ad xxii.

Procella 2. E S E 4^r. — 9. Nocte S w 4. — 10. S w 4. — 11. Vesperi & Nocte S w 4^r. — 14. w S w 4. Amplissimus Halo circa Lunam 3. Maxima lucida, ignea, punicea AB. 6. H. 8. N E 1^r.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|----------------------|--|--|
| 8 | Altitud. maxim. | 31. | 30. | 5. | NE 2 ^x . | } media 29. 4 ² / ₃₀ |
| | minim. | 11. | 28. | 4. | S VV 4 ^x . | |
| | Dies frigid. | 31. | 73. | N E 2 ^x . | } media 56 ²⁰ / ₃₀ | |
| | — repid. | 1. | 46. | Malacia. | | |

Variolæ jam sunt magis benignæ, licèt adhuc *epidemicæ*; atqui etiam in *Distinctis* profusus est admodùm *Salivæ Cursus*: porrò frequenter etiam *Maculæ* quædam rubræ sed *Coloris* vividi, erumpentibus *Variolis* intersunt, quæ brevi plerumque vanescunt.

Pleuritides & *Peripneumonix* haud raræ, sæpe nothæ; *Tusses* & *Catarrhi* plurimi: *Alvi Fluxus* usque creberrimus — Vides sanè, in omnibus ferè *Morbis*, *Colluviem* serosam adhuc dominantem.

Dig. Dec.

Tota Pluvia Anno MDCCXLVII. = 32. 246.

Plena Luna 4^o. JANUARIO. Nova Luna 19^o.

Præalta fuit hoc Mense *Barometri* Statio, Ventus utplurimum ab Oriente, multum per Initia flectens ad Septentrionem; à xix. autem plerumque

1748) *De Morbis Epidemicis:* 188
 que ad Austrum, Aer sæpe crassus erat, interdum nebulosus, semper frigidus. — Gelu valdè rigidum ineunte Anno.

Pluvia 5. 8. 9. 11. 14. 15. 17. 21. 23.
 Dig. Dec.
 26. 27. 28. 30. Nix 7. = 1. 718.
 Levis AB. 22. H. 9. p. m. N N W 1. Procella 27. Nocte S E b S 4.
 Nebula densissima, ac foetida admodum, diu durans 31.

Altitud. maxim. 1. 30. 5. E N E 2. } media 29. 9 $\frac{2}{3}$
 ——— minim. 28. 19. 3. S E b S 3. }
 Dies frigid. 2. 74. E N E 2. } media 62.
 — tepid. 30. 53. S S E 2. }

Ut solet ferè semper, sic quoquè nunc, Tusse movet Boreas & Laterum Dolores; * idque sanè vehementer, Pleuritides nempe, Peripneumonix atque Tusse gravissimæ, modò sunt valdè frequentes: multos porrò premit Asthma sævissimum & contumax; parcè nimis plerumque in his Morbis expuitur, quanquam Distillationes profusæ, Coryzæ †, Anginæ mucosæ, Raucelines atque Faucium Tumores perplurimos ventant; crasso nimirum ac perfrigido Acre Cutis Meatus occludente; unde serosa Colluvies accumulatur. Rheumatismi plurimi. — Variolæ undiquè jam epidemicæ, nec profectò ita clementes.
 N 3 Plena

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 171. † — *Cels. Lib. 4. C. 4.*

Plena Luna 3°. FEBRUARIO. Nova Luna 17°.

Perfrigida jam regnat Tempestas & sicca val-
dè, Borea sæpissimè perflante, hinc Gelu asper-
rimum, & tenuis admodum Aer, at Pluviae pa-
rùm; Nix autem & Grando nonnunquam: Ba-
roscopium plerumque sublime.

Pluvia 21. ^{16.}23. ^{1.}28. Nix 16. 24. Grando
Dig. Dec.

21. 29. = 0. 598.

Acre Gelu 12. 15. 16. 19. 25. 26. Densissi-
mæ foetidæ Nebulae 9. 10. 12.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 3. N E 1. } media 29. $8\frac{17}{28}$
— minim. 23. 29. 2. S VV 2x. }
Dies frigidissim. 16. 77. N E b E 2x. } media 64 $\frac{12}{28}$
— tepid. 29. 58. VV N VV 2. }

Variolæ longè latèque sunt *epidemicæ*, passim
funestæ, parvæ, atræ; jam nunc *Salivatio* est
parcior debito, ut ut nuperis Mensibus perfusa
nimis. — *Febriculæ Catarrhales* valdè frequentes,
necnon *Tusses* sævissimæ; gravissimi *Asthmatis*
Paroxysmi & diu gravantes — *Tempestas* est exi-
tialis admodum *Pulmonariis*, moriuntur plurimi.
Pleuritides & *Peripneumonix* perplurimæ, cras-
sa perquam ac glutinosa sunt *Sputamina* sæpe,
interdum tenuia valdè, horum neutra facilè eji-
ciuntur, licèt *Tussis* plus satis urget; imò rupto
nonnunquam *Pulmone* purus putus *Sanguis* ex-
puitur. Utcunque viscida nunc sunt in *Peri-
pneumonicis* *Sputa*, *Cruorem* extractum multò
minùs tenacem sæpe sæpiùs notavi. — Post *Pleu-
ritides* aliquando maximè pertinaces *Laterum*
Dolo-

Dolores cruciant, qui multò meliùs Emplastris Anodynis, aut Epispasticis cedunt quàm Sanguinis Missioni, quantumcunque fuerat necessaria Morbi Initio. Odontalgia acerbissimæ & Rheumatismi per multos, lacessunt.

Plena Luna 4°. MARTIO. Nova Luna 18°.

Algida Tempestas toto ferè Martio, Pluviæ abundantes, Procellæ interdum: Medio Mense autem Gelu, Nix, Grando, Ventus aquilonius, Aer ficcus valdè & frigidus; sub Finem verò erat multò tepidior, ac humidior longè.

Pluvia $\frac{III}{2}$. $\frac{II}{3}$. $\frac{II}{4}$. $\frac{I}{6}$. $\frac{II}{7}$. $\frac{II}{10}$. $\frac{II}{11}$. $\frac{III}{21}$. $\frac{III}{24}$.

$\frac{II}{25}$. $\frac{II}{26}$. $\frac{II}{27}$. $\frac{II}{28}$. $\frac{II}{29}$. $\frac{II}{31}$. Grando 8. 12. 15.
Dig. Dec.

Nix 12. 13. 14. 18. = 4. 280.

Procella 2. Nocte w S. w. 4. — 25. a. m. S w 4. — 27. à primo Mane ad H. 10. a. m. S w b w 4.

Altitud. maxim. 29. 30. 1. NE 1. } media 29. 70.
minim. 27. 29. 0. S VV b VV 4. }
Dies frigid. 15. 73. E NE 21. }
— tepid. 29. 50. VV S VV 2. } media 58 $\frac{22}{29}$

Variolæ adhuc, sed multò pauciores, & minùs periculosæ: Pleuritides & Peripneumoniæ frequentes; jam faciliùs expuitur, sæpe coctum, & aliquo Sanguine tinctum, sæpe tamen perliquidum & acre. Tusles innumeræ & plerumque vehementes; Labe ideò Pulmonum affectis Tempestas est infensa maximè, & haud rarò funesta: gravissimi Asthmatis Paroxysmi — Rheumatismi

matismi multi — Haud pauci *Apoplexia* & *Paralyfi* perculsi sunt ; quod quidem per frigidas valdè Tempestates accidit frequenter * ; notavit etiam magnus *Hippocrates Paraplegias* fuisse epidemicas aspera durante Hyeme †, Lib. 1. epidem. Constit. 3. quod quoquè memoravit *Cole* in Lib. de *Apoplexia*.

Plena Luna 20. APRILI. Nova Luna 160.

Ad decimum nonum *Aprilis* frigida fuit Atmosphæra, flante ut plurimum Vento Orientem inter & Arctum; Gelu interdum; aliquando Nix; post vicesimum Libs prævalebat subsidente Baroscopio.

Pluvia $\frac{11}{1}$. 7. $\frac{9}{10}$. $\frac{11}{12}$. $\frac{11}{17}$. $\frac{1}{19}$. 20. $\frac{11}{25}$. 26.

Dig. Dec.

27. $\frac{11}{28}$. $\frac{2}{29}$. $\frac{6}{30}$. Nix 1. 11. 15. = 3. 080.

Haud leve Gelu 18. maximæ sæpe hoc Mense se Pruina; Nix super Montes permansit ad xxiv. usque.

Levis Procella 11. Nocte E b S 4^x. — quàm maximus Halo subluteus, at vividus, circa Lunam 22. H. 10. S w 2.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 2. N 1. } media 29. 5 $\frac{27}{36}$
 ——— minim. 28. 29. 0. S VV 3. }
 Dies frigid. 3. 64. E b N 1. } media 50 $\frac{18}{30}$
 — tepid. 26. 40. S VV b S 2. }

Per-

* Vid. quæ supra dixi Mense Martio, 1747. † Sic describitur χειμών βορείος, αὐχμοί, ψυχρά πνεύματα, μεγάλαι χιονες, περὶ δὲ ἰσημερινὴν χειμῶνες μέγιστοι. — παραπληγίαι πολλοῖσιν ἐγίνοντο, ἃς τίνες αὐτῶν ἔθνησιν διατάχων.

Perpaucæ jam *Variolæ*, at Morbi adhuc Pestoris acuti frequentes, Sputa tamen largissima nunc ex facili prodeunt maximo cum Levamine. Tusses humidæ, innumeræ, ac sæpe vehementes: Tabidi plurimi occidunt, Sævitia Tussis, Alvi Fluxu, aut Sudoribus, penitus confecti. — Febres aliquæ putridæ, necnon intermittentes, sed Rure potissimum. Multi *Rheumatismo* cruciante diuissimè torquentur; vix utique sine magno Sanguinis Dispendio levantur, qui profectò haud parum est viscidus. — Haud rarò etiam ipsa Venæ Sectio ter, quaterve, repetita incassum tentatur, nec cedunt Dolores acerbi nisi *Deobstruentibus*, *Diaphoreticis*, *Purgantibus*, & *Anodynis*, tandemque aliquando fugantur solum Balneo frigido.

Cæterum hic annotabo obiter, quòd, dum b acri & serosa Colluvie pendeat *Rheumatismus*, multò magis obest, quàm prodest, larga Sanguinis Detractio; id ipsum notante *Sydenhamo*:* In hoc etenim Casu certè, quæ blandè Sudores movent, quæ acres edulcorant Humores, eosque expurgant commodè, interposito subindè papaveris Doloris Lenimine, longè feliciores edunt Effectus — Usus sum profectò sequentibus, multos per Annos satis feliciter.

Tertia, vel quarta, quaque Nocte *Calomelan.* Grana aliquot cum *Pilul. Mathai*, seu *Saponaceis* exhibeo, Mane autem proximo *Cathartica* leniora, omnia dein sub Noctem compesco *Anodynis* — Et etiam ubi per Initia Morbi Vomitus excito.
Die-

* Epistol. I. responsoria ad Drem. Brady.

Diebus attamen intermediis suadeo sequentia, aut his similia R. Pulp. Prunor. dulc. Æthiop. miner. ana ℥vi. Gum. Gujac. ℥ii. Cremor. Tartari. Nuc. Myristic. Pulv. à ℥iii. Syrup. Croci. q. s. m. f. Elect. cujus cap. Q. N. Moschat. seu Juglandis, bis saltem de Die cum Haustu largiore Aq. Calcis, in qua rasum Lignum Guaiacum & Sassafras sint infusæ; cui adjicio insuper Aq. Absinth. C. aliquid cum Elix. paregoric. & Essent. Animon. ana ℥ss. vel ℥i. — (Aquam Calcis verò præparatam esse vellem Testis Ostrear. aut Cochlear. probè calcinat.) nam & magis dulcem hanc & magis efficacem judico — Victu interim ex media Materia utendum est, pro Potu autem Sero Latius tenuissimo Sinapi imbuto, infuso Lign. Sassafras. ex Aq. bulliente, Aquis demùm Pyrmontanis, Spadanis, aut Scarburienf. — Locis atqui pertinaciter dolentibus idonea admoveo Fomenta, mox dein Vesicatoria.

Sed quid ego hæc tanto Molimine cum quilibet Medicaſter triobolaris verbosis Populo Strophili
* Antirheumatica venditet fallere nescia?

Plena Luna 2^o.

Nova Luna 16^o.

MAIO. Plena Luna 31^o.

Inenunte & exeunte hoc Mense Pluvia haud parca, Ventus australis, Aerque crassus, medicus autem tenuis valdè; per totum equidem blandus fuit satis Tempeſtas: maximæ interdum Rorationes.

Pluvia

* Quorum Stultitia Quæſtus Impudentiæ est. Phadr.
L. 1. Fab. 14.

Pluvia $\frac{1}{2}$ $\frac{111}{4}$ $\frac{1}{5}$ 6. 7. $\frac{11}{10}$ 11. 22. 25. $\frac{1}{26}$
 Dig. Dec.
 8. 29. 31. = 2. 250.

Altitud. maxim. 14. 30. 2. N 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$
 ——— minim. 2. 29. 2. S S VV 2. }
 dies frigid. 8. 44. VV N VV 2. } media 35. $\frac{26}{30}$
 ——— calid. 20. 28. N 18.

Variolæ passim; *Pleuritis* & *Peripneumonia* frequens, *Rheumatismi* levi cum Febre, at sævo modum Dolore plures discruciant: non solum post Initio Venæ Sectionem poscunt largiorem, sed & multa porrò post *Diluentia*, *Cathartica anaphlogistica*, necnon *Anodyna* liberalia, inter quæ commodissimum est *Elixir paregoricum*; quod & salubres movet Sudores, lenitque Dolorem, exhero. Lactis tenuissimo datum: inservit hoc Serum insuper utilissimè pro Potu communi; diuque haustum, ac copiosè, ipsum tandem solvit Morbum, præcipuè si *Nitri* aliquid sit adjectum. — Opportuna sanè, & repetita, Sanguinis Missio, sequè *Rheumatismo* calido, in junioribus & robustis, medetur, ac ipsi *Pleuritidi*.

Febres putridæ passim, vix jam video Intermittentem. Tussis plurimæ, & *Coryzæ* acres modum cum Tumore Faucium, Labiorum, Oculorum, &c. adeò salsus destillat Humor, qui non tantum vellicat, sed etiam, sit Venia Verbo, vesicat Nares, atque in Pulmonem irruens sævissimam excitat Tussim, ipsamque *Tracheæ* Membranam erodit: multi hinc *Phthisici* certè ad Plures abeunt.

Nova Luna 14°. *JUNIO*. *Plena Luna* 29°.

Incipiente *Junio* Aer valdè crassus, frigidus, & humidus; post Diem decimum septimum verò fervida admodum & fuda Tempestas.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$. 4. — 6. $\frac{1}{2}$. 8. 10. 12. $\frac{1}{4}$. $\frac{11}{15}$. 29.
Dig. Dec.

= 1. 102.

Dies fervidissim. 20. 21. 22. 24. 26. 27.

8 Altitud. maxim. 17. 29. 9. N N V V 1. } media 29. $6\frac{26}{29}$
— minim. 29. 29. 3. S b E 2. }
Dies frigid. 4. 40. V V N V V 2. } media 28 $\frac{20}{29}$
— fervidiss. 27. 15. S b E 2x. }

Variolæ sparsæ; aliquæ putridæ & lentæ Fe-
bres. Tabes pulmonaria ubiquè frequens est,
haud pauci pereunt — Vox rauca, Tussis clangosa,
Spûta viridia, cœnosa, purulenta, graveolentia,
Dorsi Dolor, ac Debilitas, Sudores profusi, atque
Alvi Fluxus, subindè se excipientes, accedente
Crurum Pedumque Tumore, cum ingrato quo-
dam in Pectore Sibilo, & Spiritu difficili, haud
dubia fuere imminentis Lethi Præsentia; rupta
interdum in Pulmone Vomica.

Salubris Aura Ruris, Equitatio quotidiana,
bene curata è Lacte Diæta, & Potio lenis demul-
cens, *Emulsio* scilicet *Amygdalina* ex *Decocto Rad-*
Eryng. condit. & id Genus alia, multò magis ta-
bidis his proficere videntur, quam operosa Me-
dicamentorum Farrago, quæ semper imbecillo
Stomacho nocet; *Opiatis* autem idoneis compe-
scenda est subindè Tussis Vehementia, sistenda
porrò est Alvus, si cita nimis, reprimendi etiam
sunt

1748) & Morbis Epidemicis. 189
 sunt profusi Sudores: cave autem semper, ex
 divini Senis Consilio, ne noceas si non possis opi-
 tulari*.

Nova Luna 14. JULIO. Plena Luna 28.

Julii Initio sicca fuit & calida Tempestas, va-
 ria post, & multo frigidior, Pluviae frequentes,
 Ventus inconstans, ab Austro saepius; factus hinc
 Aer est humidus atque crassus: sub Finem Apri-
 citas, Aestusque haud levis, Corus mollis.

Pluvia 1. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. — 15. 19.
 Dig. Dec. 3. 24. 25. 31. = 4. 134.

Fulgur, cum Tonitru, gravissimum, ac im-
 mensis Pluviis 23. 24. 31. Procella 24. p. m.
 w 4.

Altitud. maxim. 28. 29. 9. N VV 1. } media 29. 4 $\frac{28}{31}$
 ——— minim. 24. 29. 0.
 dies frigid. 25. 38. VV S VV 3x. } media 29 $\frac{16}{31}$
 — fervid. 30. 16. N VV 1.

Variola passim, ut plurimum blandæ satis &
 quædam tamen Furunculis, Carbunculis, & di-
 versis Ulceribus stipata. Febres aliquæ putridæ &
 biliosa frequens.

Nova Luna 13. AUGUSTO. Plena Luna 27.

Haud parum torruit Messes hoc Mense Cani-
 cula, maximæ tamen subinde Rorationes, medio
 autem *Augusto* Pluviae satis; Aer inde crassus
 tum

* Hippocras. Epidem. Lib. 1. Constitut. 2. sub Finem.

tum valdè & humidus: à quarto ad decimum
 Quartum Ventus subsolanus, ad Finem dein us-
 que varius.

Pluvia 2. 4. ⁶14. ¹¹15. 16. ¹¹17. 18. — 20. ⁶31.
 Dig. Dec.
 = 1. 256.

Fulgura perplurima 12. gravis Procella 15. E
 S E 4. sævum Fulgur cum Tonitru 31. ad Oc-
 cidentem. Maxima B. 28. H. 8. p. m. E N
 E 2. Trabes rutilæ, vividæ, plurimæ, ab ipso
 Horizonte, ad Angulos penè rectos, per luci-
 dissimam quasi Iridem jaculatæ sunt, More ve-
 lut ex Arcu Sagittæ.

Altitud. maxim. 7. 30. 0. E 2. } media 29. $6\frac{20}{27}$
 — — — minim. 15. 29. 2. }
 Dies frigid. 19. 36. VV N VV 18. } media 28. $\frac{2}{27}$
 — fervid. 5. 20. E b S 2. }

Variolæ sparæ, sed parùm funestæ; his tamen
 exarescentibus Furunculi plurimi, valdè dolentes,
 tandemque suppurantes, sæpe sæpiùs erumpunt.
 Cholera, ac Dysenteria, haud raræ, Ophthalmiæ
 aliquæ, & Faucium Tumores.

Pleuroperipneumoniæ passim inter Agricolas sæ-
 viunt, à frigida frequenter Potione, ac Aura,
 dum Sudoribus inter Opera diffluunt: grata sa-
 nè utraque, sed periculosa valdè: Ratione adeò
 semper obsecundandum est Naturæ Incitamentis.

Nova Luna 11^o. SEPTEMBRI. Plena Luna 25^o.

Perficcus atque tepidus fuit hic Mensis, Atmos-
 phera tamen plerumque valdè crassa, Ventus in-
 con-

1748) & Morbis Epidemicis: 191
constans, at lenis; Boreas per Initia, ac Sol fer-
vidus, sub Finem Libs: plurimus sæpissimè Ros.

Pluvia $\frac{11}{7}$. $\frac{2}{11}$. 12. 13. 16. 19. 20. 21. 24.
Dig. Dec.
7. — 29. = 0. 914.

Altitud. maxim. 3. 30. 1. E N E 1. } media 29. $7\frac{22}{25}$
— minim. 8. 29. 2. E S E 2x. }
Dies frigid. 31. 44. S V V 3. }
— calid. 1. 28. V V N V V 1. } media 34.

Variolæ adhuc, utplurimum benignæ, Pustulis
tamen ulcerosis, & Furunculis, usque stipatæ;
sub Morbi Finem nempè; accedunt sæpe sævæ
phthlamia, ac cruciantes Artuum Dolores, nisi
naturè & probè purgantur. — *Diarrhœæ*, & *Dy-*
nteria, perplurimos exercent; rarò tamen cru-
entus est Alvi Fluxus, nihilominus autem ali-
quando lethalis, obrepente Singultu, & perpetua
residendi Cupiditate; quod nihil levat æquè ac
lyster noster *anodynus**, qui, & *Diarrhœam* quo-
què profusam, irritis aliis omnibus, sæpe felicif-
mè sistit.

Nova Luna 11^o. OCTOBRI: *Plena Luna* 25^o.

Sicca duravit Tempestas, cum alta Barometri
tatione, ad Diem usque decimum *Octobris*, a-
edò ut, per Initia Mensis, Putei atque Rivuli
lures defecerint prorsus; post autem imbrica
aldè & multò gelidior: Aquilo prævaluit ad
decimum octavum, indè verò Libs.

Plu-

* Vid. supra Mens. April, 1743.

Pluvia $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ 13. — 16. $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{19}$ 20
 $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ — 26. $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ Gran
 Dig. Dec.

do 10. Nix 11. = 3. 696.

Gelu 3. 12. 13. Fulgur & Tonitru 29. No
 cte: Procella 30. Nocte, ac Mane 31. S w b w
 4. — Maximæ Pruinæ Mensis Initio.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 3. N E 1. } media 29. 6 $\frac{2}{3}$
 — minim. 22. 28. 7. S E b S 3. }
 Dies frigid. 12. 61. N 1x.
 — tepid. 5. 34. N b VV 1. } media 48 $\frac{6}{3}$

Multæ hîc *Variolæ*, aliquibus in Locis sunt e
pidemicæ: Morbus colicus creberrimus, plure
 jam à *Pomaceo* novello. *Pleuriperipneumonia* pa
 sim, medio presertim Mense; Sanguis extra
 ctus autem haud valdè densus est. — Dentium Do
 lores, Destillationes, Tussis sævissimæ, per plu
 rime; inter Pueros ferina Tussis grassatur — *Ca*
tarrhalis quædam *Febricula* porrò frequens est
 admodum, cum magna Pectoris Oppressione
 Tussi humida permolesta, Ventriculi Dolore, ac
 Cruciatibus *rheumaticis*; brevì tamen evanescit
 accedente Alvo cita, atque torminosa paululum

Non tantum ab impedita *Perspiratione* oriri
 videntur Febres *Catarrhales*, sed etiam ab ipso
 gelido *Atmosphæræ* Vapore per varios Corporis
 Meatus irruente; humidis igitur, frigidisque
 Temporibus, invadunt maximè; huic inesse por
 rò Salem quendam acreum *, & acrem judico
 qui

* Vid. Prolegomen. Vol. I. de Aere & Morbis epidemicis

1748) & Morbis Epidemicis. 193
qui fundit quodammodò Sanguinem ; vellicat
Nervorum Propagines , totamque Humorū
Massam conturbat. Neque enim aliter est fa-
cile dictu , undè tam subita sæpe subit Commo-
tio Hominibus , algido udoque Aeri expositis ,
tam immensa Distillatio Humoris per Nares ,
Oculos , Fauces; adeò acris sæpe ut vel ipsam
Cutim erodat , ac Tusses vehementes moveat &
Sternutamenta perpetua: Neque hæc in paucis
duntaxat , sed & per innumeros undiquè simul ,
& semel , dispergitur Morbus. Mihi igitur pro-
babile videtur , quod , quò major sit aerei hujus
Salis Copia per *Atmosphæram* diffusa , eò acrior
sæviat *Catarrhus* ; in quibusdam enim Febriculis
Catarrhalibus longè magis blanda est Distillatio
quàm in aliis ; plerumque verò pluviis , nivosis ,
& frigidis , Tempestatibus acerrima .

Sin autem his generatur acris , & serosa , in
Sanguine Colluvies , multò meliùs discutitur Su-
doribus , & blandis *Catharticis* , quàm prodiga
Sanguinis Missione , quàm vix sanè approbo un-
quam , nisi forsan ipso Initio , & ubi Febris haud
leviter ardet.

Nova Luna 9°. *NOVEMBRI*. *Plena Luna* 23°.

Pluviæ perpaululùm hoc Mense , *Baroscopii*
Statio præalta , medio præsertim ; Ventus sæpi-
simè ab Oriente , ad Septentrionem deflectens
plerumque ; Aer fuit majore ex Parte valdè cras-
sus ; interdum verò tenuis admodùm , ac fri-
gidus , maximæ Pruinæ frequenter , Gelu haud
rarò.

Pluvia ¹1. ¹¹15. ¹17. ¹18. ¹19. ¹¹20. ¹¹22. ¹24. ¹25.
 Dig. Dec.
 29. 30. Nix 21. — 0. 906.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 6. N E b E 1. } media 30. 0 ²/₃
 ——— minim. 2. 29. 3. S V V 2. }
 Dies frigid. 21. 68. N E 1x. rigidum Geln. } media 54.
 — tepid. 2. 42. }

Variolæ undiquè ferè, fatis tamen clementes,
 scilicet distinctæ ut plurimum: Peripneumonix
 & Pleuritides passim. Tusles? Κορυζαί & leves
 Anginæ frequentes; Febres aliquæ lentæ, & pu-
 tridæ; Morbi Colici, & Rheumatismi, plurimi.

Nova Luna 9°. *DECEMBRI*. *Plena Luna* 23°.

Tristissima jam ingruit Tempestas, Pluvia
 constans, Libs perpetuus ferè,isque subindè pro-
 cellosus admodum; hinc facta est *Atmosphæra*
 longè humidissima: sub Finem Mensis Diluvia
 maxima ubiquè: ne vel minimum Gelu toto
Decembri, Sol rarissimè. *

Pluvia ¹¹¹1. ¹2. — 4. ¹6. ¹8. ¹9. ¹¹10. — 14. ¹¹15. ¹¹¹16.
¹¹17. ¹18. ¹19. ¹20. — 21. ¹23. ¹¹¹24. ¹¹25. ¹¹¹26. ¹¹¹27. ¹¹¹28.
 Dig. Dec.
 30. 31. = 6. 746.

Procella 1. Nocte w S w 4^r. — 14. Nocte
 w S w 4. — gravissima 15. tota Nocte S w 4^r.
 quæ porrò duravit ad Horam quartam pomeri-
 dianam Diei 16. atque Mercurium barometri-
 cum quàm maximè depresso, ad 28. 1. nempè,
 16. H. 10. a. m. S w b S 4^r. — 23. Nocte S S w
 4. — 24.

1748) & Morbis Epidemicis: 195
 4. — 24. Mane S w 4^x. — 25. S w 4. Ventus nim-
 bosus omni Nocte ab 8. ad 13. haud magnus
 tamen indè Barometri Lapsus. — Iris Lunaris per-
 illustris 15. H. 10. p. m. w S w 3^x. Fulgur &
 Tonitru 16. Mane. Magna AB 4. H. 8. p. m.
 N w 2^x.

Altitud. maxim. 7. 30. 2. VV N VV 1. } media 29. 4.
 — — minim. 16. 28. 1.
 Dies frigid. 17. 60. VV N VV 2. } media 52 $\frac{4}{30}$
 — tepid. 3. 44. S VV 3. }

Variolæ adhuc passim, mites autem plerum-
 que; in distinctis tamen, si paulò sint confer-
 tiores, & largissima profluunt Sputamina, & co-
 pioasæ admodum & crassæ Urinæ; quod fau-
 tum semper. Morbi colici perplurimi, ex *To-*
nacei novelli Potu permulti: haud pauci & Co-
 lica vehemente, & acerbissimo Artuum Dolore,
 unguntur, undè sæpe Brachiorum *Paresis*, &
 generalis Membrorum Debilitas, Miseros* diu
 admodum trahit.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLVIII.
 Dig. Dec.
 = 30. 680.

O 2

INDEX

* De his, eorumque Medicina, Vid. Opuscul. nostr.
 de Morbo Colico, ad Galcem Vol. I. de Aere & Morbis
 Epidemic.

I N D E X.

A

| | |
|--|----------|
| A Bdomen tumidum per Febres, fluente Alvo, exitiosum ————— | Pag. 147 |
| Acetum cum Piscibus recte estur — | 57 |
| Abscessus in Meatu auriculari in Febribus, bonum — | 56 |
| Aer densus admodum Baroscopium erigit — | 1 |
| Acetum & Pomaceum Nautis utilia — | 57 |
| Acidorum in Febre pestilentiali Utilitas — | 50 |
| Aceti Vapor ad Auram malignam — | 84 |
| Aer Carcerum & Nosocomiorum, &c. sæpe purgari & corrigi debet ————— | ibid. |
| Æstas fervida Bilem auget & Sanguinis Acrimoniam — | 71 |
| Æstatis calidæ Nocumenta, & quid tunc faciendum — | ibid. |
| Æstatis frigidæ & humidæ Incommoda — | 160 |
| Æstus Maris minimi flante Borea — | 66 |
| Alvi Purgatio lenis in Febre maligna laudatur — | 53 |
| Quæ poscunt Alvi Purgationem, quæ prohibent — | 53 |
| Alvi Fluxus in Febribus liquidi, saniosi, aut nigri, cū magno Foetore involuntarie dejecti, infausti sunt Ominis — | 147 |
| Angina gravis ————— | 16 |
| De Angina Observationes quædam — | 16. 21 |
| De Angina mucosa ejusque Medela — | 20 |
| Anginæ Metastasis in Pulmonem lethalis — | 155 |
| Anginæ Curatio ————— | 19 |
| Qui sunt Apoplexiæ obnoxii — | 18 |
| Ad Apoplexiam præcavendam Cautio — | ibid. |
| Apoplexia post diuturna Frigora frequens — | 169. 184 |
| Multi apoplexia perculsi — | 104 |
| Quæ ad Prophylaxin idonea — | 169 |
| Aphthæ & Ulcera Faucium in Phthisi mala — | 27 |
| Aphthosa Angina Febribus, præcipuè pustulosis, accedens — | 29 |
| Aphthæ nigræ, malæ — | 40 |
| Aprilis persiccus & frigidus — | 6 |
| Aqua fontana, imo & frigida, in Dyfenteria — | 10 |
| Arcus in Cælo lucidus, igneus, insolitus — | 6 |

| | |
|---|-------------------|
| Arcus lucidus, subflavus, ad Modum Iridis, extensus à
N E ad S VV per ipsam Lunam — — — | Pag. 80 |
| Asthmaticis Ventus ab Oriente noxius — — — | 79 |
| Ascites sæpe sequitur Morbum regium, & quare — — — | 87 |
| Atmosphæra interdum apparet valde crassa & fumosa
etsi rêvera est maxime sicca, & unde — — — | 43 |
| <i>Augustus</i> Mensis fervidissimus & siccissimus — — — | 174 |
| ———— calidus & siccus — — — | 108 |
| Aquæ Calcis Usus in Rheumatismo — — — | 186 |
| ———— hujus præparandæ Modus optimus — — — | <i>ibid.</i> |
| Algidus humidusq; Autumnus ferocem gignit Colluviẽ — — — | 164 |
| Aucupii mirum Genus — — — — — — — | 34 |
| Aurora borealis notabilis — — — — — — — | 23. 179 |
| Ab Atmosphæra crassâ & perfrigida Destillationes, &c. — — — | 181 |
| <i>C. Aurelianus</i> — — — — — — — | 19 |
| Atmosphære gelidæ & humidæ Mala — — — | vii |
| ———— siccæ & frigidæ Commoda & Incommoda — — — | iii. iv |
| ———— tepidæ & humidæ Mala — — — | vi |
| ———— Remedia — — — | <i>ibid.</i> |
| In Ædibus condendis magna Præcorum Diligentia — — — | x |
| ———— quædam male admodum locatæ — — — | <i>ibid.</i> |
| B | |
| B Alneum frigidum ad Rheumaticos — — — | 185 |
| ———— Tussim Convulsivam — — — | 105 |
| ———— vitandum est in Febricula aut — — — | |
| Hæmoptoe — — — — — — — | 105 |
| Maxima Barometri Depressio per gravem Procellam — — — | 32. 194 |
| Barometri præalta Statio perflante Austro & quare — — — | 64 |
| Quam maxima Barometri Altitudo — — — | 14 |
| Barometri magnus & subitus Decensus — — — | 141 |
| ———— magna Altitudo Africo flante, cum multa Pluvia — — — | 35. 94 |
| ———— dum Atmosphæra est valde nebu-
losa — — — — — — — | i |
| ———— & magna Depressio Feb. 1746 — — — | 151 |
| Immensa Pluvia nil tamen subsidente Barometro — — — | 26 |
| Baroscopii præalta Statio — — — — — — — | 95. 112. 113. 193 |
| Bilem auget maxime Æstas calida — — — | 177 |
| ———— per Alvum purganda est — — — | <i>ibid.</i> |
| ———— ubi abundat, Hippocrates & veteres Medici Venæ
Sectionem prohibent — — — — — — — | <i>ibid.</i> |
| Boreas acutos Morbos Pectoris facit — — — | 181 |
| Boreas cur Pulmonariis noxius — — — | 65 |
| Duo borealia Lumina valde notabilia — — — | 23 |
| De Bronchoromia — — — — — — — | 16 |
| O 3 | |
| Brachi- | |

Brachiorum Paresis à Colica ——— Pag. 195
 Bulla nigra ad Linguae Apicem in Peripneumonicis 144

C

| | |
|---|--------|
| C alomel in Dysenteria epidemica ——— | 100 |
| Camphora in Febribus ——— | 148 |
| Carunculæ lividæ per Alvum ejectæ, pessimæ 105. | 107 |
| Cathartica fortiora faciunt Febres recidivas ——— | 56 |
| Catarrhales Morbi undiquè frequentes ——— | 77 |
| Cathartici lenis in Febre pestilente Utilitas ——— | 49. 53 |
| —— quando prohibetur ——— | 53 |
| Chirurgus Guttur Scalpello pertundens ——— | 17 |
| Cholera valde frequens & valde biliosa ——— | 71 |
| Colicus Morbus frequentissimus ——— | 61 |
| —— facile solvitur accedente Diarrhoea ——— | ibid. |
| Cicer & Ficus ad Variolas ——— | 165 |
| Coffee Potus laudatur ——— | 102 |
| Calor enormis plures Morbos generat ——— | 71 |
| Caries Maxillæ & Ossis Vomeris post Morbillos 137. | 139 |
| Colica biliosa plurimos torquens ——— | 168 |
| Colluvies acris & biliosa dominatur maximè 164. | 176 |
| —— serosa pro variis Hominum Temperamentis va-
rios producit Morbos ——— | 110 |
| —— biliosa post fervidam Æstatem ——— | 176 |
| —— per vomitum & Alvum purganda ——— | 177 |
| Cortex Peruvianus noxius ubi Sanguis est viscidus &
inflammatus ——— | 114 |
| Comitia funesta Oxoniensia ——— | 83 |
| —— Tauntoni ——— | ibid. |
| —— Launcestoni ——— | 82 |
| Contagium diu adhæret Vestibus Ægrotantium ——— | 68 |
| Ideoque ex Febre contagiosa recuperatos Domi recipe-
re parum tutum est. ——— | 67 |
| Consensus Cutim inter & Intestina bene notus Alex. Trall. 62 | |
| Clyster anodynus ——— | 100 |
| —— & restringens ——— | 191 |
| Coryzæ acerrimæ ——— | 187 |
| Historia Cynanches lethalis ——— | 17. 18 |
| Cuticulæ Desquamatio larga post Morbillos, bonum ——— | 24 |
| Cynanchæ ——— | 17. 25 |
| Cucurbitulæ scarificatæ in Febribus ——— | 148 |

D

| | |
|--|-----|
| D ecembris 1739 Tempestas mirabilis ——— | 34 |
| —— frigidus & pluvius admodum ——— | 62 |
| —— maxime pluviosus ——— | 179 |
| —— & procellosus ——— | 194 |

Diarrhoea

| | |
|--|----------|
| Diarrhœa sæpe salutifera in Peripneumonia maligna | |
| Anni 1746 | Pag. 152 |
| Quæ Diarrhœa in Febre pestilentiali bona, quæ mala | 55 |
| Observata in Cadavere Pueri Diarrhœa perempti | 4 |
| Diarrhœa & Dysenteria frequens post fervidas Ætates | 176 |
| Destillationes, Tusses, & Dentium Dolores acerbissimi | |
| innumeros torquent | 162 |
| Diluvia maxima | 180 |
| Dysenteria epidemica | 98 |
| ejus Curatio | 100 |
| Venæ Sectio in hac necessaria | 105. 106 |
| Lumbrici in Dysenteria epidemica multi dejiciuntur | 105 |
| Calomel in Dysenteria | 100 |
| Aqua fontana imo frigida in Dysenteria | 107 |
| Drastica purgantia nocentissima in Dysenteria | 49. 106 |
| Lenia Cathartica utilia in Dysenteria | 106 |
| In Dysenteriis curandis lenia purgantia antecedere de- | |
| bent Usus astringentium | 99 |
| Urina limpida malum | 197 |

E

| | |
|---|----------|
| Ecceprotica in Febribus putridis | 148 |
| Eclegmata oleosa & dulcia in Phthisi pulmonaria | |
| sæpe nocent | 4 |
| Elixir Paregoricum | 186 |
| Emetici Utilitas in Febre maligna | 48 |
| Empyema frequens post Pleuropneumoniam | 27. 156 |
| ejus Signa | 155 |
| Emetica in Febribus catarrhalibus | 102 |
| Emplastra Anodyna & Epispastica in pertinaces Laterum | |
| Dolores post Pleuritides | 183 |
| Epispasticum ad Collum anterius in gravi Angina | 19 |
| quando utile in Febre maligna | 52. 148 |
| Epiphoræ acerbæ | 160 |
| Erucae innumerae | 171. 175 |
| Exanthemata varia in Febre putrida maligna | 137 |
| Expuitio largissima solvit Febres catarrhales | 133. 134 |
| Endemici Morbi unde | viii. |

F

| | |
|-----------------------------------|------------|
| FEBRIS putrida petechialis | 42 |
| anginosa inter Equos & Boves | ibid. |
| nauticæ pestilentialis Descriptio | 44. 47. 55 |
| Curatio | 48. 55 |
| ex facili recidiva | 47 |
| in hac diluentia subacida | |
| necessaria | 50 |

| | | |
|--|------------------|--------------|
| Febris nauticæ historia cui acida profunt | — | Pag. 50 |
| — cui Salia alcalina nocent | — | <i>ibid.</i> |
| Febris pestilentialis valde funesta | — | 55 |
| — mesenterica biliosa | — | 72 |
| — intermittens anomala post Catharsin fit regularis | — | 74 |
| Febris maligna contagiosa apud Launceston, &c. | — | 82 |
| — in qua Sanguis erat val- | — | — |
| de solutus & V. S. perniciofa | — | 83 |
| — sæpe in Carceribus generatur | — | <i>ibid.</i> |
| Putrefactio Cadaverum sæpe gignit Febres malignas | — | <i>ibid.</i> |
| Febris catarrhalis maligna | — | 130 |
| Febriculæ catarrhales frequentes ob subitum Autumni | — | — |
| Frigus | — | 90 |
| Febris dysentericæ Signa & Curatio | 98. 99. 105. 108 | — |
| Febres intermittentes plurimæ | — | 97 |
| — Dysentericæ creberrimæ undique | — | 103 |
| — epidemicæ | — | 108. 121 |
| Febris catarrhalis maxime epidemicæ Historia | — | 99 |
| — <i>Influenza</i> dicta | — | 104 |
| — Curatio | — | 102 |
| — aliquando in Peripneumoniam, aliquan- | — | — |
| do in Intermittentem transit | — | 101 |
| — minime fert magnam Sanguinis Dispendium | — | <i>ibid.</i> |
| — Sputa copiosa & Sudores modici juvant | — | 102 |
| — Urina multa hypostatica prodest | — | 103 |
| — Diarrhœa sæpe | — | 103 |
| — accedente calida Tempestate Sudoribus solvitur | — | 108 |
| Febris catarrhalis quibus Temporibus frequens & unde | — | 192 |
| — ab acri Sale Aereo | — | <i>ibid.</i> |
| — quibus profligatur | — | 193 |
| Febres scarlatinæ valde frequentes | — | 133 |
| Febris putridæ malignæ Historia | — | 135 |
| — Carcerum Historia | — | 82 |
| — catarrhalis Sputo levata—ejus Descriptio | — | 141 |
| — putrida lenta frequens | — | 145 |
| — in hac V. S. perniciofa | — | 147 |
| — Medicina idonea | — | 148 |
| Febres biliosæ | — | 158 |
| — miliares compositæ | — | 162 |
| Febris putridæ lentæ Descriptio ac Curatio | 172. 173 | — |
| — quædam anginosa quæ frequenter ad Pulmones ruit | — | 111 |
| — peripneumonica maligna, admodum funesta | — | 151 |
| — cujusdam catarrhalis Descriptio ac Curatio | — | 133 |

I N D E X

201

| | | | |
|---|---|-----------|-------|
| Fbris Catarrhalium Causa | — | Pag. 192. | 193 |
| Curatio | — | | 193 |
| Rigora stupenda | — | | 34 |
| Mare ad Littora, Vina, &c. congelantur | — | | 36 |
| bruarius persiccus & perfrigidus | — | | 182 |
| imenta emolientia ad Coilicam | — | | 168 |
| non debent esse nimis calida | — | | 168 |
| urunculi & Carbunculi plurimi post Variolas | — | | 189 |
| bris epidemicæ diversa Facies in Locis diversis | — | | ix |
| diversus curandi Modus | — | | ibid. |
| a manifesta Aeris Intemperie | — | | xi |
| bris putridis favet nebulosa ac nubila Atmosphæra | — | | ibid. |

G

| | | | |
|---|---|------|-------|
| GRAMEN est Remedium detergens | — | | 170 |
| Gangræna Faucium post Morbillos | — | 137. | 139 |
| argarificationes fortiores in Angina inflammatoria malæ | — | | 20 |
| in aliis autem sunt utiles | — | | ibid. |
| elu 13 Junii 1743 | — | | 109 |
| acre 18 Aprilis | — | | 184 |
| acies ubique 27 Aprilis 1745 | — | | 132 |

H

| | | | |
|---|---|----------------|-----------|
| HALO maximus luteus circa Lunam | — | 112. 149. 180. | 184 |
| hemorrhagia Narium in Febre pestilentiali nunc bona | — | | 2 |
| nunc mala admodum | — | | 47 |
| frequens per Tempestates valde æstuosas | — | | 175 |
| epatitis | — | | 48 |
| austris salinus, quid, ejusque Usus | — | | 51 |
| id. Hoffmanni Hortatio | — | | ii |
| Hippocrates suadet diligentem Tempestatum Observationem | — | | i |
| Hippocratis Observationes de Morborum & Tempestatum | — | | xiii. xvi |
| Constitutionibus | — | | xvii |
| parum differunt a nostris | — | | xvi |
| ortamen ad legendum Hippocratem | — | | 87. 88 |
| ydrops a Limphaticorum Ruptura Descriptio | — | | |

I

| | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----|
| Annuarius valde procellosus | — | | 77 |
| perfrigidus & siccus | — | | 114 |
| testinorum Sphaceli Signa | — | | 107 |
| terus & Hydrops frequens | — | | 87 |
| is Lunaris illustris | — | | 195 |
| vivida | — | | 140 |
| chias solito frequentior | — | | 132 |
| lius Mensis siccus & subfrigidus | — | | 54 |
| aridissimus ac torridus | — | 10. | 70 |

Julius

| | | |
|--|-----|----------|
| <i>Julius</i> pluviosus & frigidus | — — | Pag. 159 |
| <i>Junius</i> frigidus & pluviosus | — — | 134 |
| — siccus | — — | 42. 109 |
| Jovis cum Marte intima maxime Conjunctio | — — | 104 |

L

| | | |
|---|-----|-----|
| L Apilli per Tussim rejeſti, unde Sputum Sanguinis | — — | 4 |
| Lentor inflammans prout huc vel illuc transfertur | — — | 13 |
| hunc vel illum Morbum facit | — — | 13 |
| Immensa Quantitas Limacum | — — | 159 |
| Lingua in Peripneumonia maligna | — — | 144 |
| Libs perfrigidus | — — | 129 |
| Lumen boreale insolitum | — — | 190 |

M

| | | |
|---|-----|----------------|
| M ARIS Æstus longe maximus | — — | 124 |
| Mira Tempeſtas Menſe <i>Mai</i> o 1739 | — — | 26 |
| Maris Æstus minimi flante Borea | — — | 66 |
| <i>Martius</i> Menſis ſicciffimus | — — | 65. 80 |
| Mefſis infelix & corruptum Frumentum | — — | 58 |
| Menſtrua admodum profuſa | — — | 179 |
| Medicus in Morbis curandis tam propria quam communia debet intueri | — — | 48 |
| <i>Maii</i> 50. 1740 Nix plurima ac Frigus insolitum | — — | 41 |
| Matura & optima Mefſis | — — | 70 |
| Materia Medica ad Peripneumonias | — — | 169. 170 |
| Mefentericæ Febres per Catharſin diſcutiendæ | — — | 156 |
| Morbi verni Sanguinis Miſſionem, autumnales Catharſin poſcunt | — — | 177 |
| Morbilli epidemici | — — | 12. 24. 78. 79 |
| — puſtuloſi mali Moris | — — | 28. 159 |
| — valde epidemici | — — | 78. 85. 86 |
| — Hiſtoria & Curatio | — — | 90 |
| Longus Artuum Dolor ac Laſſitudo ante Morbillos & Variolas, malum | — — | 23 |
| Si Cuticula multum atque bene deſquamatur poſt Morbillos, bonum | — — | 24. 86. 93 |
| Induſia in Morbilis Sudore madida ſumopere ſunt cavenda | — — | 91 |
| Quid faciendum eſt ſi Morbilli præmature recedant, aut luridi ſiant | — — | 24 |
| Morbilli maligni epidemici | — — | 137. 139. 154 |
| — — — ſub Finem Tuſſis & Peripneumonia quibus medetur Venæ Sectio | — — | 78. 133 |
| — — — poſt hos Gangræna Faucium | — — | 137. 139 |
| Mofchi Vires per Cutim expellendi Humores miræ | — — | 123 |
| Mufcarum omnigenarum Viſ immenſa | — — | 175 |
| Morbi quidam Tempeſtatibus Anni reſpondent | — — | xiii |
| | | Iidem |

Idem Morbi in Græcia qui in Britannia — Pag. xvii
 Morbos intercurrentes descriptos æque ac Epidemicos, &
 quare ————— xviii

N

| | |
|--|-----|
| N IX plurima 5 ^o . Maii 1740 ————— | 41 |
| Nautæ & Milites magis plectuntur Febribus epidemi- | |
| cis quam Oppidani aut Ruricolæ — — — | 150 |
| Naturæ obsequendum est in Medicina faciunda — | 7 |
| Nebulæ densissimæ & valdè foetidæ — 141. 170 | 181 |
| Nervorum Distensio in Tussi ferina Puerorum — | 165 |
| Nitrum — — — — — | 156 |
| November valdè siccus — — — — — | 193 |
| Nuces avellanæ copiosissimæ — — — — — | 161 |

O

| | |
|--|-----|
| October perfrigidus — — — — — | 60 |
| — procellosus valdè & pluviosus 92. 125. 139 | |
| Oleum Lini ad Peripneumon. &c. — — — — — | 156 |
| Oves inter Oves in qua Vesicula Fellis fuit Magnitudi- | |
| nis enormis — — — — — | 42 |
| Ophthalmia per frigidas & humidas Aeris Cōstitutiones | 41 |
| — cum aliis Morbis inflammatoriis frequens 15. 22. | |
| — — — — — 24. 25. | |
| — humida Catharticis curatur — — — — — | 160 |
| Operis Ratio — — — — — | 1 |

P

| | |
|---|----------|
| Paralysis Brachiorum à Colica — — — — — | 195 |
| Parasynanche, quid, ejusque Curatio — — — — — | 195 |
| Parotides in Febre pestilentiali bonæ dum suppurantur | 55 |
| — aliquando diu induratae permanent — — — — — | ibid. |
| Peripneumonia maligna Lingua qualis — — — — — | 144 |
| — — — — — qualis Urina — — — — — | ibid. |
| — — — — — scorbutica — — — — — | 40 |
| Paraphrenitis frequens — — — — — | 117. 156 |
| Historia Chirurgi ingeniosi Paraphrenitide perempti | 117. 118 |
| Peripneumonia notha ejusque Curatio — — — — — | 134. 157 |
| Febres Peripneumonicae malignae valde frequentes — | 142 |
| — — — — — perparcam admittunt San- | |
| guinis Missionem — — — — — | ibid. |
| Peripneumonia maligna ejusque Descriptio 151. 153 | |
| — Papulæ & Pustulæ urentes plurimæ in | |
| hac boni Ominis — — — — — | 152 |
| Distinctio inter Peripneumoniam a viscido & inflammante | |
| Sanguine & Peripneumon. maligna — — — — — | 144 |
| Perigniones (etiam inter adultos) frequentissimi — | 38 |
| Petechiæ lividæ, violaceæ, nigrae, fuscae — — — — — | 45 |

Phithi.

| | |
|---|----------|
| Phthisis pulmonar. sæpe Febré catarrhalem sequitur Pag. 3 | |
| Species diversæ diversam postulant medendi Methodum | 4 |
| Pulmonum frequens sine Ulcere | ibid. |
| Quid Pulmonariis Phthisicis faciendū est ineunte Æstate | 8 |
| Nigras aut lividas Petechias prælargas Hæmorrhagiæ ple-
rumque comitantur | 135 |
| Phlyctænæ seu Pustulæ ichorosæ in Peripneumonicis, &c.
inducunt Usus Epispasticorum | 7 |
| Piscium Esus immodicus putridos humores facit ac Scor-
butum | 57 |
| Piscatus seu nimius Piscium Esus insalubris | 47 |
| Pleuritis spuria, quid | 32 |
| ac Peripneumonia valdè frequens | 117 |
| Pleuroperipneumonia in qua erumpunt Pustulæ magnæ,
urentes circa pectus & Scapulas 7. ^{mo} circiter Die sem-
per fausti est Ominis Ægrotis | 7 |
| multæ cum idonea Medicina | 169 |
| Pleuritis dorsalis, ubi Doloris Sedes est inter Scutula
operta, Venæ Sectione opportuna & lenibus Opiatis
maxima ex Parte curatur | 155. 156 |
| Pluvia immensa nil subsidente Baroscopio | 26 |
| Pomaceum & Acetum Nautis utilia | 57 |
| in Febre putrida maligna | 148 |
| Colicem, Tormina & Alvi Fluxus producit | 116. 127 |
| Poma citò putrescentia Alvi Fluxum inducunt | 127 |
| Procellosa Tempestas frequenter salubris | 126 |
| Pulmonis Morbi per plurimi ac vehementes | 66 |
| Purgatio Alvi declinantibus Variolis utilis, quidni de
clinante putrida Febre? | 53 |
| Pustulæ aquosæ urentes, Phlyctænæ Hippocrat. | 46 |
| boni Ominis in Febre pestilente | ibid. |
| circa Labia in Febribus bonum & quare | 56 |
| <i>Plympton</i> oppidum | 98 |
| Perspirabile retentum Morbos creat | viii |
| Procellæ aliquando salubres | xi |

R

| | |
|---|----------|
| R Aucedo pertinax in Pulmonariis malum | 27 |
| Rheumatismi contumaces | 185. 186 |
| in his sæpe V. S. non juvat | 185 |
| Methodus curandi | ibid. |
| Aqua Calcis confert | 186 |
| Fomenta | ibid. |
| Rheumatismo calido æquæ medetur V. S. ac Pleuritidi | 185 |
| Serum Lactis in Rheumatismo | 186 |

Vesica.

| | |
|---|----------|
| Vesicatoria | Pag. 186 |
| Rhabarbarum optimum ad Dysenteriam | 106 |
| — ejus Tinctura non æquè confert | ibid. |
| Rivuli omnes penè arescunt ob Calores enormes | 175. 191 |
| Rubeoli seu Rossalia <i>Frid. Hoffmanni</i> | 68 |
| — aliquando Stigmata relinquunt sicut Variolæ | 75 |
| | 142 |
| Ramazzini Consilium | ii |

S

| | |
|---|--------------|
| SALES volatiles alcalinos in Febre putrida non proba | 148 |
| Salivatio pareior debito in Variolis | 182 |
| De Sanguine mittendo in Febribus malignis | 48 |
| Sanguis. sæpè florida ac falsa specie decipit | ibid. |
| — maximè viscidus Vere 1744 | 117. 118 |
| — crassissimo Glutine obductus in Pleuroperipneu- | |
| monicis & Rheumaticis | 139 |
| — subflavo & tenaci Glutine obductus indicat Ve- | |
| næ Sectionem | 145 |
| — admodum densus & glutinosus in omnibus fere | |
| Morbis acutis <i>Januario & Februario 1742</i> | 78 |
| — admodum densus & Corio obductus post | 100 |
| Uncias detractas | 129 |
| — in Asthmate & Serum subflavum aut vi- | |
| ride at perliquidum | 130 |
| Sanguinis missio necessaria in Dysentericis | 105 |
| — Facies in Febribus putridis malignis | 137 |
| — Peripneumonia maligna | 143 |
| — longe diversa in Pleuropneumonia | ibid. |
| Sanguinis puri Sputum in Peripneumonicis | 183 |
| Inest sæpe Sanguini Diathesis ad pustulosas Febres | 76 |
| Salivatio præmatura profusa in Variolis, malum | 33 |
| Salia volatilia alcalina in Febribus petechialibus ac | |
| malignis nocent plerumque | 50 |
| Salinus Haustus, quid, ejusque Usus | 51 |
| Scabies frequens, & unde | 64. 112. 167 |
| — foedissima inter Equos | 96 |
| — undique post acerrimum Frigus | 38 |
| Scotomia in Febre pestilentiali frequens | 47 |
| Scomberi copiosissimi | ibid. |
| Sal Aereus | 192 |
| Scorbutus perfrequens | 40 |
| — terribilis inter Nautas | 160 |
| Serum Sinapium | 157 |
| — Lactis ad Rheumatismum | 186 |

Salsus

| | |
|---|--------------|
| Salfus aut acidus in Ore Sapor per Febres putridas, bonum | Pag. 56 |
| Sanguinis largior Emissio non confert in Febribus cathar- | |
| rhalibus | 101 |
| <i>September</i> maximè ficcus atque adeò saluberrimus | 111 |
| Siccitas maxima | <i>ibid.</i> |
| Singultus in Febribus pessimum | 137 |
| <i>September</i> ficcus & pulcherrimus | 190 |
| Sputa copiosa in Febribus putridis bona | 47 |
| falsa & acida | 56 |
| Spontanei Sudores optimi | 50 |
| qui mali | 51 |
| Sudor foetidus ab Esu Piscium | 47 |
| Sudores in Febribus haud Morbum solvunt, etiam erum- | |
| pentibus Pustulis, si Urinæ prorsus tenues, crudæ, & | |
| aquosæ perstant | 2 |
| Situs humilioris Mala | viii |
| aridi & montani | ix |
| Sanguinis Acrimonia magna Autumno | xiii |

T

| | |
|---|--------------|
| T ABES Pulmonum non omnis ab Ulcere pendet sed | |
| à Muci & tenuioris Laticis Profluvio per Glandu- | |
| las asperæ Arteriæ | 4 |
| in qua aliquando duros ex- | |
| tussunt Lapillos | <i>ibid.</i> |
| cum Aphthis citam Mortem | |
| promittit | 27 |
| Tabes pulmonaria frequens admodum | 187 |
| lethalis Signa | 188 |
| quæ in hac facienda | <i>ibid.</i> |
| Tempestas Tabidis maxime noxia | 65 |
| Tonitru gravissimum <i>Decembr. 1740</i> | 62 |
| Subita Thermometri Mutatio | 77 |
| Tincturæ Corticis Alexipharmacæ Vires | 56 |
| Tuberculorum in Pulmonibus Noxæ | 13 |
| Tussis anginosa inter Equos perfrequens | <i>ibid.</i> |
| Tussis convulsiva vehemens creberrima | 30. 166 |
| non nisi per Sanguinis Missionem compes- | |
| cenda | 16 |
| in qua V. S. maximè | |
| necessaria Anno 1744 | 114 |
| Vomitu levatur | 115 |
| post Morbillos Curatio | 105. 109 |
| Tusses vehementes epidemicæ | 116 |
| Balneum frigidum ad Tussim convulsivam | 105 |
| Tussis | |

| | |
|--|----------|
| tussis convulsiva pessima | Pag. 166 |
| ad hanc Medicina idonea | ibid. |
| tusses variæ variam postulant Methodum medendi | 4. 5 |
| frigidas & siccas Tempestates Sanguis densus & viscidus | v. vi |
| tutius tunc mittitur Sanguis. | ibid. |
| quid faciendum | v |
| sicca sudaque Tempestate citò & feliciter restituuntur aegri | vii |

V

| | |
|---|---|
| Ariolæ ab omni Febricula pustulata distinguuntur, quod nempe Vesiculæ in Variolis non nisi post diem Octavum decedunt, abeunt vero Rubeoli, &c. tertio vel quarto | 75 |
| o Variolis Febriculas pustulatas (Anglice the Chicken and Swine Pox) agnoscunt Mulierculæ | 142 |
| ariolarum mali Moris per Alexipharmaca Curatio | 122. 123 |
| ariolæ epidemicæ | 30. 41. 42. 60. 66. 67. 68. 140. 158. 180 |
| mali Moris | 33. 72. 122 |
| ariolosi parum expuunt frigida durante & sicca Tempestate — quid tunc faciendum | 36 |
| ma Notitia Variolarum apud Arabes | 165 |
| ariolæ derepentè factæ epidemicæ | 178 |
| epidemicæ benignæ nisi Nautas inter & milites, cur his malæ | 151 |
| malæ Scorbutis infectis | 66 |
| distinctis Variolis profusa Salivatio | 179 |
| ariolæ confluentes epidemicæ, cum valde profusa Salivatione ac Faucium Ulceribus | 160. 165 |
| medendi Methodus in his commoda | 165 |
| na Sectio in Dysentericis utilis | 105 |
| Febre putrida Carcerum nimia, Aegrum | 82 |
| ugulabat | 82 |
| Catarrhali non esse larga debet | 101 |
| rmibus perplurimi infestantur | 98. 105 |
| na Sectio in Tussi & Peripneumonia optimum | 91 |
| ferina | 105 |
| icatoria diutissimè manent ulcerata | 56 |
| um rubrum optimum Alexipharmacum | 52 |
| ad cohibendos Sudores | 71. 130 |
| cera Faucium in Febris mala | 26 |
| in Phthisi breviter lethalia | ibid. |
| um Alexipharmacum jucundum | 147 |

| | | |
|--|-------|---------|
| Ventus orientalis Asthmaticis noxius | — — — | Pag. 79 |
| Vesicatoria in Rheumatismo | — — — | 186 |
| Vibices in Febris lethales | — — — | 45 |
| Urina lutea hypostatica copiosa, in Febre catarrhali critica | — — — | 103 |
| — cruda & tenuis in Peripneumonicis, pessimum | — — — | 152 |
| — multa crassa subsidens in Peripneumonicis, bonum | — — — | 153 |
| Vomitionis Effectus in Febris | — — — | 52 |
| Ungues lividi | — — — | 4 |
| Medicus debet Ungues inspicere | — — — | ibid |
| Vinum pomaceum in Febris putridis | — — — | 14 |
| Ulcera scorbutica fungosa | — — — | 16 |
| Vomica Pulmonis unde | — — — | 17 |
| Urina tenuis aquosa in Febris pustulosis malum | — — — | |
| — limpida in Dysentericis malum | — — — | 10 |
| Urina in Febre Pestilentiali cruda Finem ad usque | — — — | 5 |
| Uxoris meæ dilectissimæ Historia | — — — | 8 |
| Venti magnam Vim habent ad Salubritatem vel Insalubritatem Locorum | — — — | i |
| — contra perniciosos bene muniendum est | — — — | ibid |
| Varro | — — — | |
| Vitruvius | — — — | ibid |

